

DO PIZZOFALCONE



10. A. 18

BIBLIOTECA PROVINCIALE



Palchetto

Num.^o d'ordine 33

NAZIONALE

B. Prov.

I

VITT. EM. III

2487

NAPOLI

B. Prov.

I

2487

c c

x
.
.
.



IBLIOTHEQUE
DE
PHYSIQUE,
ET
HISTOIRE NATURELLE.



IBLIOTHEQUE
DE
PHYSIQUE,
ET

HISTOIRE NATURELLE,

ntenant la Physique générale, la Physique particulière, la Mécanique, la Chimie, l'Anatomie, la Botanique, la Médecine, l'Histoire naturelle des insectes, des Animaux & des Coquillages :



TOME II.



A PARIS,

chez la Veuve DAVID jeune, Quai des Augustins, près le Pont S. Michel, au Saint Esprit.

M. DCC. LVIII.

avec Approbation & Privilege du Roi.





S U I T E

DE LA PHYSIQUE

G É N É R A L E.

ARTICLE LXII.

*Sur les Etincelles produites par
le choc de l'acier contre un
caillou.*



O U S connoissons assez la nature du fer , pour savoir qu'il contient beaucoup de matiere inflammable , & qu'il n'est ductile , qu'autant qu'il est pour ainsi dire imbibé d'une suffisante quantité de cette matiere. Dès qu'elle lui a été enlevée , il devient cassant ,

Tome II,

A

friable : il est réduit en une espèce de scorie analogue à une matière vitrifiée ; mais ce qu'il est important de remarquer , c'est que cette matière inflammable peut être aisément enlevée au fer qui est chauffé dans un feu ouvert , c'est-à-dire , dans un feu autour duquel l'air extérieur a un libre accès. Dans un pareil feu on ne sauroit rendre une barre de fer chaude au point où il est nécessaire qu'elle le soit pour être soudée ou forgée aisément , sans réduire la couche extérieure de cette barre en une matière cassante, en scories. Les coups de marteau font tomber des écailles friables de tout fer qu'on forge , après qu'il a été chauffé. Les Ouvriers appellent ces écailles, & très-proprement, du fer brulé : car ce qui arrive à une grosse bûche de bois mise au feu , est une image exacte de ce qui arrive à une barre de fer exposée pareillement à l'action du feu. La première couche de la bûche est réduite en cendre ; la suivante l'est en charbon, pendant que tout l'intérieur est bien bois. De même la première couche de la barre de fer est réduite en une matière friable :

la suivante a encore de la souplesse , quoique rendue plus roide qu'elle n'étoit auparavant ; & tout l'intérieur est du fer non altéré.

De-là il suit , que plus la pièce de fer est mince , & plus promptement elle peut être brûlée , réduite en scories. Une lame de fer , qui n'auroit que l'épaisseur qu'ont ensemble les deux couches de la barre , qui se détachent en écailles après que le fer en a eu une chaude , seroit elle - même réduite en entier en scories dans une seule chaude. Enfin si le morceau de fer n'est qu'un grain d'une petiteffe presque imperceptible , il ne faudra qu'un instant pour le réduire en scories , que le tems nécessaire pour le faire rougir ou blanchir ; comme il ne faut qu'un instant pour réduire en cendre une fibre de cette bûche , qui ne peut être consumée par le feu qu'en plusieurs heures.

Qu'il ne faille qu'un instant pour réduire un grain de fer ou d'acier en scories , c'est ce qui peut être prouvé par plusieurs expériences simples , & entr'autres par celle-ci. On engagera la tête d'une aiguille dans un petit

morceau de bois , qui servira de manche pour la tenir. On mouillera un peu la pointe de cette aiguille , & on l'appliquera ensuite contre un grain de limaille d'acier extrêmement fin , qui y restera collé. On placera ensuite l'aiguille dans la flamme d'une bougie , de façon que sa pointe , & environ le tiers de sa longueur , en soient dehors : dans un tems très-court , la partie de l'aiguille qui est hors de la flamme , prendra couleur jusqu'à devenir rouge ; & dès que la couleur sera parvenue à la partie de l'aiguille où est le grain , ce grain lui-même deviendra rouge ou blanc. Dès qu'on le voit rouge , ou pour le mieux encore , dès qu'il a blanchi ou étincelé , on n'a qu'à retirer l'aiguille de la flamme de la bougie. Si on observe alors le petit grain , on lui trouvera à peu près sa première figure ; mais on le jugera plus gros , ses arrêtes seront moins vives : il paroîtra tout soufflé , comme l'est tout fer brûlé ou réduit en scories. Tel est aussi son état. Qu'on fasse tomber le grain sur un papier blanc , qu'on l'y presse avec l'ongle ou avec quelque autre corps dur ; on l'y mettra en

poudre plus aisément qu'on n'y met un grain de charbon. Il est devenu parfaitement friable.

Il est donc certain qu'il ne faut qu'un instant pour allumer la matiere inflammable d'un grain de fer extrêmement petit ; & qu'il ne faut qu'un instant pour que la portion de cette matiere qui lui donnoit de la ductilité, lui soit enlevée. Or dès que le coup d'un morceau d'acier contre un caillou embrase les petits grains d'acier qu'il détache, il n'est donc plus surprenant que ces petits grains soient réduits en scories pendant le tems de leur chute : tout court qu'il est, si le choc d'un morceau de bois contre un caillou détachoit & allumoit des filamens de bois, on ne seroit pas étonné que ces filamens fussent réduits en cendre avant que d'être tombés à terre. Ce n'est pas trop dire, quelque paradoxe que puisse paroître la proposition, que la matiere inflammable du fer peut être allumée & consumée aussi vite que celle du bois, lorsque le feu est réduit en fragmens extrêmement petits. Ce n'est que lorsque le fer est en grosse masse, qu'il est

difficile à brûler , comme l'est en pareil cas un bloc d'un bois compact.

Nous prouverons mieux encore , combien la matière inflammable du fer peut être allumée & consumée promptement , & qu'elle l'est au moins aussi promptement en certaines circonstances , que celle du bois ou du charbon , en achevant d'expliquer la dernière particularité de notre phénomène. Les grains d'acier , qui ont été détachés & allumés par le choc du caillou , ne sont pas simplement réduits en scories , comme les grains qui ont été chauffés au bout de l'aiguille & en dehors de la flamme ; ils ont été rendus liquides jusqu'à un certain point , & assez pour pouvoir , en tombant , prendre une figure arrondie , comme celle d'une boule , ou d'une boule allongée. Si les grains qui sont chauffés au bout de l'aiguille , ne deviennent pas aussi liquides que ceux qui sont détachés par le caillou , c'est que , quoiqu'ils soient chauffés dans un tems assez court , ils le sont plus successivement & lentement en comparaison des autres. Ce n'est qu'au moyen de la matière inflammable que

Le fer peut être rendu liquide : si toute
elle qu'à chacun des grains, de l'assem-
lage desquels une très-grosse masse
de ce métal est composée , pouvoit
être enflammée sur le champ , les plus
grosses masses de fer pourroient être
fusibles ; & ce qui fait qu'on ne peut
parvenir à fondre , à rendre fluides de
grosses masses de fer dans un feu ou-
vert , c'est que les grains les plus pro-
ches de la surface sont brûlés , avant
que ceux qui en sont un peu éloignés
soient allumés. Mais un grain de fer
extrêmement petit peut être échauf-
fé dans un instant jusqu'au centre. La
matière inflammable qui y est placée ,
peut être allumée presque aussi-tôt que
celle qui est auprès de la surface , &
avant que celle-ci ait eu le tems d'être
consumée. Alors le grain contient la
quantité de matière inflammable &
allumée , qui suffit pour lui don-
ner de la fluidité.

Il est même à remarquer , que les
grains qui ont été réduits en scories
au bout de l'aiguille , & que toutes
les écailles qui se détachent du fer
chauffé à la forge ; que tous ces grains,
je , & ces écailles , s'ils n'ont pas

été fondus parfaitement , ont été près de l'être : leurs arrêtes ont été abba-
rues & arrondies ; enfin le fer s'est gon-
flé. Cette dernière circonstance mérite
d'être remarquée : elle prouve que la
matière sulfureuse s'allume dans l'in-
térieur du fer avec une espèce de dé-
tonation , qu'elle écarte les parties qui
l'empêchent de s'échapper assez subi-
tement ; & de-là vient que les glo-
bules , qui ont été détachés de l'acier
par le caillou , sont creux , ou du
moins spongieux intérieurement. Les
écaillés que les coups de marteau
font tomber d'une barre de fer chauf-
fée à plusieurs reprises , ont un volu-
me qui surpasse de beaucoup celui de
la barre.

Mais pour se convaincre de la gran-
de facilité & de la soudaineté avec
laquelle la matière inflammable du
fer ou de l'acier s'allume , on n'a qu'à
se rappeler l'expérience si connue de
la limaille d'acier jettée dans la flam-
me d'une bougie. On sait qu'il ne faut
à cette limaille , que le tems de passer
au travers de la flamme d'une bougie
pour s'y embraser , pour étinceler &
fulminer en quelque sorte. Dans une

grande quantité de grains qu'on jette au travers de la flamme , il n'y en a pourtant que quelques - uns sur lesquels la flamme ait assez de prise , il n'y en a que quelques-uns qui soient suffisamment embrasés. J'ai cherché , dit l'ingénieux Observateur , à ramasser de ceux-ci , pour savoir si dans le tems de leur passage , aussi court que celui de la chute des étincelles de l'acier frappé contre un caillou , ils ne s'étoient pas convertis en scories , & s'ils n'avoient pas une figure globuleuse : la direction verticale de la flamme , & la quantité des grains sur lesquels elle n'a pas agi suffisamment , sont que les grains globuleux sont difficiles à recevoir sur un papier & à trouver ; mais il y a une maniere aisée de les avoir. En soufflant dans un chalumeau , on donne une direction horisontale à la flamme d'une lampe : sur cette flamme poussée très-doucement , j'ai fait tomber quelques grains de limaille d'acier ; la flamme qui les faisoit étinceler , les dardoit sur un papier disposé pour les recevoir. Je les ai observés avec une loupe forte ; & j'ai vû que le plus grand nombre des

grains , principalement des petits grains ; avoient une figure sphérique ; que la plupart étoient des boules , comme les petits grains d'acier détachés par le caillou. Les grains qui avoient passé au travers de la flamme de la lampe , avoient été embrasés plus subitement , que ceux qui étoient au bout de l'aiguille & hors de la flamme ; aussi avoient-ils eu la quantité de matiere inflammable nécessaire pour leur donner de la fluidité.

Quand on veut rendre liquides des morceaux de fer ou d'acier un peu gros , quand on veut les fondre , il faut les mêler avec des substances propres à leur fournir de quoi réparer avec usure ce que le feu leur enleve de matiere inflammable : au moyen du soufre commun , de l'orpiment , de l'antimoine , de l'arsenic , on parvient sans peine à rendre le fer coulant.

L'Auteur dit qu'il est venu à bout de faire une espece de nouveau Phosphore de fer. Voici la composition de ce Phosphore ; ce qui fera connoître pourquoi l'acier donne plus d'étincelles que le fer. M. de Reaumur fit fon-

dre de l'antimoine dans un creuset , & jetta peu à peu dans cet antimoine fondu le double de son poids de fer réduit en feuilles minces : c'étoient des rognures de feuilles propres à être étamées , & qui ne l'avoient pas été , de ces feuilles , que les Ouvriers appellent du fer noir , par opposition au fer rendu blanc par l'étain qui s'y est attaché. Cette quantité de fer fut très-bien fondue au moyen de l'antimoine. Le mélange des deux matières devint un tout très-fluide : il fut jetté dans un moule propre à donner une figure cylindrique au lingot. Quand ce lingot fut refroidi & tiré du moule , on le ferra dans un étai , & on lui donna quelques coups d'une grosse lime. La lime agissoit avec succès sur le lingot ; mais ce qui surprit l'Auteur , c'est que les grains de limaille qui s'étoient détachés , étoient tous des étincelles : chaque coup de lime sur ce lingot en faisoit sortir une gerbe d'étincelles , & une gerbe d'autant mieux fournie , que le coup avoit emporté plus de grains de limaille.

Au reste les grains qu'une grosse

lime détache d'un lingot de métal sur lequel elle mord assez aisément , doivent être beaucoup plus gros que ceux qui sont détachés par le fusil battu contre un caillou. Les étincelles données par notre Phosphore de fer , sont aussi beaucoup plus grosses que celles que le caillou détache de l'acier.

Les parcelles que la lime emporte de cette espece de fer , sont parfaitement fondues ; aussi sont-elles bien plus chargées de matiere sulfureuse , que celles que le caillou détache de l'acier.

Si l'on a envie d'avoir un prodigieux nombre de globules bien arrondis , & bien luisans , on limera doucement le Phosphore de fer ; en y allant doucement , & en se servant d'une lime fine , on peut en détacher de la poudre sans l'enflammer : qu'on jette ensuite cette poudre sur la flamme d'une lampe dirigée horizontalement , le papier qui recevra les étincelles dardées par cette flamme , sera dans un instant rempli d'un millier de petits globules , bien ronds & bien polis.

Mais pourquoi l'acier frappé con-

tre un caillou donne-t-il plus d'étincelles, que du fer frappé avec la même force contre le même caillou ?

La différence de dureté en fourniroit seule une cause : l'acier lui-même non trempé, ne seroit pas frappé avec autant de succès que l'acier trempé. Le feu est allumé par le coup : plus le coup est subtil, & ce qui contribue à le rendre tel, plus le corps qui le donne est dur, & plus le mouvement imprimé aux parties détachées est propre à les embraser. Mais à dureté égale, l'acier a encore sur le fer un avantage de celui qu'a notre fer allié à l'antimoine sur le fer ordinaire ; il a plus de matière inflammable, & plus également distribuée. Il peut donc être plus subitement, plus également & plus intimement embrasé.

On peut même soupçonner avec beaucoup de vraisemblance, que le caillou ne contribue pas seulement par sa dureté à la production des étincelles ; qu'il contribue de plus à les mettre en fusion, par le soufre que le roc l'oblige de fournir. L'odeur de soufre que la cassure de tout caillou se sentir, l'odeur de soufre encore

plus forte , que l'on trouve lorsqu'on approche du nez les endroits de deux cailloux qui ont été frappés l'un contre l'autre , est très-favorable à cette idée. On peut de-même penser que dans le choc de deux aciers l'un contre l'autre , les grains devenus étincelles , sont pénétrés du soufre que le choc a fait sortir des parties des environs.

Il semble y avoir une maniere de décider , si le caillou contribue par son soufre à la fusion des étincelles. Le fer frappé contre du verre donne aussi des étincelles ; il ne s'agit que d'examiner si ces dernières sont globuleuses , ou si elles sont seulement des scories de figure irrégulière : M. de Réaumur n'en a trouvé que de ces dernières. Le cristal de roche & des cailloux aussi blancs que le plus beau cristal , battus par un fusil d'acier , jettent beaucoup d'étincelles , qui sont bien sphériques.

Résumons à présent tout ce que nous avons dit. Le fer & l'acier sont pénétrés d'une matiere inflammable à laquelle ils doivent leur ductilité ; dès qu'ils l'ont perdue , ils deviennent

friables, ils sont réduits en scories. Il ne faut qu'un instant pour allumer la matiere inflammable des grains de fer & d'acier très-petits, peut-être moins ou aussi peu de tems qu'il en faut pour allumer des grains de sciure de bois. Si la matiere inflammable d'un petit grain d'acier est allumée assez subitement, si elle est allumée presque à la fois, elle suffit pour mettre le grain en fusion. Les petits grains d'acier détachés par le caillou, sont ainsi embrasés soudainement. Le caillou lui-même aide peut-être, par la matiere sulfureuse qu'il fournit dans l'instant du choc, à celle qui est propre au grain d'acier : ce grain rendu liquide s'arrondit pendant sa chute ; il devient une petite boule, mais une boule creuse ou spongieuse & de matiere friable, parce que sa matiere huileuse ou inflammable a été brûlée, & brûlée avec éruption. Ce tems suffit pour brûler celle d'un grain qui est dans l'air libre. Enfin l'acier plus dur que le fer, imbibé d'une plus grande quantité de matiere inflammable & mieux distribuée, doit donner plus d'étincelles lorsqu'il est frappé contre

un caillou, que le fer n'en donne. Le fer & l'acier étant bien connus, il n'est donc pas plus singulier que les petits grains de l'un & de l'autre soient subitement fondus & réduits en scories friables, qu'il l'est que les grains fins de scieure de bois qu'on fait passer au travers de la flamme d'une lampe, soient convertis en cendre ou en charbon pendant le tems de leur chute. Les grains de différentes espèces de bois nous donnent même une image des différences, qui se peuvent trouver entre les grains de fer & ceux d'acier.

Par M. de Reaumur, Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1736. page 391.



ARTICLE LXIII.

Sur l'embrasement des Corps combustibles , sur la Flamme & sur la Fumée , sur les Lampes perpétuelles , sur l'extinction du Feu , sur les Cendres & sur les Eaux fortes.

L'Embrasement des corps combustibles , selon le P. Casal Jésuite , Auteur de ces Dissertations , consiste dans une chaleur excessive , qui dissout & consume les parties dont ces corps sont composés ; & comme il prétend qu'il y a dans les corps naturels six élémens ou six principes , sçavoir , les esprits , les sels & les sourses , qui sont des principes actifs , l'eau , la terre & l'esprit froid , qui sont des principes passifs , il attribue aux trois premiers cette chaleur violente. Pour en convaincre le lecteur , il examine les trois différentes manieres dont le feu s'allume dans les matieres qui en sont susceptibles ; sçavoir , 1^o. La fermenta-

tion. 2^o. L'approche d'un corps déjà embrasé. 3^o. Le frottement de certain bois l'un contre l'autre ; ou le choc de deux cailloux ; & il entreprend de faire voir qu'il n'y en a aucune où l'activité des sels, des souffres & des esprits, ne soit la cause du feu qui s'allume.

En effet, quant à celui qui se produit de cette dernière façon, comme par exemple, par le frottement de deux bâtons de laurier, ou de meurier ou de lierre, il soutient que cela vient uniquement de ce que ce frottement brisant quelques-unes des parties extérieures de ces bois qui sont friables, ouvre la porte aux esprits, aux sels & aux souffres qui y étoient renfermés, & qui étant en liberté, agissent de toutes leurs forces contre les autres parties qui sont proches. Après cela il est aisé de comprendre, qu'il doit arriver à peu près la même chose dans la seconde manière, qui est la plus ordinaire. Car la violente agitation de ces esprits, de ces sels & de ces souffres, ne leur pouvant permettre de demeurer tous dans le corps déjà embrasé, il est clair que s'il y en

à tout auprès quelqu'autre qui soit propre à les recevoir, ils ne manquent pas d'y entrer en foule, d'en ébranler les parties, de tirer de prison leurs semblables qui s'y trouvoient retenus; & que renforcés de ce nouveau secours, ils ne cesseront point d'agiter violemment ce corps, jusqu'à ce qu'ils en aient détaché toutes les parties, & qu'ils en aient ruiné toute la contexture & tout l'assemblage. Mais comme cela dépend de la disposition des pores des corps, il n'est pas moins évident que si leur contexture n'est pas propre à donner entrée aux corpuscules ignées, on auroit beau les exposer au feu: ils n'en fauroient être endommagés; & c'est par cette raison, selon notre Auteur, que le feu ne peut agir sur cette pierre merveilleuse qu'on appelle *Alun de plume*, pierre que l'on file, & dont on fait de la toile qui ne peut brûler: que si ce lin inextinguible dont on a tant parlé n'étoit pas une chimere, ce seroit par la même cause qu'il seroit incombustible. En un mot c'est de-là que vient, que tous les corps qui ont beaucoup de sel fixe & beaucoup de

terre , & au contraire peu de soufre mêlé avec l'humeur qui unit leurs parties , résistent si bien au feu. Enfin pour ce qui est de la fermentation qui est , par exemple , la maniere dont le foin qui n'est pas bien sec s'embrase , il prétend qu'on n'en doit chercher la cause que dans la violente agitation des soufres & des esprits qui y sont retenus , & qui venant à se détacher à mesure que l'humeur superflue détrempe les sels , ne peuvent manquer d'y causer une grande effervescence. En effet l'exemple de plusieurs compositions qu'on allume en crachant dessus , ou en y jettant un peu d'eau , fait voir clairement que c'est cette désunion des sels d'avec ces autres parties , qui leur donnant le moyen de s'échapper de leurs liens , & de faire librement leur ravage , cause ces fortes d'embrasemens. Passons à la flamme & à la fumée.

Notre Auteur prétend que la flamme n'est autre chose qu'un amas de parties sulfurées , qui sortant en foule du corps embrasé comme un torrent impétueux , entraînent avec elles d'autres parties aqueuses mêlées avec les

terrestres , qui rendent la flamme visible. Pour la fumée , elle n'est autre chose qu'une exhalaison qui se peut enflammer ; & il n'y a point d'autre différence entre la fumée & la flamme , sinon que celle-là a moins de parties sulfurées , & qu'elles y sont dans une moindre agitation , mais qu'elle en a beaucoup de salées , comme il paroît par l'effet qu'elle fait sur les yeux & sur les chairs qu'on y expose , & qu'elle a aussi un grand nombre de parties terrestres , comme il paroît par la *Suie* & par la *Cadmie*. Au reste notre Auteur ne tient pas que toutes ces parties qui font la fumée , soient toujours assez grossières pour être aperçues. Par exemple , il prétend qu'il en exhale incessamment de la *Naphte* , aussi - bien que d'une certaine herbe dont parle Pline ; & que , comme elles sont fort grasses , & qu'elles composent autour de ces deux corps une espèce d'atmosphère , 'c'est ce qui fait qu'ils s'embrasent si facilement dès qu'on les approche du feu à une certaine distance. Il ne doute pas non plus , qu'il n'en sorte incessamment de fort subtiles de tous les corps odoriférans :

& il est persuadé que si ceux qui font consister l'odeur qu'ils répandent en des *especes intentionnelles*, avoient fait tant soit peu de réflexion sur les effets qui en procedent, ils auroient quelque sorte de honte de n'avoir pas compris, qu'il est ridicule de leur attribuer, par exemple, l'effet du charbon de terre sur ceux qui n'y sont pas accoutumés, & de s'imaginer que des espèces intentionnelles puissent faire mal à la tête.

Mais parce que les lampes perpétuelles dont parlent les Anciens, paroissent contraires à cette continuelle éruption de particules sulfurées, falées, spiritueuses en quoi notre Auteur fait consister la flamme, il n'a eu garde de manquer à s'expliquer là dessus. Il examine donc les Histoires qu'on en rapporte, & parmi lesquelles on ne peut nier qu'il n'y en ait de fort curieuses; & après y avoir fait quantité de réflexions, il conclut, ou que ces lampes étoient des *Phosphores* qui avoient une lumière sans chaleur, tel qu'on dit qu'on en trouva un en 1653. près de Valence en Dauphiné, dans un

champ où l'on découvrit quantité de sépulcres antiques , ou que la plupart de ces Histoires ne sont que de pures fables. Quant aux diverses couleurs qu'on remarque dans la flamme , le P. Casal prétend qu'elles ne sont que des effets de la diversité de la matière qui la compose.

Pour expliquer l'extinction du feu , l'Auteur tâche de faire voir comment , selon son hypothèse , il arrive qu'une force étrangere le fasse mourir ; & pour ce qui est de la flamme , comme elle ne consiste , selon lui , que dans la violente agitation des petits feux , & dans la dissolution des autres parties du corps combustible , il est assez clair que tout ce qui vient à s'opposer à cette agitation & à cette dissolution doit l'éteindre. Et en effet c'est ainsi qu'il prétend qu'elle s'éteint dans cette admirable machine de M. Boyle , par laquelle ce savant homme a trouvé le moyen de raréfier l'air de telle sorte , qu'il occupe treize mille fois plus d'espace qu'il n'occuppoit auparavant ; & il n'a pas de peine à montrer , comme quoi les particules qui forment la flamme par leur agitation , n'y peu-

vent avoir leur mouvement libre. C'est par la même raison qu'il fait voir, qu'une chandelle s'éteint quand on la souffle, ou quand on la secoue violemment. Enfin c'est ce qui fait, selon lui, qu'on arrête facilement l'embrasement par toutes les choses qui bouchent les pores du corps d'où la flamme sort, & qui retardent ou arrêtent le mouvement des parties sulfurées. On croit que c'est l'effet que fait la pierre appelée *Zinguites*, qu'on n'a qu'à tenir sur le bois allumé pour en éteindre la flamme; & c'est encore ce que font & la terre & le vinaigre, qui éteignent si puissamment le feu: car quoiqu'il semble qu'il n'y ait rien de si propre à cela que l'eau, il est certain néanmoins qu'en bien des rencontres, elle ne fait qu'accroître l'embrasement, parce qu'elle ne bouche pas assez exactement les pores de la matiere embrasée, & que la violence du feu la résout incontinent en vapeurs, ou parce que l'onctuosité de cette matiere ne permet pas qu'elle y entre. C'est ce qui se voyoit dans ce feu dont parle Photius, *qu'on voyoit brûler nuit & jour dans un bois licie, & que l'eau*

L'eau allumoit , bien loin de l'éteindre , mais qui s'éteignoit avec du fumier ; & c'est ce qui se voit encore aujourd'hui dans du charbon qu'on tire de la terre , & qui s'éteint non avec de l'eau , mais avec de l'huile qui bouche ses pores ; ce que l'eau ne peut pas si bien faire. En un mot , soit qu'il s'agisse ou de la flamme ou de la braise , ou de quelque autre feu que ce soit , on peut dire généralement qu'il s'éteint par tout ce qui ferme les pores du corps embrasé , & qui empêche le mouvement libre des particules ignées.

Les cendres , comme chacun fait , sont ce qui reste de la matiere combustible , lorsque le feu a consumé toute l'humour qui en unissoit les parties. Je dis ce qui reste de la matiere combustible : car quoi qu'il se fasse une pareille dissolution dans les autres métaux qui ne sont pas inflammables , tels que sont les pierres & les métaux , cependant le feu ne les réduit pas en cendres , mais en chaux , qui est différente des cendres , non-seulement en ce qu'elle est d'une consistance plus solide , mais encore en ce que les choses qui y ont été réduites , comme les

métaux calcinés, se peuvent souvent rétablir; ce qui n'arrive jamais au bois & aux autres corps qui ont été réduits en cendres.

Au reste quoiqu'il y ait une très-grande différence entre les cendres, selon les divers corps dont elles sont faites, elles ont pourtant ceci de commun, que leur principale vertu consiste dans leur sel, dont la principale propriété est de rendre fertiles les terres marécageuses. Il n'y a rien aussi, selon l'Auteur, qui ait plus de vertu pour rendre fécondes les femmes qui sont stériles par trop d'embonpoint, que l'usage modéré du sel parmi leurs alimens ordinaires; parce qu'il consume la trop grande humidité qui est dans les corps, aussi-bien que celle qui est dans les terres.

Les eaux fortes ont tant de rapport avec le feu, qu'on les peut considérer comme une espèce de feu liquide. Voici comment l'Auteur explique la vertu qu'elles ont de dissoudre les métaux & des particules très-minces, & de les réduire par la précipitation en une espèce de chaux. Toute l'acrimonie des liqueurs leur vient des sels

qui y sont mêlés ; & on le prouve par diverses compositions rongeantes , par l'encre , par le suc des ananas , & par l'eau d'un certain Lac salé du Comté de Mansfeld , dans lequel si les Pêcheurs laissent aller trop avant leurs rets , ils s'y brûlent tout de même que s'ils les avoient jettés dans le feu. En effet comme il y a de diverses sortes de sels , & que les uns ont bien plus d'activité que les autres , il y aussi de diverses sortes d'eaux fortes , dont les unes , par exemple , auront bien la force de dissoudre l'argent , mais ne pourront dissoudre l'or , comme l'eau de séparation , & les autres au contraire auront la vertu de dissoudre l'or , sans pouvoir faire d'impression sur l'argent , comme *l'eau r'gale*. On pourroit encore mettre au nombre de ces sortes de liqueurs , le suc qu'on tire des feuilles de genevre , qui dans trois jours fond si bien la limaille d'or , qu'elle est liquide comme de l'eau. Mais rien n'est plus merveilleux que l'effet du sel de l'huile de tartre dans ce qu'on appelle l'or fulminant , qui est un or dissous , & précipité par le

moyen de cette huile, & qui imite admirablement le bruit du tonnerre & de la violence de la foudre d'où il a tiré son nom. Car qu'il faille attribuer à ce sel tout ce fracas, notre Auteur prétend qu'on n'en peut douter, puisque le fer réduit en chaux par ce même sel, a aussi la vertu de fulminer.

Par le P. Cassat, Jésuite, Nouvelles de la République des Lettres pour le mois de Février 1688. page 170.





BIBLIOTHEQUE
DE PHYSIQUE PARTICULIERE
ET D'HISTOIRE NATURELLE.
MECHANIQUE.

ARTICLE I.

*Observations sur la mécanique du Feu ,
ou l'art d'en augmenter les effets ,
& d'en diminuer la dépense.*

LA premiere remarque qui se présente à faire , c'est que la chaleur que le feu envoie dans la chambre , ne vient pas seulement des *rayons de chaleur* que le feu y envoie directement ; les rayons qui y entrent , réfléchis par les différentes parties de la cheminée , augmentent extrêmement l'effet du feu. Les cheminées dont les jambages sont parallèles , ne renvoient que fort peu de rayons dans la chambre ; & les hottes inclinées font encore qu'on perd une grande quantité de rayons dont on pourroit profiter. La matiere du feu étant plus légère que l'air , les rayons qui sont poussés par le feu , ne vont point en ligne droite suivant la

direction qu'ils ont reçue ; mais ils en sont détournés par leur légèreté , qui leur fait décrire une ligne courbe qui va toujours en montant ; ce qui augmente le nombre des rayons qui vont frapper le côté incliné de la hotte , & qui de-là sont réfléchis dans la cheminée.

Pour remédier à ces défauts , & pour faire réfléchir dans la chambre le plus de rayons qu'il est possible , l'on doit faire les jambages de la cheminée paraboliques ; prendre au milieu du fond du foyer de la cheminée une ligne égale à la longueur du bois qu'on veut brûler , aux deux extrémités de laquelle on élève à cette ligne deux perpendiculaires : ces perpendiculaires sont les axes de deux demi-paraboles , qui ont leur sommet contre le fond de la cheminée , & qui passent chacune par les points qu'on a pris de leur côté pour déterminer l'ouverture de la cheminée. C'est sur ces lignes courbes qu'on élève perpendiculairement les côtés de la cheminée , qu'on doit revêtir de tole ou de cuivre , aussi-bien que le fond. Les rayons de chaleur se réfléchissent contre ces

côtés paraboliques pour entrer dans la chambre. Il n'est pas absolument nécessaire de faire la courbure parabolique ; on peut la faire en ellipse , qui aura un de ses foyers dans l'endroit où l'on fait le feu , & l'autre dans la chambre : au lieu de parabole ou d'ellipse , on peut aussi employer une ligne droite, avec une portion de cercle.

En général on peut dire, qu'il suffit de faire les jambages inclinés sur le fond de la cheminée, & d'arrondir les angles que les jambages forment avec le fond ; cela suffit pour faire réfléchir les rayons de chaleur dans la chambre. Tout ce que font de plus les lignes , c'est de faire réfléchir les rayons dans telles ou telles directions ; ce qui est absolument indifférent : il s'agit uniquement de les faire entrer dans la chambre.

29. Pour remédier au défaut qui vient de la hotte inclinée, l'Auteur de cette Dissertation veut que l'on fasse le dessous de la tablette parallèle à l'horison , & aussi large qu'il peut être , en laissant seulement 10 ou 12 pouces pour l'ouverture du tuyau de la che-

minée. Cette situation du dessous de la tablette ne sert pas seulement à renvoyer dans la chambre les rayons directs qui y viennent frapper, mais aussi tous les rayons qui n'y viennent, qu'après avoir été réfléchis contre le fond ou contre un des côtés de la cheminée.

Il y a encore un autre moyen de faire réfléchir beaucoup de chaleur dans la chambre, & qui sert en même-tems à allumer promptement le feu, & à le faire toujours flamber si l'on veut, quelque verd que soit le bois: c'est une espèce de soufflet, qu'on peut appliquer avec utilité à toutes sortes de cheminées.

Au milieu de l'âtre, environ à 10 ou 12 pouces de la plaque du fond, il faut faire faire une petite trape d'environ trois pouces de long, & de deux pouces & demi de large; & au-dessous il faut faire faire une petite cavité qui ait communication avec l'air de dehors. Lorsqu'on levera un peu cette trape, l'air de dehors étant toujours plus pressé que celui qui est dans la chambre quand il y a du feu sur l'âtre, passera au travers de l'ouverture de la

trape , & formera un soufflet continu. Pour en pousser tout le vent contre le feu , & pour empêcher qu'il ne s'en échappe une partie de côté, on attache au-dessous de la trape, de chaque côté, une petite portion de cercle dont le centre touche la charnière.

Tout ce que nous venons de dire sert beaucoup à augmenter la chaleur ; mais ce n'est pourtant que le moindre avantage que l'on tire des nouvelles cheminées : leur disposition intérieure est d'une toute autre utilité.

Le contour du dedans de la cheminée étant couvert d'une plaque de cuivre ou de tôle , on laisse derrière cette plaque un espace vuide , d'environ quatre pouces de profondeur : cet espace doit être divisé & séparé par plusieurs languettes , qui forment plusieurs cavités , cellules ou tuyaux quarrés , mis à côté l'un de l'autre , dont le premier ait communication avec le second , le second avec le troisième ; & faisant tous ensemble une espèce de canal recourbé dont un des bouts soit au bas , & l'autre au haut d'un des jambages de la cheminée.

Quand le feu commence à échauf-

fer la chambre , l'air chaud étant le plus léger , monte en haut : de-là vient que l'air qui répond à l'ouverture d'en bas dont nous venons de parler , étant le plus pressé , entre dans le canal qui passe derrière la cheminée , & en ressort par l'ouverture d'en haut. Mais comme le feu chauffe le cuivre ou la tôle qui couvre ce canal , l'air en y passant s'échauffe avant que de rentrer dans la chambre ; & c'est par cette circulation de l'air que toute la chambre est bientôt échauffée.

On voit aisément comment cette invention peut servir à échauffer un appartement voisin , au lieu d'échauffer celui où est le feu.

Au reste quand l'air de la chambre est assez échauffé , on peut boucher les ouvertures dont nous avons parlé.

Il y a un autre moyen de tirer de cette invention des avantages bien plus considérables à tous égards. Pour cet effet il faut faire que l'ouverture d'en bas , au lieu d'avoir communication avec l'air de la chambre , ait communication avec l'air de dehors : c'est le moyen de faire passer l'air avec plus de rapidité , & en plus grande quantité , l'air de dehors étant

beaucoup plus pressé que celui qui est dans la chambre, qui par-là s'échauffe en beaucoup moins de tems, l'air échauffé qui y entre montant toujours en haut, & obligeant par-là l'air froid à sortir par la cheminée, où il trouve le moins de résistance.

Par ce moyen, on a non-seulement l'avantage de répandre une chaleur égale par toute la chambre, qu'on échauffe par là considérablement dans le plus grand froid avec très-peu de feu : on a encore l'agrément de respirer continuellement un air nouveau. De plus la chambre étant toujours remplie d'air, celui de dehors n'y entre pas en si grande quantité ni avec tant de force par les portes ou par les fenêtres, qui ne joignent pas bien, outre qu'on peut boucher exactement tous ces passages de l'air, sans craindre le moins du monde la fumée. Il est aisé de voir qu'on peut employer à différens usages cet air chaud, qui entre continuellement dans la cheminée, en le conduisant par un tuyau dans les endroits que l'on veut échauffer, ou dans lesquels on veut entretenir la chaleur.

Nous ajouterons à l'égard du canal

par où passe l'air, qu'on peut aussi faire creux le dessous de l'âtre, comme aussi le dessus de la tablette, où on pourra faire une espèce de canal, par où il sera aisé de faire passer l'air avant qu'il entre dans la chambre : tout cela ne sert qu'à échauffer davantage cet air, dont on peut encore augmenter considérablement la chaleur, en couvrant de tôle le derrière du creux, qu'on a laissé contre le fond de la cheminée. On pourra facilement alors laisser passer la chaleur derrière ce creux, & on échauffera ainsi de deux côtés le canal par où passe l'air ; mais il faut toujours bien prendre garde que la fumée ne puisse pas s'insinuer dans le canal.

Passons à ce que dit l'Auteur de cette Dissertation sur la disposition du haut de la cheminée.

Il faut d'abord diminuer l'ouverture d'en haut, & ne la laisser pas plus grande qu'il ne faut pour une libre issue à la fumée. Il faut encore qu'il y ait au haut, en dedans de la cheminée, une plaque de tôle de la longueur & de la largeur précisément du tuyau, à l'endroit où on la placera ; de ma-

niere qu'elle puisse , quand on veut , fermer l'ouverture de la cheminée ou la laisser libre , par le moyen de deux fils d'archal attachés à ses deux bouts. On doit mettre encore une seconde plaque au bas du tuyau , que l'on puisse aussi ouvrir & fermer quand on veut.

Ces bascules servent à éteindre le feu , lorsqu'il vient à prendre à la cheminée ; pour cet effet il suffit de les fermer toutes deux. Le soir encore , quand le feu sera éteint , ou qu'il n'y aura plus que des tisons sur lâtre , on pourra fermer une de ces bascules ; on empêchera par-là l'air chaud de la chambre d'en sortir , & l'air froid d'y entrer par la cheminée.

Cette bascule fermée , surtout si c'est celle d'en haut , empêchera aussi la fumée de la chambre voisine d'entrer dans la chambre , quand il n'y a point de feu.

Chacun peut aisément remarquer , que quand les jambages de la cheminée ont la disposition dont nous avons parlé , & quand avec cela le dessous de la tablette est parallèle à l'horison , toutes les parties de la che-

minée s'échauffent en peu de tems; ce qui empêche la fumée de descendre aussi facilement que dans les autres cheminées. Il faut ajouter que l'air de dehors, qui entre continuellement dans la chambre, & qui oblige celui qui y est de sortir par la cheminée, contribue beaucoup à pousser la fumée, & à la faire monter. Avec cela ce nouvel air fait que la chambre est toujours plus remplie d'air que quand il y a une cheminée ordinaire; ce qui empêche encore la fumée d'entrer si aisément dans la chambre.

Il arrive souvent, que la fumée dans une chambre est causée par l'air qui presse sur le haut de la cheminée, ou par le vent qui y entre. Voici un moyen pour y remédier. Il faut d'abord élever autant qu'on peut la cheminée, pour empêcher qu'elle ne soit commandé. L'on doit partager l'ouverture de la cheminée en plusieurs quarrés, dont toutes les ouvertures ensemble soient égales à la seule que l'on auroit donnée au tuyau. Ces ouvertures pourront être rangées suivant la longueur de l'ouverture de la cheminée, & à quelque distance l'une

de l'autre. On couvrira chacune de ces ouvertures par une pyramide tronquée. Les ouvertures d'en haut de ces pyramides doivent être moindres que celles du tuyau de la cheminée ; & leurs bases seront aussi grandes qu'il se pourra , de maniere que celles des deux pyramides voisines se touchent. Il faut avoir ensuite un prisme triangulaire , qui peut être creux , & même ouvert d'un côté ; c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir deux plans , qui fassent ensemble un angle un peu moindre que de soixante degrés : on passera ces deux plans par leur angle , ou si c'est un prisme , on le passera par un de ces angles sur les pyramides dont on vient de parler , & cela de maniere qu'il passe sur toutes les pyramides , en divisant l'ouverture de chacune en deux parties égales. Ce prisme doit avoir la face opposée à l'angle qui passe sur les pyramides parallèle à l'horison ; & elle doit être de la largeur de l'ouverture des pyramides.

On couvre ce prisme d'un chapiteau ouvert par-dessus , & dont la longueur soit égale à celle du prisme : ce chapiteau doit être divisé en plu-

fiéurs autres petites pyramides quarrées & tronquées. Les plans qui forment ce chapiteau, doivent être assez ouverts au - dessous des pyramides, pour laisser un espace de chaque côté du plan horizontal du prisme; & ils doivent être assez longs, pour descendre jusqu'au - dessous de l'angle du prisme qui appuye sur les premières pyramides.

Par-là on empêche absolument les vents qui viennent de côté, de s'insinuer dans la cheminée. Ceux qui pourrout entrer par en haut dans les pyramides du chapiteau, seront empêchés par le prisme d'entrer dans les pyramides de la cheminée; & encore le peu qui pourroit s'y insinuer, n'entrera qu'en partie dans la cheminée. Ajoutons qu'il n'y a rien dans cette construction qui puisse empêcher le passage de la fumée.

Mémoires de Trevoux, Décembre 1713. page 2139. Dissertation de M. Gauger.

ARTICLE

ARTICLE II.

*Observations sur les effets de la
Poudre à canon , principale-
ment dans les Mines.*

LA poudre est composée de trois parties de salpêtre contre une de soufre & de charbon pris ensemble. Ces matieres sont inégalement promptes à s'enflammer , aussi-bien que les parties qui les composent. L'air est nécessaire à l'action de la poudre , puisqu'elle ne s'enflamme point dans le vuide , où que quand elle le fait , c'est sans détonation & sans effort. La promptitude de la poudre à s'enflammer demande encore qu'elle soit bien sèche & bien grenée , afin que la communication de la flamme soit plus prompte. Comme les matieres de la poudre s'allument successivement , les degrés de vitesse imprimée par le feu se communiquent de la plus subtile à la plus grossiere , selon les rapports les plus approchans d'une progression géométrique.

*Tome II.***D**

Ces seules matieres mues par le feu , deviennent donc capables de faire par leur choc de grands efforts. Si l'on examine ceux que peut produire l'air enfermé dans les grains de poudre , & dans les intervalles qu'ils laissent entr'eux , on trouvera que dans une mine cubique chargée de 140 livres de poudre , s'il y avoit cinq faces immobiles, l'effort qui se feroit alors tout entier sur la sixième soutiendrait un poids de trois cens mille livres. Mais cet effort se trouve beaucoup plus grand que dans l'expérience , cent quarante livres de poudre n'enlevant ordinairement que douze cens livres pesant de terre. La raison de cette différence peut être attribuée à plusieurs causes. Une partie de cet effort se détruit, parce que la poudre ne s'allume pas tout à la fois ; qu'il s'en perd par le canal qui porte le feu à la mine , & par les pores des matieres qui l'environnent ; que les parties de ces matieres sont quelquefois très-difficiles à détacher ; qu'outre leur poids à soutenir, il y a encore la vitesse avec laquelle elles sont enlevées ; enfin que la résistance de l'air envi-

ronnant y met peut-être le plus grand obstacle , quoi qu'on n'y ait pas égard dans la pratique.

Pour se former une idée nette de la maniere dont la poudre agit sur un corps , il faut examiner ce qui se devroit passer dans un canon qu'on supposeroit immobile , posé verticalement la bouche en haut , & d'une longueur suffisante pour qu'un boulet y pût faire tout le chemin , que l'effort de la poudre seroit capable de lui faire parcourir. Il faut là-dessus remarquer , que la meilleure poudre est celle qui s'enflamme le plus promptement ; que l'ame du canon vers la culasse doit être telle , qu'une plus grande quantité de poudre s'y puisse enflammer avant que le boulet parte , ce qui fait que les canons chambrés portent plus loin avec même quantité de poudre , que quand l'ame est cylindrique ; que plus il y a de poudre qui s'enflamme , plus le boulet porte loin , mais plus aussi le canon est en danger de crever ; que plus le canon est long , plus on y peut mettre de poudre , & plus elle a le tems de s'enflammer avant la sortie

du boulet, ce qui fait que quelques canons fort longs, comme la coulevrine de Nancy, portent beaucoup plus loin que les canons ordinaires de même calibre; que la longueur la plus avantageuse d'un canon, c'est quand elle est tellement proportionnée à la charge de poudre & à la figure de son âme, que le boulet sorte de la bouche lorsque toute la poudre a fait son effort; qu'enfin l'effort de la poudre sera d'autant plus grand vers un certain côté, qu'il y aura plus de résistance vers les autres; & qu'ainsi plus un canon recule difficilement, plus il pousse loin son boulet. Appliquons à présent ce que nous venons de dire de l'action de la poudre en général à son effort particulier dans les mines. Voici ce que des expériences réitérées ont fait connoître sur ce sujet.

1°. Que l'effort de la mine se fait toujours du côté le plus foible, indépendamment de la disposition de la chambre des mines; contre ce que les Mineurs s'étoient faussement persuadé.

2°. Qu'il faut une quantité de poudre plus ou moins grande, selon

l'inégalité du poids qui doit être enlevé, & la différente liaison des parties. Pour un pied cube de terre remuée pesant 90 ou 100 livres, il faut neuf ou dix livres de poudre. Pour un pareil volume de terre ferme ou de sable fort pesant, de cent vingt-cinq à cent-cinquante livres, il faut onze ou douze livres de poudre. Pour autant d'argile pesant entre cent-quinze livres & cent-trente-cinq livres, il faut quinze ou seize livres de poudre. Pour le même volume de maçonnerie nouvelle ou peu liée, il faut quinze ou vingt livres de poudre. Pour autant de vieille maçonnerie ou qui soit bien liée, il en faut vingt-cinq ou trente livres.

3°. Que l'ouverture d'une mine qui a joué en pleine terre étant chargée à propos, se fait en un cône, dont le diamètre de la base est double de la hauteur prise depuis le centre de la mine.

4°. Que lorsqu'une mine est trop chargée, elle ne fait qu'un trou ou un puits, dont l'ouverture supérieure n'est guères plus grande que celle de la chambre où étoit la poudre. Au contraire si la mine est trop peu char-

gée, elle ne fait qu'une simple compression, ou tout au plus un petit soulèvement vers la partie la plus foible.

5°. Qu'enfin outre l'effort de la poudre contre les corps qu'elle enlève, elle soule encore & meurtrit toutes les terres qui l'avoisinent, tant au-dessous qu'aux côtés; & ces foulures s'étendent d'autant plus, que ces matieres font moins de résistance.

D'où il faut conclure, que pour charger une mine enforte qu'elle fasse l'effet le plus avantageux qu'il est possible, il faut connoître le poids des matieres qu'on veut enlever; ce qui se mesure par la solidité du cône droit, dont la base est double de la hauteur de la terre au-dessus du centre de la mine; & cela se trouve aisément par la Géométrie. Cette solidité étant trouvée en toises cubes, on multipliera le nombre de ces toises par celui des livres de poudres nécessaires pour enlever les matieres qu'il renferme, selon qu'il est marqué dans les expériences; & si les matieres renfermées sont de différens poids, il ne faut que prendre un poids moyen entre tous. Pour la disposition de la mine, la re-

gle générale est, que la partie vers laquelle on veut déterminer l'effet, soit la plus forte.

Par M. Chevalier, Mémoires de Trevoux, Février 1708. page 280.

A R T I C L E III.

*Explication physique de la force
de la Poudre à canon.*

UN étincelle de feu qui tombe sur un baril de poudre, y excite tout à coup un mouvement très-violent, & capable d'enlever des rochers & des corps d'un poids énorme. On demande comment une si petite quantité de mouvement, que celle qui se trouve dans cette étincelle, peut produire en un moment un si grand effet. Car enfin c'est un principe reçu de tout le monde, qu'il est impossible qu'un corps en mouvement communique aux autres corps qu'il rencontre, plus de mouvement qu'il n'en a lui-même. Il semble donc, suivant cette règle, que les grains de poudre qui prennent feu, en quelque nombre qu'ils soient,

ne devroient pas avoir tous ensemble plus de mouvement , que l'étincelle qui y a mis le feu. Cependant on voit que leur mouvement est infiniment plus fort ; & ce qu'il y a d'étonnant , c'est que ce mouvement se produit en un moment. Quelle en peut être la cause ?

Il y a diverses occasions dans lesquelles un mouvement qui est petit dans son origine , s'accroît tout à coup comme de lui-même , & sans le secours d'aucune cause extérieure qui paroisse. Cela s'observe surtout dans les ressort , lorsqu'ils sont fort bandés ; souvent il ne faut , pour les bander , qu'un effort très-léger ; & néanmoins en se débandant , ils acquierent un mouvement très-rapide. Ne pourroit-on pas dire qu'il se fait quelque chose de semblable lorsque la poudre à canon s'enflamme ? Car si l'on suppose une fois , que chaque grain de poudre renferme plusieurs petits ressorts extrêmement bandés , & que le feu qu'on y applique ne fait que rompre les liens qui les tenoient dans cet état , dans cette supposition , il ne sera pas difficile d'expliquer tout ce qui regarde la poudre à canon.

1^o. Une seule étincelle de feu a autant de mouvement qu'il en faut pour diviser & rompre un grain de poudre , & mettre par - là en liberté tous les petits ressorts qui y étoient enfermés. Ces petits ressorts ne peuvent se débarrer , sans heurter avec force contre les grains de poudre qui les environnent ; & en les heurtant de la sorte , ils les divisent & les brisent ; & par conséquent font jouer tous leurs ressorts. Ceux-ci en font autant aux autres grains qui les touchent. Ainsi toute la poudre prend feu , & s'enflamme dans un moment.

2^o. Cette multitude infinie de petits ressorts qui jouent tous ensemble , doit faire un grand effet , parce que chaque ressort acquiert en un moment un mouvement très-rapide , le mouvement d'un ressort qui se débarrasse , croissant toujours jusqu'à un certain point ; & comme ces ressorts cherchent tous à s'étendre , il n'est pas surprenant qu'ils enlèvent les corps qui les en empêchent , & qui les tiennent dans un état violent.

3^o. Le mouvement rapide de ces petits ressorts qui se débarrassent , est

très-propre à causer dans l'air ce mouvement d'ondulation qui fait le son : c'est pour cela que les canons & les autres machines de guerre font tant de bruit quand on les tire.

4°. Le grand effet de la poudre doit passer en un moment, parce que les petits ressorts étant une fois débandés, ils demeurent sans force, & n'agissent plus.

5°. La poudre se gâte en vieillissant, parce que les arcs qui demeurent trop long-tems bandés, perdent beaucoup de leur ressort.

On peut, avec la même facilité, expliquer tout le reste, supposé qu'on admette une fois, que chaque grain de poudre renferme plusieurs ressorts extrêmement bandés. La difficulté est de savoir si l'on peut recevoir cette supposition : c'est ce qu'il nous faut présentement examiner.

Trois choses principalement entrent dans la composition de la poudre, le salpêtre, le soufre & le charbon. Le charbon est un corps sec, dont les pores sont très-ouverts, & auquel le feu s'attache aisément. Le soufre est un corps huileux, & qui s'enflamme sans

peine. Le salpêtre est de la nature des autres sels, & a des parties longues & roides. Pour faire de la poudre, il faut mêler ces trois corps ensemble dans une certaine quantité, & les broyer long-tems dans un mortier.

Le pilon qui les broye brise nécessairement leurs parties, & rend celles du salpêtre extrêmement minces. Ces parties de salpêtre retiennent néanmoins toujours quelque longueur, suivant la nature des sels. En devenant minces & longues, elles deviennent friables; & parcequ'elles ne laissent pas d'être fort roides, elles ont un grand ressort, quand on les a une fois pliées.

Or voici comme on conçoit qu'elles peuvent se plier. Etant agitées & pressées dans le mortier, il est naturel qu'une de leurs pointes se fiche dans les pores du charbon, ou s'embarasse dans les parties du soufre. Le pilon venant ensuite à tomber sur l'autre pointe, la fait nécessairement plier; & cette pointe pliée, ou s'insinue aussi dans un pore de charbon, ou se colle au charbon par le moyen du soufre auquel on a soin de joindre un peu d'eau, comme pour le détremper.

Ainsi chaque partie de salpêtre forme une espece de petit arc fort bandé, soit parce que les pointes de l'arc sont fichées dans les pores du charbon, soit parce qu'elles y sont collées par le moyen du soufre. Quand donc le soufre vient à s'enflammer, & le charbon à se diviser, l'arc n'étant plus contraint & retenu, se débande aussi-tôt. On met dans chaque grain de poudre plusieurs de ces petits ressorts, parce que nous éprouvons, que lorsqu'on écrase un grain de poudre, les parties ne laissent pas de conserver chacune quelque vertu.

On ne donne ceci que comme une conjecture, qui paroît avoir quelque chose de plus plausible que l'opinion ordinaire. C'est à ceux qui sont versés dans la Chymie, & qui ont étudié plus particulièrement la nature du salpêtre & du soufre, à juger si cette conjecture est soutenable.

*Mémoires de Trevoux, Mars 1702.
page 3.*



ARTICLE LXVII.

Sur les Fusées volantes.

ON fait que le principe général de l'élévation des fusées volantes est le même que celui du recul d'un canon. L'air contenu dans la fusée , & dont tous les ressorts sont violemment & subitement bandés par l'inflammation de la poudre , fait effort en tous sens pour s'étendre , & par conséquent pour s'échapper de sa prison. Il ne le peut que par le bout inférieur de la fusée toujours ouvert , & par où sort la matiere enflammée qu'il pousse avec lui. Mais en même-tems il agit aussi & avec la même force contre le bout supérieur de la fusée qui est fermé ; & il agit en s'appuyant sur l'air extérieur placé sous le bout inférieur , parce que cet air ne peut lui céder assez promptement à cause de l'extrême soudaineté de l'inflammation. Ainsi le bout supérieur est poussé en haut , & monte d'une grande vitesse.

Cela suppose qu'il y ait de l'air.

étranger renfermé dans la fusée, c'est-à-dire un autre air que celui qui peut se trouver naturellement enveloppé dans chaque grain de poudre : car celui-là ni ne seroit en assez grande quantité, ni ne pourroit, étant dispersé dans tous ces grains qui ne s'enflammeront que successivement, faire agir assez promptement tous les ressorts pour produire les plus grands effets possibles. La fusée monteroit toujours, puisque les ressorts de l'air se débanneroient toujours en tous sens ; mais elle ne monteroit pas si haut à beaucoup près, à cause du petit nombre de ses ressorts, ni elle ne commenceroit pas sitôt à monter, parce qu'il faudroit qu'une quantité suffisante d'air eût le loisir de se dégager de l'intérieur des grains de poudre. Il est vrai qu'une *composition* plus *vive* de la poudre ou matiere inflammable, pourroit réparer ces défauts. Mais dans la comparaison que nous faisons, il falloit sous-entendre que toutes choses étoient d'ailleurs égales.

Il sera donc avantageux de mettre & de conserver, s'il se peut, dans la fusée de l'air étranger, quoique d'un

autre côté il soit nécessaire que la poudre ou la matiere inflammable en soit la plus serrée & la plus comprimée qu'il se puisse, & que dans ce dessein on la batte avec force. L'expédient est qu'une broche de fer, attachée au *culot* ou base sur laquelle on charge la fusée, pénètre dans son intérieur aussi avant qu'elle le peut, moyennant quoi, quand la fusée part, elle emporte la cavité où la broche se logeoit; & cette cavité se remplit d'air, & subsiste au moins quelques momens dans la forme que la broche lui avoit donnée, parce que la matiere qui l'environne, a été liée par une assez forte compression. C'est un réservoir d'air que l'on a ménagé pour le besoin de la fusée.

Mais on connoît naturellement que ce réservoir ne dure qu'un instant. L'air de la cavité fera son effet sur l'air extérieur par une dilatation très-brusque: la fusée en sera poussée en haut avec plus de vitesse; mais passé ce premier instant, tout s'enflamme: la cavité s'efface, puisque la broche qui la formoit n'y est plus, étant demeurée attachée au *culot* immobile;

& la fusée est dans le même état que si elle avoit d'abord été toute pleine , à cela près qu'elle contient un peu plus d'air qui pourra ne lui pas être inutile , ou qui au moins ne l'aura pas été d'abord.

Ces idées ne seroient pas tout-à-fait précises. La fusée étant conçue divisée en couches horizontales , elle s'enflamme successivement dans chacune , quoique très-rapidement ; & à parler à la rigueur , il n'y en a qu'une qui brûle dans un instant quelconque : toutes les précédentes sont consumées , & les suivantes sont encore entières. La broche de fer interrompt un certain nombre de couches , & rend plus petite l'étendue où elles prennent feu. Il y a plus ; sans cette broche , un grain de poudre pris solitairement enflammeroit toujours le grain supérieur qui seroit dans la même ligne que lui , parallele à l'axe de la fusée : si la broche est cylindrique , ce sera la même chose ; mais si elle est conique , le même grain n'enflammera plus que le grain supérieur posé dans une ligne parallele , non à l'axe de la fusée , mais au côté du cône incliné à cet

axe. Ainsi la broche conique déterminera dans l'inflammation successive de grain en grain , une direction différente de celle qui eût résulté d'une broche cylindrique.

Quand la fusée s'élève , la cavité formée par la broche ne se détruit pas aussi-tôt , & il en reste encore une qui contient de l'air , d'où l'on tire les avantages qu'on désiroit. La cavité , après avoir perdu son moule , ne laisse pas de suivre la fusée & de s'élever avec elle , en conservant quelque tems la figure que le moule lui avoit imprimée : car la direction d'inflammation que la poudre avoit prise selon ce même moule , ne change pas en un instant ; & c'est à cette direction que tient la figure de la nouvelle cavité. Il est évident que plus cette cavité sera de figure à se maintenir longtemps , plus la fusée sera parfaite ; & c'est - là le principal objet d'une petite théorie Géométrique, que M. de Buffon a donnée.

Ce qui a été déjà dit , suffiroit presque pour prouver que la figure conique doit être ici préférée à la cylindrique. La direction d'inflammation

que la broche conique donne à la poudre, est assurément moins naturelle, que celle que lui donneroit la cylindrique : elle est en quelque sorte forcée ; & par conséquent il faut plus de tems pour la changer , puisqu'il faut d'abord celui de la détruire entièrement avant que de lui en substituer une autre. Il ne s'agit que de tems extrêmement courts , dont la petitesse échappe à notre imagination ; mais enfin ils existent , & peuvent encore être inégaux.

De plus quand la cavité est conique , sa base étant enen-bas, il y a une moindre quantité de poudre dans une couche inférieure , que dans une supérieure , & par conséquent moins de matiere enflammée en bas qu'en haut , lorsque le bas & le haut sont enflammés. La cavité ne peut s'effacer , que quand tout est également enflammé autour d'elle ; & il faut un tems pour surmonter cette inégalité d'inflammation , & amener tout à l'uniformité. La broche cylindrique ne causeroit pas cette inégalité que l'on recherche ici.

M. de Buffon prouve que la cavité

conique l'emporte à cet égard , non-seulement sur la cylindrique , mais sur celles de toute autre figure possible. Ce qui vient d'être dit peut le faire presque suffisamment appercevoir.

L'expérience , qui est la souveraine en Physique , a confirmé les raisonnemens des fusées à broches coniques , qui se sont élevées à 8 & 9 pieds en 5 secondes. Il est vrai qu'on y avoit aussi apporté toutes les autres attentions plus connues , que leur construction peut demander.

Histoire de l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1740. p. 105.

ARTICLE LXVIII.

Conjectures sur les causes qui mettent en si peu de tems les Pièces d'Artillerie hors d'état de servir , & sur les moyens d'en augmenter considérablement la durée.

ON fait par expérience , qu'un canon du plus gros calibre chargé de poudre de la pesanteur des

deux tiers de son boulet , ne peut guères tirer ordinairement que deux mille coups sans crever , quand même il n'en tireroit qu'un coup par heure , supposé qu'il ne souffre que la seule violence de la poudre enflammée ; & il n'est pas extraordinaire de le voir crever , sans avoir tiré même à beaucoup près ce grand nombre de coups. Il n'y a qu'à lui faire faire ses décharges sans aucun intervalle , que celui que l'on met à le recharger ; il crevera infailliblement bientôt , parce que chaque coup faisant effort sur les parties du métal , par le mouvement violent que lui communique la poudre enflammée , & l'air extraordinairement raréfié dont elle est remplie , & dans ses pores & dans les interstices des petits grains qui la partagent ou en forment le volume , tout cela les défunit & les dérange insensiblement ; de sorte que le mouvement de ses parties toujours augmenté par la chaleur que causent à un canon tant de décharges si promptement réitérées , pousse enfin leur dérangement à un tel point , qu'il ne peut plus être augmenté sans une solution de continuité sensible.

Le canon creve alors ordinairement vers le milieu de la volée, quoiqu'il soit plus épais en cet endroit qu'à l'embouchure. La raison de cela est, que la poudre enflammée & l'air raréfié se trouvant plus pressés le boulet étant vers le milieu de la volée, que quand il est à l'extrémité, ils font plus d'effort en cet endroit, que s'ils occupoient un plus grand espace, le boulet étant à l'extrémité de la volée.

On objectera peut-être, que selon ce raisonnement, le canon doit plutôt crever vers la culasse que dans la volée, puisque la poudre enflammée s'y trouvant plus pressée que partout ailleurs, elle y fait aussi plus d'impression sur les parties du métal.

A cela on répond, que si le canon étoit cylindrique, il creveroit inmanquablement à la culasse plutôt qu'ailleurs; mais que comme il a beaucoup d'épaisseur en cet endroit, il creve ailleurs, avant que la poudre enflammée ait eu le tems de mettre en mouvement toutes les parties du métal dans une si grande épaisseur.

Il est vrai qu'on voit souvent crever un canon près du bourelet, & même le bourelet sauter en partie ou tout en-

tier ; mais il n'est pas difficile d'en deviner la cause.

Ou le canon a trop peu d'épaisseur en cet endroit ; ce qui fait que les parties du métal y étant trop-tôt mises en mouvement , sont aussi plus-tôt sensiblement dérangées.

Ou le boulet , qui fait souvent des ricochets dans l'âme du canon , en fait quelquefois de si violens en sortant , qu'il ouvre le métal près du bourelet , qu'il fait sauter quelquefois tout entier.

Ces ricochets qui sont si préjudiciables au canon , ne peuvent être causés que par des boulets mal ébarbés , ou qui ne sont pas exactement ronds , ou enfin qui ne sont pas du calibre de la pièce , soit parce qu'ils ont trop peu de vent , ou parce qu'ils en ont trop.

Si le boulet est mal ébarbé, ou n'est pas exactement rond , ce qui produit à peu près le même effet , comme il tourne toujours autour de son centre dès qu'il a reçu le mouvement que la poudre lui imprime , la partie de sa surface la plus éloignée du centre venant à toucher l'âme du canon , y fait l'office d'un coin , enfonce le métal

en cet endroit , & fait même tomber la volée, si sa figure trop irrégulière en retarde un peu la sortie. On remédiera en quelque façon à cet inconvénient , si l'on ne se sert que de boulets bien réguliers & parfaitement ébarbés.

Si le boulet a trop de vent , quelque rond qu'il soit , il fera souvent des ricochets , peu dangereux à la vérité , mais qui ne laissent pas à la fin d'endommager la pièce par les écorchemens qu'ils lui font dans l'ame. Ce qui cause en ce cas - là les ricochets , est la situation du boulet dans l'ame du canon. Comme il touche l'ame par en bas , & qu'il a trop de vent par en haut , la poudre ne fait pas une égale impression sur le côté de ce boulet qui lui est opposé : elle le fait sauter en tournant , & lui fait faire par conséquent ce qu'on appelle des ricochets.

Si le boulet a trop peu de vent , pour peu qu'il soit irrégulier , il produit les effets dont nous avons parlé. Si la figure est irrégulière , il ne laissera pas d'écorcher un peu la pièce , par cela seul que sa circonférence ne se trouve jamais parallèle à celle de

l'ame du canon. Voici trois moyens pour remédier à ces inconvéniens.

Le premier est de rafraîchir la pièce de canon à chaque coup qu'elle tire. On retire par-là en quelque façon les parties ébranlées du métal ; & la pièce ne s'échauffera pas absolument , ni sitôt , ni si fort , qu'elle fait ordinairement , lorsqu'on lui fait faire plusieurs décharges sans la rafraîchir. Ce rafraîchissement fréquent est une chose essentielle à la durée d'un canon ; & il n'est presque plus tems de penser à le rafraîchir , lorsqu'une trop grande quantité de décharges précipitées ont mis les parties du métal dans un trop grand mouvement. Le rafraîchissement ne peut alors tout au plus servir , qu'à empêcher la poudre de prendre feu quand on recharge la pièce. Il est vrai que de si fréquens rafraîchissemens ralentiroient un peu les décharges de l'artillerie ; mais il est vrai aussi qu'on en tireroit plusieurs avantages.

Le premier , de conserver les pièces , & de les mettre en état de suffire pour la durée d'un siège : le second , d'obliger ceux qui sont chargés de la fonte des boulets , d'avoir un soin particulier

particulier de les faire bien ébarber , de faire faire les coquilles autant sphériques dans leurs concavités qu'elles peuvent l'être : le troisiéme , de faire tourner des cylindres de bois de la longueur du diametre d'un calibre , dont un bout seroit coupé en angle droit , & l'autre creusé en demi-sphere, pour recevoir le boulet jusqu'à son demi-diametre. Cela produiroit plusieurs bons effets.

1^o. On se passeroit, si on vouloit, de fourage pour bourrer la poudre , & l'on ne s'en serviroit que pour faire tenir le boulet dans le bout creux du cylindre ; ce qu'on ne pourroit faire sans bourrer & refouler en même-tems la poudre , puisque le cylindre tiendrait lieu de bourre.

2^o. Le boulet ainsi suspendu au milieu de l'ame du canon , en sortiroit sans y toucher , & n'y feroit par conséquent ni ricochets , ni écorchemens.

3^o. Le cylindre remplissant exactement l'ame du canon , feroit plus de résistance à la poudre enflammée que la bourre qui mollit , & qui empêche par son ressort que la poudre ne fasse

sur le boulet toute l'impression dont elle est capable ; d'où il s'ensuit que le boulet doit aller plus droit & plus loin qu'à l'ordinaire.

4°. On mettroit près d'un tiers moins de tems à charger, puisqu'on ne bourrerait qu'une fois.

Il y a une autre cause, qui met souvent une pièce de canon hors d'état de servir avant qu'elle soit endommagée considérablement par ailleurs : c'est la lumière qui devient si grande par les fréquentes décharges de la pièce, qu'on est obligé d'y remettre un grain, ou de la remettre à la fonte. Mais ces grains coûtent beaucoup à mettre, & ne durent pas long-tems sans sauter, parce que quelques mesures qu'on prenne pour les incorporer en quelque façon avec la pièce, ce qui seroit le seul moyen de les faire durer, on n'en viendra jamais à bout sans mettre la pièce en fusion ; ce qui coûteroit presque autant qu'il en coûteroit pour la refondre, & la rejeter en moule.

L'étain qui entre dans la composition du métal dont on fait les canons, rend ce métal plus ferme, plus dur,

mais plus fragile aussi. Ses parties sont plus faciles à se désunir, parce que celles de l'étain, qui sont beaucoup moins rameuses & moins entrelassées que celles du cuivre, venant à se mêler avec elles, les dérangent considérablement, empêchent que leurs rameaux ne se lient, & ne s'embarassent les uns dans les autres comme auparavant; de sorte que les parties du cuivre & de l'étain se touchant dans leur mélange sans beaucoup s'embarasser, prennent un arrangement à peu près semblable à celui des parties du verre. Les parties de l'étain se mettent même par petits grumeaux, pour se séparer en quelque façon de celles du cuivre, avec lesquelles elles ont de la peine à se bien lier; ce qui se remarque par le moyen d'un bon microscope.

Ce qui fait que le feu qui sort par la lumière du canon avec toute la vitesse que lui cause la petitesse de ce passage, emporte peu à peu ces petits grumeaux d'étain déjà bien ébranlés, & comme à demi-fondus par la chaleur de la pièce, écroûte la lumière, dont il rend la surface intérieure toute irrégulière & toute raboteuse par l'ab-

sence de ces petits grumeaux d'étain , qui laissant de petites cavités entre les parties du cuivre qu'elles ont abandonnées , font que ces dernières se détachent à leur tour avec d'autant plus de facilité , qu'elles donnent plus de prise au souffle violent du feu qui sort par cet endroit.

Ainsi la lumière du canon devient si grande par les fréquentes décharges qu'on lui fait faire , qu'on est obligé de le renvoyer à la fonte , ou d'y remettre un grain quand il n'est pas endommagé par ailleurs. Mais comment apporter quelque remède à ces inconvéniens ? Le voici.

S'il est vrai , comme nous venons de le dire , que la lumière d'un canon ne s'écroît sitôt , que parce que les parties de l'étain & du cuivre qui font la composition du métal dont il est formé , ne sont presque jamais ni bien mêlées , ni bien incorporées ensemble , & qu'il y demeure quantité de grumeaux d'étain , que le souffle violent du feu détache avec tant de facilité , il faut trouver un moyen de les mêler , sinon parfaitement , du moins autant qu'elles le peuvent être.

On en viendra à bout en quelque façon, si l'on prend soin d'agiter long-tems le métal dans le fourneau , & de manière qu'il le soit partout également. Mais cette agitation si exacte ne peut avoir lieu que dans une petite quantité de métal. Dans les fontes ordinaires de canons , où l'on emploie jusqu'à soixante & quatre-vingt mille livres de métal & plus , il n'est guères possible d'agiter partout une si grande masse : trop de choses s'opposent à une agitation si nécessaire ; la quantité du métal , la grande étendue intérieure du fourneau , la petitesse des portes de ce fourneau , la chaleur presque insurmontable qui en sort , le refroidissement du métal , quand les portes sont trop long-tems ouvertes , &c.

Il faut donc recourir à quelque remède plus sûr , plus prompt & moins embarrassant , que celui de l'agitation & du mélange parfait , auquel il est si difficile de parvenir , & qu'on ne doit jamais pourtant négliger.

En voici un qui peut passer pour infailible , & qui est très-facile à mettre en usage. Il n'y a qu'à former de bons grains de cuivre de Suede , d'une gros-

leur proportionnée à celle des pièces pour lesquelles on les destine; bien battre ou forger ces grains à froid pour en resserrer les pores, & les placer dans les moules à l'endroit où doit se trouver la lumière du canon. Le métal qui entrera dans ces moules, fera fondre par sa chaleur plusieurs lignes d'épaisseur des grains avec lesquels il se liera, & se fondra parfaitement. Des grains de cette nature ne manqueront jamais; & la lumière qu'on y percera, se trouvant fortifiée par une épaisseur considérable d'un métal sans mélange, & dont toutes les parties se trouveront parfaitement homogènes, durera assez long-tems pour ne mettre jamais la pièce hors d'état de servir; & si elle vient à s'écroûter un peu par un très-long usage, elle conservera toujours une figure parfaitement ronde.

Lettre de M. Moratte, Mémoires de Trévoux, Mars 1710. page 306.



BIBLIOTHEQUE DE PHYSIQUE

ET D'HISTOIRE NATURELLE.

PHYSIQUE PARTICULIERE.

ARTICLE PREMIER.

*Quelques observations générales
sur les Météores.*

 N distingue trois sortes de régions dans l'air , l'inférieure , la moyenne , & la supérieure. L'inférieure est l'air qui nous environne , & qui s'étend jusqu'au sommet des montagnes ordinaires ; la moyenne est depuis le sommet de ces montagnes jusqu'à la cime des plus hautes ; la région supérieure s'étend depuis le sommet de ces hautes montagnes jusqu'à la sphere du feu.

Dans la premiere région de l'air s'engendrent les brouillards , les frimats , les feux folets , &c. Dans la seconde , se forment les éclairs , les tonnerres , la foudre , la grêle , la pluie , la neige , les dragons volans , les lances , les flambeaux , l'arc-en-ciel , les parélies , les verges & les couronnes. Dans la troisieme , se forment les étoiles tombantes & les comètes , & même quelquefois plus haut.

Il y a de deux sortes de matieres pour former en général les Météores ; la prochaine & l'éloignée. L'éloignée est l'eau & la terre ; la prochaine est la vapeur & l'exhalaison. On sçait qu'il y a de la différence entre vapeur & exhalaison. La vapeur sort des corps humides , comme de l'eau , de l'huile & du vin ; l'exhalaison part d'un corps sec & aride , comme de la terre , des souffres , des bitumes , des résines , & des vitriols.

La matiere prochaine des Météores secs n'est qu'une grande quantité d'exhalaisons grasses , huileuses , gluantes , terrestres , bitumineuses , & par conséquent très-combustibles , qui partent de leur corps naturel par la
vigueur

vigueur du Soleil & des autres Astres, qui en les faisant exhaler, les spiritualisent par leur vertu générative ; ce qui n'empêche pas qu'elles ne retiennent la qualité du corps dont elles partent.

Il faut observer , qu'il y a des feux souterrains qui contribuent beaucoup à l'élévation de ces exhalaisons. Apportons l'exemple le plus familier, qui arrive dans la première région de l'air. Les feux folets sont les plus communs ; leur matière n'est que cette exhalaison visqueuse , grasse & gluante , & par conséquent susceptible de feu , attirée par le Soleil , & les autres corps célestes. Ils sont fort agiles ; c'est pourquoi ils courent dans l'air au premier mouvement : ils s'engendrent ordinairement sur les cloaques , sur les cimetières & sur les marais , à cause qu'il y a quantité de ces exhalaisons grasses & visqueuses. Voici comme cette matière s'enflamme.

Ces exhalaisons étant resserrées, sont quelquefois allumées le jour par l'ardeur du Soleil ; ce que nous n'apercevons pas , à cause qu'une grande lumière en efface une petite. Ils peuvent

aussi être allumés par le mouvement de quelque corps circonvoisin. Il y a dans tous les corps une certaine quantité d'élixir, de quintessence de feu, que l'Auteur appelle *matiere animale*, & qu'il dit être à peu près la *matiere subtile* de Descartes, ou la *matiere premiere* des Philosophes. Cet élixir étant subtilement tiré, n'a pas de peine à enflammer une *matiere* aussi combustible, que l'est celle des feux follets. Il y en a quantité dans les sels, dans les soufres, dans les bitumes & dans les résines. De-là vient que la pierre du tonnerre qui en est composée, en produit en quantité; & ne sçait-on pas qu'il ne faut que presser l'air fortement pour en faire sortir? Par exemple, la roue d'un carrosse (où il y aura tant soit peu de graisse & d'eau-de-vie) roulant avec impétuosité, produira de la flamme par cette constriction d'air qui en sortira. Ces esprits sont ordinairement dilatés, & n'ont pas d'effet s'ils ne sont resserrés; mais s'ils le sont tant soit peu, ils s'enflamment aussitôt. Les rayons du Soleil n'enflamment pas les *matieres* combustibles; mais si

on resserre ces rayons par le moyen d'un crystal concave , le corps où portera le rayon , n'aura pas de peine à s'enflammer.

Selon l'Auteur de cette Dissertation, il y a de la différence entre les esprits subtils du Soleil , & la matiere animale dont nous avons parlé. Il croit que cette matiere qu'il dit être l'ame universelle , a été créée séparément de toutes les autres choses : elle est portée par l'air qui lui sert de véhicule , dans toutes les parties du monde. Cette matiere animale a beaucoup d'effet lorsque le Soleil est sur notre horison , parce que trouvant des esprits qui s'ympatisent avec ses qualités , elle agit avec plus de force & de pénétration. Cette matiere agitée & pressée par quelque corps se trouvant auprès de ces exhalaisons combustibles , les enflamme ; ces exhalaisons enflammées , c'est ce que nous appellons feux folets.

Le peuple croit que ces feux folets sont véritablement des esprits , qui souvent ont la malice de conduire dans d'affreux précipices les voyageurs,

qui les voyant paroître , cherchent à leur échapper ; mais l'effet de ces feux peut s'expliquer aisément.

Le Cavalier qui veut fuir , agite l'air par où il passe ; & même par la circulation d'air qu'il cause autour de lui , il entraîne par la même raison tous les corps légers qui sont aux environs de cet air agité. Si vous voulez que ces feux ne vous atteignent point , il faut n'agiter l'air que le moins que vous pourrez. Leur flamme est lumineuse ; mais elle ne brûle en aucune sorte , parce qu'elle est trop rare & trop subtile. Si vous mouillez votre doigt dans de l'esprit de vin , & que vous l'exposiez à la flamme d'une bougie , vous verrez la flamme entourer votre doigt sans qu'il en soit brûlé , parce que cette flamme est trop subtile & trop spiritueuse. On appelle ces feux Castor & Pollux , quand on les voit tous deux ensemble. Pline rapporte que c'est un heureux présage. Quand il n'y en a qu'un seul , on le nomme Hélène. Le même Auteur dit que le présage en est funeste.

Passons aux feux qui s'allument le plus ordinairement dans la moyenne

région de l'air, & commençons par le tonnerre.

Lorsque cette matiere visqueuse & combustible, ou exhalaison terrestre dont nous avons parlé, est serrée & détenue entre deux nuées froides & humides, pour lors trouvant son contraire, elle fait un effort pour sortir de prison; ce qui forme le formidable bruit qui se fait entendre sur nos têtes; & l'agitation qu'elle fait dans ce mouvement furieux, fait écarter la nuée, & par la collision nous fait entendre ce que nous appellons tonnerre. Le feu s'allume par la violente agitation de ces deux corps, & il peut être aussi allumé par l'ardeur du Soleil avant que d'y être emprisonné; & cela peut encore arriver par la chute de quelque étoile, qui viendra à finir sa course sur cet amas de matiere susceptible de flamme.

On objectera peut-être que souvent l'on entend le tonnerre gronder, lors même que le tems est très-serain; ce qui paroît prouver que ce ne sont point ces exhalaisons enfermées dans les nuages qui forment le tonnerre. L'Auteur répond, qu'il falloit absolu-

ment qu'il y eût des nuages qui ne fussent pas éloignés , dans lesquels étoient emprisonnées ces exhalaisons, qui s'agitoient avec une extrême violence.

L'Auteur distingue trois sortes de tonnerres. Si les exhalaisons sont formées de matieres sulfurées, huileuses & bitumineuses , pour lors leur effet est de brûler & de noircir , mais non pas de rompre. Si elles procedent d'une matiere sulfurée & nitreuse , pour lors il se fait un grand bruit ; elles fracassent tout ce qu'elles rencontrent , & il se forme une pierre de ce soufre & de ce salpêtre , fixée par quelque esprit astringent qui s'y trouve , étant pressée vivement entre ces deux nuages. S'il y a quantité de sel volatile , & s'ils abondent en cet esprit pénétrant , vitriolique & calcinant , ils calcinent la lame d'une épée dans son fourreau , & fondent de l'argent dans une bourse , sans que le fourreau ni la bourse soient brûlés , ni offensés. Ces esprits n'agissent que contre ce qui leur fait le plus de résistance , comme on le voit dans l'expérience de l'eau forte , qui

grave & mange le fer , sans altérer ni toucher la cire.

C'est dans la troisième région de l'air que s'engendrent les comètes , & quelquefois bien au-dessus. La matière dont nous avons parlé , est aussi celle des comètes. Les exhalaisons en sont extrêmement huileuses, grasses & visqueuses , & même en plus grande quantité ; ce qui est cause que le feu agit plus long-tems sur cette matière humide , mais néanmoins très-combustible. Il faut pourtant que parmi cette vapeur onctueuse , il y ait quantité d'esprits terrestres & bitumineux qui retiennent la flamme.

Les comètes s'offrent sous différentes formes , en étoiles chevelues & barbues , en forme d'épée & de hache à courte & longue queue , & en telles manières qu'il plaît au hazard & à la forme de la matière.

Si le Soleil est directement opposé à ces comètes , & qu'il darde avec force sur cette matière , il fait paroître des rayons visibles : par une radiation singulière en forme de chevelure , de barbe , ou autre chose , selon que la

matiere est rare & serrée. Si ces comètes sont à queue , c'est que le Soleil porte ses rayons visibles sur une matiere propre à les recevoir ; ce qui fait paroître la queue.

Il faut bien que cette queue que nous voyons ne soit pas enflammée , parce qu'elle brilleroit autant que la forme de l'étoile qui paroît à son commencement ; & pour preuve de cela , c'est que la queue est plus large à la fin qu'au commencement ; ce qui fait voir que ce n'est qu'une radiation. Si c'étoit un feu allumé , le principe du feu est de monter ; par conséquent le commencement seroit plus large & la fin plus étroite , en maniere de pyramide.

Mais si c'étoit un globe , qui recevant la lumiere du Soleil , la reproduisît par une longue suite qui formât cette queue , sur quoi cette radiation se formeroit-elle ? La réponse de l'Auteur est , qu'il y a quantité de cette matiere non encore enflammée , qui est à l'entour de ce globe de feu qui paroît comme une étoile sur quoi la réverbération du Soleil se forme ; &

le Soleil dardant ses rayons sur les parties les plus resserrées , renvoie une longue réflexion en forme de queue. La preuve de la réflexion est évidente , puisque si le Soleil est d'un côté , la queue est toujours de l'autre ; de sorte qu'on voit manifestement qu'elle prend la lumière de lui.

On objectera sans doute, que la lumière du Soleil ne peut pas être réfléchie sur un corps allumé , & tout à fait embrasé ; ce qui est vrai : mais ce globe allumé qui aux yeux paroît une étoile , ne l'est qu'en de certaines parties , & ne s'embrase pas si facilement qu'il le feroit dans la basse région de l'air , parce qu'il est proche de son élément ; de-là vient la longue durée des comètes.

Elles ont trois mouvemens. Le premier , d'Orient en Occident , comme les étoiles. Le second , d'Occident en Orient , à peu près comme Vénus. Et le troisième est d'une latitude incroyable , vers le Septentrion ou le Midi.

On demande si les comètes sont quelquefois au-dessus de la Lune.

Quelques-uns sont pour la négative; mais il semble qu'il n'y ait aucune difficulté à soutenir le contraire, puisqu'au-dessus de la Lune la matière est assez rare, pour qu'elle laisse un libre passage aux comètes. Nous pourrions ajouter pour seconde preuve, les courses immenses que les comètes font en très-peu de tems.

L'extraordinaire du Mercure pour le quartier d'Avril 1681. Tome XII. page 96.



ARTICLE II.

Dissertation sur le feu Boréal.

LE feu Boréal est un amas d'exhalaisons nitro-sulfureuses répandues dans l'air vers le Nord , où le reflux de l'air les a accumulées , lesquelles n'étant renfermées dans aucun nuage sensible , représentent à nos yeux une admirable alternative de lumière & d'obscurité , après avoir été embrâsées , soit par le mouvement naturel des esprits de nitre , soit par les vents contraires , soit enfin par le reflux de l'air.

De cette définition l'on tire huit conséquences. La première , que les feux Boréaux doivent paroître ordinairement après l'équinoxe d'Automne , parce que c'est vers ce tems-là que le Soleil quitte notre pôle , & que l'air commence à refluer vers la partie Septentrionale.

La seconde , que le reflux de l'air d'un pôle à l'autre donne occasion à

divers embrâsemens , selon que la quantité d'exhalaisons qu'il a ramenées est considérable ; en sorte que ceux qui paroissent les premiers , doivent toujours être les plus vifs & les plus lumineux, comme trouvant beaucoup plus de nourriture que ceux qui arrivent après.

La troisième est , que les hyvers secs doivent être regardés comme des présages presque assurés de quelques feux boréaux , parce qu'en premier lieu de tels hyvers dénotent , que les soufres & les nitres de l'air sont plus épurés de vapeurs terrestres , & en second lieu , que des hyvers de cette nature sont ordinairement accompagnés de quelques petits vents de Nord , capables de refouler les vapeurs dont il s'agit, & de les embrâser par ce refoulement.

La quatrième est , que la lumière du feu Boréal doit toujours prendre son origine dans la région Septentrionale.

La cinquième est, que ce qui arrive sous un pôle , peut en son tems arriver sous un pôle opposé.

La sixième , que la lumière du jour

doit nous cacher ces feux , qui alors ne feroient apperçus que de ceux qui habitent sous un même Méridien , & sous les points opposés d'un même parallele de latitude ; enforte que la différence de leur longitude est toujours de cent quatre-vingt degrés , quoiqu'ils soient en même zone , en même climat , & en même élévation de pole.

La septième est , que les peuples qui n'ont que très-peu , ou qui n'ont point du tout d'élévation de pôle , tels que ceux qui habitent sous la Zone Torride , ne doivent point appercevoir la lumiere du feu boréal , cette lumiere ne pouvant tout au plus être à leur égard , que comme celle du crépuscule.

La huitième enfin est , que les vents qui soufflent du Nord entre l'équinoxe d'Automne & l'équinoxe du Printems , doivent être extraordinairement froids , parce que , dans cet intervalle de tems , l'air abonde en un sel de nitre , dont les particules sont autant de petits aiguillons , qui picotent la chair , & lui causent par ce picotement le sentiment du froid.

Voici comment l'Auteur explique ce flux & ce reflux de l'air , sur lequel son système est appuyé.

Lorsque le Soleil éclaire une contrée , ses rayons ne peuvent tomber sur la terre sans traverser la masse de l'air ; & quand ils sont tombés sur cette terre , ils réfléchissent plus ou moins , selon qu'ils ont plus ou moins de force. Or ces rayons ne peuvent passer & repasser ainsi dans l'air , sans communiquer une partie de leur pirouettement à la masse de l'air la plus proche de la terre , laquelle masse est plus à portée de recevoir l'action des rayons réfléchis.

Ces petits corps aériens étant ainsi contraints de pirouetter , se choquent & se chassent les uns les autres : puis se trouvant plus au large , ils se déplient , se redressent & s'étendent autant qu'il est possible ; ce qui ne se peut faire qu'une portion considérable de cet air ne s'écoule au loin , & ne soit portée hors de l'horison , c'est-à-dire , vers les contrées que le Soleil n'échauffe point alors : d'où il suit , qu'une grande quantité des parties , qui avant d'être raréfiées étoient contenues dans

un certain horison , ne peuvent plus y être renfermées , lorsque le Soleil les a dilatées. Ces parties d'air sont donc obligées , pour la plûpart , de se retirer par tous les points du cercle horisontal , principalement si le Soleil éclaire à plomb le centre de l'horison , en répondant perpendiculairement au point vertical. Cela posé , lorsque le Soleil disparoît de l'horison , & que ses rayons n'ont plus , ou n'ont que très-peu de force & d'action , les particules de l'air cessent peu à peu de pirouetter , & se rapprochent insensiblement les unes des autres ; mais comme elles sont trop flexibles pour pouvoir soutenir l'effet , que l'air qui s'étoit écoulé dans les environs fait pour refluer , elles se resserrent , se replient , se condensent , & donnent par ce moyen à l'air froid l'occasion de revenir & de *s'ébouler* vers les endroits où il trouve moins de résistance , qui sont les climats que le soleil quitte.

Il y a là-dessus quatre observations à faire. La première , que cet effort de l'air froid n'est autre chose que sa pesanteur , qui le pousse vers le centre de la terre. La seconde , que l'air

qui revient , n'est pas toujours celui que la chaleur a écarté ; mais que c'est presque toujours celui qui est supérieur , c'est-à-dire , le plus éloigné de la réflexion des rayons solaires. La raison en est , que cet air étant moins raréfié que celui qui est voisin de la terre , il *s'éboule* naturellement par des lignes différentes sur celui qui est dessous. Or cet *éboulement* fait qu'un air voisin prend la place de celui qui *s'éboule* ; ce qui forme une espèce de circulation dans cette partie de l'atmosphère. En un mot , la raréfaction causant une espèce de vuide dans l'air inférieur , oblige l'air supérieur à s'affaisser par son propre poids , & à venir occuper ce vuide.

La troisième observation est , que l'air supérieur , quoique très - éloigné de la terre , & par conséquent hors d'état d'être beaucoup échauffé & fermenté , ne laisse pas de l'être suffisamment eu égard à l'autre air supérieur qui n'est pas éclairé du Soleil , & qui répond à une autre contrée ; en sorte qu'il doit se faire , dans cette partie de la masse élémentaire , un changement à peu près semblable à

à celui qui arrive à l'air inférieur.

La quatrième & dernière observation est, 1^o. Que ce flux & reflux de l'air ne peuvent se faire sans causer un peu de vent, selon que la raréfaction a été plus ou moins grande. 2^o. Que c'est à cette fermentation & à cet *éboulement* de l'air, qu'on doit attribuer plusieurs vents réglés & périodiques, tel, par exemple, qu'est celui qui sous la Zone Torride souffle tous les matins d'Orient en Occident, & celui qu'on éprouve par tout avant le lever du soleil.

Si le flux & le reflux de l'air, dans les Equinoxes, n'est point absolument sensible, on ne doit pas s'en étonner, & il n'en est pas pour cela moins réel. Il en est comme de celui de la mer, qui n'est point sensible à ceux qui voguent sur les ondes & loin du rivage, quoique ceux qui sont sur les côtes en apperçoivent parfaitement les mouvemens & les différences.

Notre Auteur finit sa Dissertation par une conclusion générale, qui se réduit à ces quatre articles. 1^o. Qu'on peut admettre dans la masse de l'air un flux & un reflux d'un pôle à l'autre,

lequel arrive au pôle arctique dans le tems des Equinoxes, c'est-à-dire, le flux à l'équinoxe du Printems, & le reflux à celui de l'Automne. 2°. Que le Soleil, par ses rayons, peut être la cause du flux & du reflux de l'air, comme la Lune, par le pressement de son tourbillon, peut être la cause du flux & du reflux de la mer; avec cette différence, que la mer paroît deux fois haute & basse dans l'espace de 24 heures, & que l'air ne flue & ne reflue qu'une fois tous les ans. 3°. Qu'on peut attribuer au reflux de l'air vers le pôle la quantité prodigieuse d'exhalaisons qui s'y ramassent, & s'y embrasent en Automne & en Hiver. 4°. Que c'est dans cet embrasement que consiste la nature du feu boréal.

*Journal des Sçavans, Novembre
1733. page 653.*



ARTICLE III.*Sur la cause & la nature du Tonnerre & des Eclairs.*

IL y a, selon le P. Dufesc Auteur de cette Dissertation, une si grande ressemblance entre les effets du tonnerre & ceux de la poudre à canon, que l'on ne peut presque point douter que leur nature ne soit à peu près la même. La poudre à canon venant à s'enflammer, donne une lumière très-vive qui se dissipe en un instant ; & lorsqu'elle s'enflamme dans un lieu étroit, elle produit un bruit très-considérable. La poudre à canon fait sauter les tours & les murailles, brise & renverse tout ce qui la resserre, répand au loin une grande puanteur ; en sorte qu'on peut la regarder comme un tonnerre artificiel.

L'on peut conclure de-là, que la matiere du tonnerre, est une matiere saline, sulfureuse, de-même que celle de la poudre à canon ; & ce qui sem-

ble encore prouver que cette matiere est la même , c'est que , selon les plus exactes observations des Chymistes , les corps combustibles ne sont combustibles que par les sels & les soufres qui les composent , quoique cependant tous les corps où entrent ces principes , ne soient pas pour cela inflammables , cette disposition à s'enflammer dépendant de la maniere dont les principes sont combinés , préparés & mêlés.

Les soufres & les sels étant donc le fond de la poudre à canon , il y a toute apparence qu'ils le sont aussi de la matiere du tonnerre. Mais quelle est la nature de ces sels , & par quelle préparation deviennent-ils capables dans la poudre à canon de produire les effets surprenans qu'ils produisent ? C'est ce qu'il faut expliquer.

Le sel nitre qui entre dans la poudre , contient beaucoup d'esprits acides volatils. Le soufre & le charbon donnent une huile très-subtile ; mais ni le nitre , ni le soufre , ni le charbon pris séparément , ne sont point capables de produire les effets qu'ils produisent dans la poudre à canon.

En effet le nitre mis sur un feu ardent fond ; mais il ne s'enflamme pas , & il ne fait aucune détonation , à moins qu'on n'y mêle du charbon pulvérisé. Le soufre fond de-même au feu ; il s'y élève en fleurs , se consume peu à peu en jettant une petite flamme bleue : quant au charbon pulvérisé , il ne prend feu que par parties , & s'éteint aussi-tôt. Quest-ce donc qui rend dans la poudre à canon ces trois substances capables des effets qu'elles produisent ? C'est la préparation particulière qu'elles reçoivent. On les mêle ensemble dans une certaine proportion ; on les arrose avec de l'eau ou de l'esprit de vin ; on les pile dans un mortier pendant 24 heures ; on les humecte enfin de nouveau ; on tamise enfin toute cette matiere , & on la passe par un crible pour la grener : mais avant toutes choses on a soin que le nitre que l'on y emploie , soit bien rectifié , & le soufre bien écumé.

Toutes ces préparations doivent aboutir à rendre la poudre à canon capable des divers effets qu'on y remarque. 1^o. En rectifiant le salpêtre & en écumant le soufre , on dépouille

l'un du sel fixe qu'il contient , & l'autre des parties terrestres qui y sont mêlées ; ce qui met ces deux matieres en état de se raréfier. 2^o. En ajoutant du charbon pulvérisé , on fournit une matiere huileuse très-subtile , très-inflammable , & dont les parties légères & spongieuses contiennent beaucoup d'air & de matiere éthérée. 3^o. En broyant toutes ces substances pendant long-tems , on fait qu'elles se mêlent & s'incorporent plus intimément les unes avec les autres. 4^o. En les arrosant avec de l'eau ou avec de l'esprit de vin à mesure qu'on les pile , on en lie davantage les parties , qui formant par cette liaison un corps visqueux , enferment beaucoup d'air entr'elles , & l'y arrêtent comme dans des entraves , d'où il ne peut se dégager. 5^o. En criblant cette poudre , on produit deux effets dont l'utilité est manifeste pour lui donner sa force. Le premier est , qu'il se forme des grains de toute cette matiere , laquelle par conséquent admet de grands intervalles pleins d'air. Le second , que la substance de chaque grain devenant , par le moyen du crible plus serrée & plus

pressée , met plus à l'étroit l'air qu'elle renferme , & l'empêche davantage de s'échapper lorsqu'elle vient à secher ; en sorte que chaque grain de poudre , & chaque partie d'air qui se trouve entre les grains , doivent être regardés comme autant de petits ballons , tout prêts à se dilater avec violence au moment qu'un ferment tel que le feu , viendra détruire la force qui contrainst leur ressort.

Le feu le plus puissant de tous les ferments , venant à secouer & à désunir les petites parties des grains où il tombe , délivre l'air qui s'y trouve renfermé : cet air ainsi mis en liberté , se dilate avec force ; & par cette dilatation faisant ensuite dilater ou bouillonner avec lui les parties désunies , il arrive que celles-ci secouent & désunissent tout de - même , par leur mouvement , les petites parties des corps voisins : ces dernières secouées par celles-là , doivent bouillonner encore ; & ainsi tout l'air enfermé dans les grains , & celui qui occupoit les intervalles semés entr'eux , ne trouvant plus rien qui le retienne , se débande de tous côtés & presque à

la fois. La matiere éthérée agissant en même-tems de toutes ses forces sur toutes ces particules désunies de proche en proche les unes par les autres, fait bouillonner avec elle toute cette matiere fondue, & la détermine à prendre un mouvement de tourbillon très-véhément; d'où résulte la lumiere de la poudre embrasée, la raréfaction subite, & l'explosion de tous les corps qui s'opposent à cette raréfaction.

Selon l'Auteur, la matiere du tonnerre est composée de sels essentiels & volatils, de soufres ou d'huiles parfaitement raréfiés, les uns & les autres de différentes espèces; & ces principes, on doit s'attendre qu'ils auront encore plus de force dans le tonnerre, s'ils n'entrent dans sa composition, que lorsqu'ils sont parfaitement dégagés de toute matiere étrangere. Aussi le feu du tonnerre est plus pénétrant que celui de la poudre, & il produit des effets dont la poudre embrasée ne sauroit être capable.

Tout le monde sait, que parmi les exhalaisons que la chaleur centrale de la terre & la chaleur extérieure du
Soleil,

Soleil font sans cesse élever, il y a quantité d'exhalaisons salines & d'exhalaisons sulfureuses. Ces exhalaisons, de même que les vapeurs, ne montent que par le mouvement de tourbillon qu'elles reçoivent de la chaleur : c'est ce mouvement qui les rend plus légères qu'un égal volume d'air, parce que la force de leur mouvement tourbillinaire agissant en tous sens, résiste à celle qui les pousse en bas, de sorte qu'elles ne recommencent à retomber, que lorsque *le tourbillonnement* diminue à un certain point, ou périt tout à fait ; & même elles ne tombent pas toujours alors, la moindre agitation de l'air suffisant pour arrêter leur chute. Ainsi, selon notre Auteur, les globules des vapeurs & les globules des exhalaisons répandues dans l'air, sont autant de tourbillons tout prêts à se dilater, mais retenus en violence par la force de l'air qui les environne.

Le P. Dufesc, après un grand nombre de raisonnemens sur les divers tourbillons qui se forment dans l'air lorsqu'il est rempli de nuées, observe

avec les Chymistes , que si on mêle de l'esprit de nitre avec de l'esprit de vin , la liqueur s'échauffe de telle manière en moins d'une heure , qu'on ne peut y souffrir la main , & que si le vaisseau est bouché , les vapeurs qui s'en élèvent, font sauter le bouchon , ou cassent le vaisseau. Il observe encore que l'esprit de nitre bien pur & bien déflégré , mêlé avec de l'huile essentielle de quelque plante aromatique , peut s'échauffer au point de s'enflammer. De ces expériences l'on doit conclure , que les acides mêlés avec les soufres peuvent s'échauffer extraordinairement ; & que si les uns & les autres sont bien purifiés , ils ne pourront manquer de s'enflammer lorsqu'ils seront mêlés ensemble. Ainsi les sels & les soufres , aussi parfaitement purifiés qu'ils le sont dans les nues , venant à se mêler ensemble d'une certaine manière , doivent incessamment prendre feu , & s'enflammer avec violence. Or de même que la poudre à canon éclate , lorsque le bouillonnement de ses petites parties est devenu assez fort pour

prévaloir aux obstacles qui s'opposent à sa prompte raréfaction : de même la matiere du tonnerre éclate , lorsque ses petits tourbillons sont devenus assez forts pour vaincre tous les obstacles , ce qui demande un certain tems ; parce qu'afin qu'un tourbillon éclate , il faut qu'il acquiere assez de force , non-seulement pour vaincre les tourbillons voisins , mais encore pour vaincre avec ceux-là tous les autres tourbillons de la nuée , puisqu'il butte contre tous ; & voici comment tout cela s'accomplit.

Tandis que le *tourbillonnement* , ou le ressort général d'un grand tourbillon croît incessamment par l'augmentation continuelle de la vitesse de ses petits tourbillons , les grands tourbillons qui sont auprès , se déchargent à leur tour de leurs vapeurs ; ce qui diminue d'abord leurs forces , parce que ce qui leur reste de petits tourbillons pouvant se dilater vers l'espace abandonné par ces vapeurs , ils agissent moins au dehors. Le tourbillon de la matiere du tonnerre étant donc moins pressé à cause de cette diminution de

force dans les tourbillons voisins , & sa propre force ayant d'ailleurs considérablement augmenté , son ressort se débande , ou agit d'abord assez librement ; & par l'accélération de la dilatation devenant très-supérieur au peu d'obstacles qui reste , il éclate enfin avec un grand fracas de tourbillons voisins ; ce qui ne se peut faire sans un grand bruit , à cause de la prompte & violente compression de tout l'air environnant.

: C'est alors que cette matiere devient parfaitement lumineuse : jusques-là ses petites parties étoient trop gênées dans leur mouvement ; elles ne pouvoient acquérir la vitesse nécessaire à la production d'une lumiere bien vive , ni former des tourbillons assez réguliers pour cela. Mais quand elle éclate , comme elle nâge dans une grande quantité de matiere éthérée , & avec une grande liberté , ses petites parties prennent tout le mouvement nécessaire pour former un feu très-ardent & très-brillant. Du reste , quand ce tourbillon éclate , les portions de la matiere subtile du tonnerre

qui n'avoient pas encore reçu toute la préparation nécessaire , sont dispersées toutes en feu , & suivent le cours des deux courans d'air qu'elles rencontrent ; c'est ainsi qu'elles serpentent dans la nuée , & que l'éclair se partage en différentes branches.

Voici , selon l'Auteur , ce qui peut donner occasion aux ravages du tonnerre. Si des courans d'air opposés , mais non pas dans la même ligne , viennent à rencontrer en assez grande quantité les tourbillons voisins de celui qui renferme la matiere du tonnerre , avant qu'elle soit entièrement prête à éclater , ces courrans détermineront les tourbillons à circuler rapidement autour de cette matiere. Ces tourbillons ne pouvant rouler si rapidement autour de celui qui porte la matiere du tonnerre , qu'ils ne forment des tournans d'air , tantôt plus longs , tantôt moins , selon la vitesse & la grandeur des tourbillons , il faut nécessairement que l'axe de ces tournans tombe sur la terre , si le plan de la circulation est parallele à l'horison. Or comme il n'y a point d'air le long de l'axe

de ces tournans , & que leurs côtés résistent extrêmement , (ce qui se prouve , tant parce qu'ils soutiennent tout le poids de l'atmosphère , que par la force surprenante des colonnes de nuées , qui arrachent les arbres , & renversent les maisons) ils forment comme un long canon. Cela supposé , la matière du tonnerre venant alors à éclater , doit couler pour la plus grande partie le long de ce canon , & y couler avec une extrême rapidité , parce qu'elle ne trouve rien qui puisse retarder son mouvement de ce côté-là. Arrivant donc ainsi à terre & en grande quantité , elle y doit produire tous les effets sensibles dont on a un si grand nombre d'exemples. Au reste , il est facile de voir par cette explication , que lorsque le premier tourbillon éclate , il doit quelquefois éloigner de lui les tourbillons voisins , quelquefois les partager , & quelquefois en précipiter l'éclat. Dans le premier cas , les tourbillons en leur entier vont çà & là à diverses distances , où achevant de se disposer à éclater , ils éclatent enfin à leur tour , & un peu au loin.

Dans le second, les portions séparées forment de nouveaux tourbillons, mais plus petits, qui éclatent aussi lorsque leur matiere a reçu la préparation nécessaire. Dans le troisiéme, on voit arriver à la fois, ou presque à la fois, deux ou trois éclairs, deux ou trois coups de tonnerre.

Les effets du tonnerre peuvent être divisés en trois classes. La premiere, comprend les phénomènes inséparables du tonnerre, tels que sont l'éclair & le bruit. La seconde, les circonstances ordinaires du tonnerre, comme d'être presque toujours accompagné de pluie, de grêle, de vents. La troisiéme, les effets qu'il produit lorsqu'il tombe sur la terre, tels que sont quelquefois de tuer sans qu'il paroisse aucune blessure, de calciner les os sans en dommager la chair, de renverser de grands quartiers de muraille, de mettre en éclats les pierres les plus dures, de fondre l'or & l'argent dans une bourse sans toucher à la bourse.

L'Auteur pour préparer l'esprit des lecteurs à l'explication de ces divers phéno-

menes, commence par faire observer, que toutes sortes de matieres enflammées ne brûlent pas toutes sortes de corps. On fait une poudre toute semblable à la poudre à canon pour la couleur & le grain, laquelle brûle le papier & éteint un charbon ardent. Le célèbre feu Grogeois brûloit dans l'eau. On sçait les effets surprenans du Phosphore de Kunkel : il brûle les corps qui résistent aux feux ordinaires, & il épargne les autres; il conserve toute sa force dans l'eau, & il la perd entierement dans l'esprit de vin. Sa flamme est si subtile, qu'elle pénètre le papier sans le brûler, à moins qu'on ne rende le papier cotonneux, en le grattant un peu avec la pointe d'un couteau. Les acides du nitre & plusieurs eaux fortes dissolvent certains métaux, comme le fer, l'argent, le cuivre, mais ne dissolvent pas l'or. L'esprit de sel marin & les eaux régales dissolvent l'or, & ne dissolvent pas l'argent; tous les autres acides, comme l'esprit de vinaigre, dissolvent les moindres métaux. Il y a sans doute d'autres soufres & d'au-

tres sels inconnus à la chymie , mais parfaitement connus à la nature , qui ne font aucune impression sur les matieres les plus combustibles , & qui embrâsent les corps les plus durs ; parce que ces soufres & ces sels extrêmement subtils traversent aisément les pores trop larges de ces matieres combustibles , & ne trouvent pas la même liberté à travers les pores étroits des corps durs. Cela une fois établi , il est facile d'en faire l'application au tonnerre.

Par le Pere du Fesc Jésuite , Journal des Scavans , Septembre 1727. page 332.



ARTICLE IV.

Explication de divers Phénomènes ; où Effets singuliers de l'eau & des exhalaisons.

C'Est l'eau pure, ou du moins l'eau faisant la plus grande partie d'autres liqueurs, qui rafraîchit l'homme, & le préserve de la mort. Elle rend les mêmes services à presque tous les autres animaux. C'est par elle aussi que les terres deviennent fertiles ; & les plantes & les fruits lui doivent leur accroissement & leur goût. Une expérience faite par un célèbre Physicien démontre, combien l'eau sert à aggrandir les plantes. Ayant fait sécher dans le four deux cens livres de terre, & l'ayant ensuite arrosée d'eau de pluie, il y mit une branche de saule de cinq livres, qui en cinq années étoit devenue un arbre de 169 livres, sans compter les feuilles qui en étoient tombées pendant tout ce tems. Ayant ensuite séché & pesé cette terre de nouveau, il ne la trouva diminuée que

de deux onces. C'est de la même manière que de grands arbres s'élevent d'entre des rochers stériles, & qu'ils tirent de l'eau seule tout leur bois.

Il suit de - là que les animaux mêmes doivent la plus grande partie de leur substance à l'eau ; puisque les plantes & les fruits dont ils se nourrissent, tirent leur substance du même élément. Un grand nombre d'expériences nous enseigne même que l'eau peut se changer en terre ; & il est fort probable qu'il y a des pierres & des minéraux qui ont la même origine.

Il paroît d'abord difficile de comprendre, comment les exhalaisons de l'eau peuvent s'élever dans l'air, qui surpasse l'eau de beaucoup en légèreté. Voici, selon l'Auteur de cette Dissertation, l'explication la plus probable que l'on puisse donner de ce phénomène. On voit par plusieurs expériences, qu'une matière plus subtile & plus légère peut s'attacher à des corps plus pesans & plus solides : si de cette manière du feu s'attache à des parties d'eau, il peut faire avec elles un corps composé plus léger que l'air, tout de-même qu'un morceau de fer

joint à du liége devient plus léger que l'eau , & y surnage.

Il est sûr , selon les regles de l'Hydrostatique , que pour qu'un corps s'éleve dans une liqueur , il faut qu'une partie de cette liqueur égale à ce corps l'excède en poids ; qu'il faut que le contraire arrive pour que ce corps descende ; & qu'il demeurera suspendu sans monter & sans descendre , quand cette liqueur , dans une partie égale à ce corps , aura la même pesanteur que lui.

Or l'air qui est le plus proche de la terre étant pressé par l'air supérieur , se resserre , occupe moins de place , & par conséquent doit surpasser en pesanteur l'autre air , dont le poids diminue à mesure qu'il est plus élevé , & qu'il a moins de poids à soutenir. Ceci étant posé , il arrivera que les exhalaisons composées de parties d'eau & de feu , & plus légères que l'air inférieur , s'élèveront jusqu'à ce qu'elles rencontrent un air d'un poids égal à l'air , & qu'elles y demeureront suspendues dans un parfait équilibre.

A présent , si deux vents soufflent de deux côtés sur ces exhalaisons , ils

les resserrent , augmentent leur pesanteur , & les font descendre par gouttes : un seul vent peut faire le même effet , quand il pousse les nuages vers un air plus élevé & plus léger ; alors les parties de feu se détachent de celles d'eau avec plus de facilité , & ces exhalaisons devenues plus pesantes , ne peuvent plus être soutenues par l'air.

La même chose arrive encore quand l'air se refroidit tout d'un coup , & fait descendre les exhalaisons en pluies ou en brouillards , de la même manière que dans certaines distillations on réduit ces exhalaisons en liqueur par le moyen de l'eau froide. Malgré ces loix admirables , qui dirigent les exhalaisons au bien du genre humain , elles nous seroient inutiles , si le sel de la mer y restoit attaché. On meurt de soif au milieu de l'Océan ; mais heureusement , quand l'eau salée s'élève en vapeurs , le sel reste au fond , comme il paroît dans tous les endroits où l'on fait du sel de l'eau de la mer.

Il est d'abord difficile à comprendre , comment les exhalaisons peuvent rendre fertiles certaines Isles qui sont

sous la Zone Torride. On sait que le Soleil est réfléchi avec plus de force par la terre que par la mer. Il suit de-là, que l'air qui est au-dessus de la terre étant le plus chaud, les exhalaisons, plutôt que de tomber sur ces Isles, devraient plutôt tomber dans la mer qui les environne. Les hautes montagnes qui se trouvent dans ces Isles, remédient à cet inconvénient. Les vapeurs de l'eau s'y rassemblent, & en découlent ensuite comme des ravines, & comme de petites rivières, elles suppléent au défaut des pluies. De grands Philosophes attribuent à l'assemblage seul des exhalaisons sur les montagnes les fleuves qui y ont leur source, & qui rendent fertiles les terres les plus arides. C'est ainsi que l'Egypte, qui sans ce secours seroit le Pays le plus stérile, doit aux fameuses montagnes de la Lune les eaux du Nil, qui se déborde d'une manière si merveilleuse, & qui par-là fait plus de bien aux terres, que n'en feroient des pluies fréquentes.

On peut donner plusieurs raisons très-claires, pourquoi les montagnes extrêmement hautes rendent à la

nature un service si important. Elles servent de barrières aux nues, qui se heurtant, se compriment davantage, & par-là sont forcées par leur pesanteur à tomber. Quoique les vents paroissent y être d'un grand usage en portant les exhalaisons de ce côté-là, il est pourtant constant que quand même l'air est le plus tranquille, les sommets des montagnes sont couverts d'exhalaisons. La raison en est, que l'air y est plus froid, & parce que les rayons réfléchis de la terre ne montent pas si haut, & parce que les montagnes, toujours couvertes d'ombre d'un de leurs côtés, sont de ce côté-là à l'abri des rayons directs. Nous avons déjà vû, qu'un air plus chaud se dilate & se meut vers un air plus froid avec lequel il a communication. Il s'ensuit que l'air qui est à l'entour des ombres d'une montagne, doit se mouvoir vers elles avec les exhalaisons qu'il contient; & que cet air y perdant une partie de son élasticité par le froid qui y regne, doit être toujours suivi de l'air le plus prochain, plus chaud & plus élastique; & par conséquent, que par succession, les montagnes doivent

être continuellement arrosées , sans même qu'un vent sensible y contribue.

Ceux qui n'ont pas examiné ces sortes de matieres , trouveront de la difficulté à comprendre , que les exhalaisons qui tombent , soient capables de former un si grand nombre de vastes rivières. Notre Auteur ne s'attache pas à réfuter les Philosophes , qui croient que les eaux de la mer entrant dans les cavités de la terre , s'y défont de leur sel par filtration , ou bien , qu'élevées en vapeurs par un feu souterrain , elles se condensent en se refroidissant , & forment ainsi les sources des fleuves. Il se contente de prouver , que les exhalaisons sont plus que capables de produire une quantité d'eau si considérable.

Par des observations soigneuses , qu'on a faites à Lille & à Paris pendant six ans , on a vû que chaque année , l'une portant l'autre , la pluie auroit couvert les campagnes à la hauteur de 21 pouces , s'il étoit possible qu'elle n'entrât pas dans le terre , & ne se dissipât point par des exhalaisons. Si la même chose arrive à peu près toutes les années partout , il est clair
que

que cette quantité d'eau peut facilement fournir à toutes les rivières du monde. C'est-là un effet de la sagesse divine, qui a voulu que dans la terre il y eût des abîmes capables de contenir ce vaste océan; que le sel le préservât de corruption; que ses rives fussent plus bas que le reste de la terre, afin de donner une pente facile aux rivières, qui sans cela inonderoient toute la surface du monde.

Par M. de Nieuwentyt, Journal Littéraire de la Haye pour l'année 1716. seconde Partie, page 266.



ARTICLE V.

Dissertation physique sur la nature des Exhalaisons & des Vapeurs, sur la formation des Brouillards, de la Pluie, de la Grêle, de la Neige & du Serein.

TOut le monde convient, que les exhalaisons & les vapeurs sont la matière de la plupart des météores. Les nouveaux Philosophes ont tâché d'expliquer en détail comment chaque météore en étoit formé ; mais il semble qu'ils n'ont pas assez approfondi la nature des exhalaisons & des vapeurs, d'où néanmoins dépend tout le reste.

On appelle *Vapeurs*, les petites parties de l'eau qui se mêlent dans l'air, & qui quelquefois s'y élèvent fort haut ; & l'on nomme *exhalaisons*, les parties de la terre qui montent de la même manière. On n'a pas de pei-

ne à concevoir, pourquoi l'eau & la terre envoient continuellement vers le Ciel des vapeurs & des exhalaisons. Il est impossible que la matiere subtile passe continuellement, comme elle fait, à travers les pores de l'eau & de la terre, & qu'elle n'en détache plusieurs parties, & les mette en mouvement, surtout lorsque cette matiere subtile est elle-même fort agitée à cause de la chaleur du Soleil ou des feux souterrains. Or il est naturel, que ces parties de l'eau & de la terre ainsi détachées de leur masse & mises en mouvement, montent & soient portées en haut, de la même manière que la poussiere s'élève en l'air, pour peu qu'on l'agite & qu'on la remue; mais comme nous voyons que la poussiere qui a été élevée par le mouvement qu'elle a reçu, retombe bientôt par son propre poids, il semble aussi que les exhalaisons & les vapeurs devroient pareillement retomber sitôt qu'elles ont perdu leur mouvement. Cependant nous éprouvons que les nues, qui sont un amas de vapeurs & d'exhalaisons, demeurent très-long-tems suspendues en l'air;

qu'elles y demeurent même lorsqu'elles paroissent en repos & que le tems est calme : qu'est-ce qui peut alors les soutenir & les empêcher de tomber ?

On dit communément, que les vapeurs qui composent une nuée étant attachées & comme collées les unes aux autres, ne font qu'un corps, qui doit aisément se soutenir en l'air à cause de l'étendue immense de sa surface. Mais on demande si les vapeurs qui font la nue, sont plus fortement liées les unes avec les autres, que les parties de l'eau ordinaire. Or il est certain que l'air mis au fond de l'eau la divise sans peine, se fait un passage au travers, & prend le dessus. Pourquoi donc l'air qui est au-dessous de la nuée, ne la perce-t-il pas en plusieurs endroits pour s'élever au-dessus, s'il est vrai que cet air est de soi plus léger que la nuée ?

Quelques-uns disent, que les vapeurs qui composent les nuées sont glacées : d'où il s'ensuit, qu'elles résistent beaucoup plus à leur division ; mais outre qu'on se persuade difficilement, que pendant les plus grandes chaleurs de l'Été le froid soit toujours

assez grand dans la moyenne région de l'air pour y faire de la glace, voici encore une difficulté considérable à résoudre. Les nuées ont quelque épaisseur ; & comme elles sont formées de vapeurs que le vent & le pur hazard rassemblent, leur épaisseur ne sauroit être égale partout : ainsi pour peu qu'un côté soit plus pesant que les autres, la nuée ne demeurera plus dans la situation horisontale. Le côté le plus pesant l'emportera, & entraînera tout le reste insensiblement jusqu'à terre, à moins qu'un vent violent ne le soutienne.

Pour éviter ces difficultés & plusieurs autres, il faudroit imaginer un système, dans lequel les vapeurs fussent d'elles-mêmes plus légères que l'air au-dessus duquel elles s'élèvent. En ce cas, on comprendra aisément & comment elles montent, & comment, après qu'elles sont montées, elles demeurent suspendues, même dans le tems le plus calme, & lorsqu'elles paroissent être en repos. Mais en quel système peut-on soutenir que les vapeurs, qui ne sont que de petites parties d'eau, sont néanmoins plus

légères que l'air grossier au-dessus duquel elles s'élèvent ? Le voici.

On suppose que les vapeurs ne sont que de petites bulles, formées par une pellicule d'eau très-mince & très-délicate ; & que ces bulles renferment chacune plusieurs esprits ignés , ou un air très-subtil & très-raréfié. L'eau qui forme ces petites bulles , prise toute seule , est plus pesante que l'air grossier. Mais les esprits ignés , ou l'air raréfié , enfermé dans ces petites bulles , sont par eux-mêmes plus légers que cet air grossier. Il se peut donc faire aisément , que le tout composé d'eau & d'air subtil , soit encore plus léger que l'air le plus grossier ; & par conséquent qu'il soit obligé , par sa propre nature , de monter jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un air plus pur avec lequel il soit en équilibre. C'est ainsi qu'un flacon de cristal rempli d'air seulement & bien fermé , s'élève au-dessus de l'eau & y surnage , quoique le cristal seul dût être emporté au fond par sa pesanteur.

Au reste on ne suppose rien ici qui puisse être raisonnablement rejeté. L'eau , quelque pure & quelque li-

quide qu'elle soit, est cependant assez visqueuse pour former les petites bulles que nous disons, & en fait même de bien plus grosses. Sitôt que l'air passe à travers l'eau, on voit ces sortes de bulles s'élever avec vitesse vers la surface, & s'y crever aussi-tôt si elles sont un peu grosses, mais y subsister assez long-tems quand elles sont plus petites. Et les écumes, que sont-elles autre chose qu'un amas de ces petites bulles, que l'air & l'eau ont formées par leur mélange? Celles dont on parle ici doivent encore se former plus aisément, & se conserver bien plus long-tems, parce qu'elles sont infiniment plus petites.

Ces petites bulles qui sont les vapeurs, ne sont point remplies d'air grossier: car si cela étoit, elles ne s'éleveroient pas au-dessus de la surface de l'air; mais elles sont remplies d'esprit ignés, ou d'air extrêmement raréfié. Car si l'air grossier ne sauroit se mêler dans l'eau, sans que l'eau ne l'enveloppe, & ne forme aussitôt des bulles, pourquoy la même chose n'arriveroit-elle pas lorsqu'il se trouve dans l'eau des esprits de feu, ou de

l'air extrêmement raréfié? En effet, qu'on mette de l'eau bouillir sur le feu, il s'en évapore incontinent une fumée humide. Cette fumée ne peut être causée que par les esprits de feu, qui après s'être mêlés avec l'eau, s'en échappent, & en s'échappant emportent avec eux la petite pellicule qui les enveloppe, & qui les tient comme dans une prison. Par cette raison, l'eau qui bout se tarit & se consume peu à peu. Ce que fait le feu en cette occasion, la chaleur du Soleil & les feux souterrains doivent le faire aussi. C'est ainsi que montent les vapeurs.

On ne peut pas dire la même chose des exhalaisons. Comme elles sont composées de parties terrestres & peu visqueuses, & qu'elles s'élèvent principalement dans les lieux secs, elles ne sont pas composées de petites bulles comme les vapeurs: ces parties terrestres ne montent en haut que par l'une de ces deux causes, ou parce qu'elles sont attachées aux parties d'eau qui s'évaporent, ou parce que, comme il arrive dans les grandes chaleurs, elles ont été mises dans un mouvement violent. Mais alors elle ne peuvent

vent ni monter bien haut , ni demeurer suspendues en l'air : elles doivent retomber sitôt qu'elles ont perdu leur mouvement , comme la poussière aussitôt que le vent cesse. Ceci supposé, la plupart des météores s'expliquent aisément.

1°. Les vapeurs qui montent parce qu'elles sont plus légères que l'air grossier, ne doivent point monter infiniment : car l'air étant devenu plus pur & plus léger à mesure qu'il s'éloigne de la terre , les vapeurs doivent enfin trouver une région où l'air soit en équilibre avec elles.

2°. Les vapeurs ne doivent pas monter également ; mais elles doivent monter plus ou moins haut , selon que la pellicule d'eau qui les forme , est plus ou moins épaisse , & que l'air raréfié qu'elles renferment , participe plus ou moins de la nature du feu.

3°. Il se peut faire aisément, que les vapeurs ne s'élèvent que très-peu , & qu'elles soient presque en équilibre avec l'air grossier que nous respirons ; & alors elles forment ce qu'on appelle *Brouillard*.

4°. Le brouillard tombe, si les par-

cies d'air contenues dans les petites bulles qui le composent, viennent à être tellement agitées par la chaleur du Soleil, qu'elles rompent la petite pellicule d'eau qui les enfermoit; mais si l'air ainsi renfermé se raréfie doucement, & qu'il fasse enfler les petites bulles sans les crever, comme nous voyons que les enfans en soufflant doucement font grossir les bouteilles de savon, alors le brouillard monte, & va former une nuée.

5°. Les nuées se forment en l'air, comme les écumes sur le bord de la Mer. L'écume n'est rien qu'une multitude infinie de petites bulles, que les vagues & le vent rassemblent & approchent les unes des autres. Les nuées ne sont pareillement qu'une multitude infinie de petites bulles; mais les bulles qui composent l'écume, sont remplies d'air grossier: celles qui composent les nuées, sont pleines d'esprits ignés, ou d'air subtil & raréfié,

6°. Les nuées demeurent suspendues, parce qu'elles sont de même poids que l'air dans lequel on les voit suspendues. Les unes sont plus hautes, les autres plus basses, selon la nature

des vapeurs qui les composent. Généralement parlant , elles sont plus hautes en Eté qu'en Hiver , parce que quand il fait chaud , l'air enfermé dans les petites bulles des vapeurs est bien plus subtil & plus raréfié qu'en Hiver , & les bulles par conséquent plus légères.

7°. Quand les petites bulles dont la nuée est composée , viennent à se rompre , soit parce que l'air qu'elles contiennent se raréfie extraordinairement , soit par quelque autre cause , l'eau n'étant plus soutenue par l'air subtil qu'elle renfermoit , retombe ; & il pleut. Les gouttes de pluie se convertissent en grêle , quand en descendant elles sont saisies d'un vent froid qui les glace.

8°. Il fait de la neige , lorsque les petites bulles qui composent la nuée , se resserrent & se gèlent sans se rompre ; & si elles se gèlent de la sorte avant qu'elles soient tout-à-fait élevées , & qu'il s'en soit formé une nuée , il fait de la gelée blanche. L'air renfermé dans ces petites bulles glacées est la cause de la blancheur de l'une & de l'autre , comme il est

est la cause de la blancheur de l'écume.

9°. Les exhalaisons qui ont été emportées avec les vapeurs, & qui se mêlent avec elles dans les nuées, servent à y faire la foudre & les autres météores de feu.

10°. Les exhalaisons qui se sont élevées pendant la chaleur du jour, & qui sont détachées des vapeurs, retombent avec le soleil couchant, & c'est ce qu'on appelle *Serein*.

*Mémoires de Trévoux, Avril 1705.
page 155.*



ARTICLE VI.

Observations Physiques sur l'évaporation des Eaux & la matiere des Nuages , de la Neige , de la Pluie , des Brouillards & de la Grêle.

Toutes les eaux qu'on voit tous les jours diminuer sur la terre, & que la chaleur du Soleil, la force des vents, &c. attire en particules imperceptibles à l'œil de dessus la surface des mers, rivières, des lacs, &c. sont portées de la même maniere jusqu'à la moyenne région de l'atmosphère, pourvû que les nuages ne les arrêtent point en chemin, jusqu'à une hauteur où l'air se trouve trop subtil & trop rare pour pouvoir les porter plus haut. Ces particules se gelant & se dilatant alors par le grand froid, se choquent l'une l'autre, & se convertissent en de petits flocons de neige, qui flottant à la même hauteur de l'atmosphère, doivent de leur propre nature s'attirer

les uns les autres , jusqu'à ce que par le pressément des vents ils se forment en nuages , & acquièrent enfin un corps assez solide , pour être attiré de nouveau par la terre ou par la mer , ou suivant l'expression ordinaire , jusqu'à ce que par leur poids ils tombent des nuages qui en sont chargés , en flocons de neige comprimée , ou en gouttes de pluie , s'ils rencontrent de la chaleur en chemin.

Pour donner plus d'éclaircissement à ce que nous venons de dire , il faut remarquer qu'à la première élévation des vapeurs jusqu'à la hauteur de l'atmosphère où elles paroissent d'abord , il est certain qu'elles sont alors extrêmement légères , & beaucoup plus que l'air qui les a soutenues en haut ; qu'il faut que ces flocons de neige , qui descendent ensuite au travers de l'air intérieur , & qui tombent à terre , aient été comprimés , & soient devenus plus pesans avant leur chute ; & que toutes les particules d'eau qui composent un seul flocon de neige , lorsqu'elles commencent à se joindre & à former les nuages , soient alors libres & dispersées çà & là , & ne pe-

sont par conséquent que très-peu sur l'atmosphère. Quelquefois dans un beau tems ces nuages légers, en commençant à se former, nous paroissent blancs : on les voit se mouvoir assez haut dans l'atmosphère ; & la lumière du Soleil & de la Lune percent aisément au travers, tandis qu'on voit en même-tems d'autres nuages se former plus bas de flocons qui se joignent les uns aux autres jusqu'à obscurcir le soleil ; & à mesure qu'ils sont chargés, & qu'ils renferment du vent, ils pressent l'atmosphère, de même qu'un vaisseau chargé presse l'eau, jusqu'à ce qu'il s'approche de la terre & qu'il se décharge.

Voici quelques raisons qui paroissent prouver, que toutes les particules d'eau qui s'évaporent, & qui sont emportées de dessus la surface du globe, sont d'abord portées à la hauteur que nous avons marquée, & qu'elles s'y convertissent en neige avant que de descendre.

La premiere est, qu'en Hiver, lorsque l'air est froid, on ne voit jamais tomber que de la neige, parce qu'il

ne se rencontre point de chaleur qui-la puisse faire fondre.

II. C'est que dans les Pays les plus chauds , les endroits les plus élevés , les sommets des montagnes sont toujours couverts de neige.

III. Comme il ne pleut ni ne peut jamais pleuvoir dans les Pays où il gèle : de-même depuis la création du monde , on n'a jamais vû tomber un seul flocon de neige dans aucun endroit de la Zone Torride ni aux environs , excepté sur les sommets , ou dans le voisinage de ces montagnes , qui à cause de leur haute élévation dans l'atmosphère sont toujours environnées de froid. Entr'autres exemples , on a plusieurs fois remarqué dans l'Isle de Ténériffe , que lorsqu'il pleuvoit beaucoup dans la rade & dans les endroits les plus bas de l'Isle , le bas du pic se trouvoit d'abord tout couvert de neige ; mais dès que le beau tems revenoit , cette neige se trouvoit toute fondue quelques heures après , tandis que le haut du pic s'en trouvoit tout couvert. On fait aussi que dans la Ville d'Oratavia , où

la plupart des Vaisseaux Anglois font leur traite , on rafraîchit le vin pendant toute l'année avec de la glace qu'on y porte du pic ; & cependant on n'y voit jamais ni dans tous les environs la moindre gelée, ni aucun flocon de neige , excepté sur le pic.

I V. C'est qu'un nuage ne sauroit être composé de rien qui soit plus solide , ni d'autre chose que de ces particules gelées , qui sont , comme nous l'avons dit , l'effet infailible de l'évaporation des rosées jusqu'à cette hauteur , où elles se gèlent d'abord à cause de la raréfaction & de la subtilité de l'air , & parce que la réflexion des rayons du Soleil n'est pas suffisante , pour y communiquer leur chaleur. C'est une chose qui paroît certaine , que ces particules de vapeurs ou de rosées gélées qui composent chaque flocon de neige , à quelque hauteur qu'elles se meuvent , sont entre-mêlées avec l'air , & en sont soutenues de la même manière qu'un fagot dans l'eau ; autrement il seroit impossible , que cette quantité d'eau ou de neige dont un nuage est composé , restât dans l'atmosphère , si l'air ne remplissoit pas le

tout, & ne soutenoit chaque particule de la même manière, que si elles étoient toutes séparées les unes des autres. Mais lorsque le nuage se trouve chargé de flocons de neige commençant tant soit peu à se dégeler, deviennent plus pesans & plus comprimés, & tombent du nuage dans la même forme où on les voit descendre sur terre; ou bien, comme nous l'avons dit, elles se convertissent en chemin en gouttes de pluie.

V. Il est à remarquer, que cette opération, par rapport aux flocons de neige qui tombent des nuages, se fait plus promptement dans les Pays chauds & dans les grandes chaleurs; c'est-à-dire, que la chaleur de l'air régnant alors à une plus grande distance de la terre, les nuages ne descendent pas pour lors si bas qu'en Hiver pour se décharger.

Mais s'il arrive qu'un nuage descende si bas qu'il se mêle avec l'air, c'est peut-être ce qui produit le phénomène que les gens de mer appellent un jet d'eau, ou une chute d'eau: car alors toute la partie inférieure du nuage se fondant, descend rapidement,

& ressemble à un tuyau de cheminée large en haut, & étroit en bas. C'est ce qu'on remarque quelquefois sur la mer, qui est moins poreuse, & qui par conséquent attire plus que la terre, & où en un tems calme la réflexion des rayons du Soleil, semblable à celle qui se fait sur un miroir, a plus de force que sur la terre; & comme un gros flocon de neige qui vient dans un air chaud, se fond & se convertit par l'attraction en une goutte d'eau: de même une plus grande quantité de neige venant tout-à-coup dans un air chaud, s'attire elle-même dans sa chute, & devient en descendant un corps solide. On remarque particulièrement dans la Zone Torride & dans son voisinage, que dans un tems chaud & calme, les ondes sont extrêmement fortes; & que les gouttes d'eau sont alors d'une grosseur extraordinaire, aussi-bien que dans le tems qu'il commence à pleuvoir. Mais quand il a plu quelque tems, & que l'air s'est rafraîchi par la neige, qui en descendant se fond & s'y entre-mêle, les gouttes qui tombent alors sont beaucoup moins grosses. Dans les Pays

froids, on voit en Hiver les nuages fort bas, & la pluie est alors fort menue.

Une autre chose à remarquer dans les Pays Septentrionaux, & sur tout en Angleterre, c'est que dans le fort même de l'Été, s'il arrive que les nuages soient poussés au-dessus de nous, & qu'ils y restent, quoiqu'ils n'aient pas encore assez de poids pour se décharger, on s'apperçoit alors que l'air devient froid en comparaison de ce qu'il étoit auparavant; ce qui provient non-seulement de ce que le Soleil est obscurci, mais aussi de la continuelle réflexion du froid causée par la neige qui est dans les nuages; & la chaleur qui est dans l'air, ne s'étend pas alors à une grande distance de la terre: il faut ou que les nuages descendent plus bas, qu'ils s'obscurcissent & se chargent, ou bien qu'ils s'éclaircissent pour quelque tems, & qu'alors la chaleur commence à régner dans l'air avant qu'il puisse pleuvoir.

VI. Dans les Pays les plus chauds, & dans les plus grandes chaleurs où les évaporations sont toujours plus considérables dans le tems que le Soleil se couche, & que la cause qui a

produit cette grande quantité de rosée , a perdu considérablement de sa force , dans le tems que ces vapeurs étoient en chemin pour monter à la hauteur de l'atmosphère que nous avons marquée , l'air n'a pas alors la force de soutenir ces particules , toutes légères & imperceptibles qu'elles sont , parce qu'elles n'ont pas été élevées assez haut pour être gelées & raréfiées par le froid ; de sorte que leur propre poids en fait retomber la plus grande partie , surtout lorsqu'il n'y a que peu ou point de vent.

Dans les plus grands froids, lorsque les rivières sont gelées & couvertes de neiges aussi-bien que toute la surface de la terre , ces particules humides , qui dans un tems clair & calme s'évaporent dans l'air , soit par la transpiration , soit par la respiration de toutes les créatures , ne peuvent pas sans la chaleur du Soleil s'élever facilement jusqu'à la hauteur de l'atmosphère. Il en est de-même des vapeurs qui sortent d'une chambre bien close & échauffée par un poêle , de toutes les autres évaporations causées par le feu , & de ces particules humides qui

s'élevent au-dessus des fontaines, des rivières, des lacs, &c. & qui dans le tems d'une forte gelée semblent en sortir comme des brouillards épais. Toutes ces particules ne sont pas plutôt montées en l'air, qu'elles y sont raréfiées par le grand froid. L'air n'ayant pas alors cette force élastique causée par la chaleur du Soleil, comme cela se voit dans la chute des rosées dont nous avons parlé, ces particules ne peuvent pas monter assez haut dans l'atmosphère pour prendre les couleurs qu'elles ont dans un tems chaud; & étant gélées, elles ne peuvent plus tomber facilement à terre, mais elles voltigent dans l'air inférieur jusqu'à ce qu'il en soit tout rempli. Les rayons du Soleil les font briller lorsqu'il fait un beau jour, & que le Ciel est assuré vers notre zénit, verds où la vûe trouve moins de ces atômes dans son chemin; mais c'est ce qui produit aussi un tems fort couvert & froid, jusqu'à dix ou quinze degrés au-dessus de l'horison. Le Soleil en paroît une fois plus grand que dans un autre tems; de même maniere qu'il nous paroît quelquefois plus grand à son lever ou à

son coucher, aussi-bien que la Lune, & cause de l'air épais qui environne la terre, quoiqu'alors ces deux astres soient éloignés de nous près d'un demi-diametre de la terre de plus que lorsqu'ils sont au méridien.

Une remarque que l'on fait sur mer, c'est que dans les tems des plus grandes chaleurs, lorsqu'il n'y a que fort peu de vent, & qu'à peine on voit un seul nuage au Ciel, il est fort rare de trouver l'horison clair, quand on veut prendre la hauteur à midi; ce qui provient apparemment des vapeurs extraordinaires qui s'élèvent alors, & qui épaississent tellement l'air, qu'on ne peut pas bien distinguer l'horison. On ne peut pas aussi découvrir de fort loin un vaisseau ou la terre; c'est pourquoi on choisit ordinairement le matin & le soir, lorsque le Ciel est beaucoup plus serain & pur, pour envoyer du monde au haut du mât à la découverte.

VII. Enfin pour prouver que les particules d'eau qui s'élèvent dans l'atmosphère à la hauteur que nous avons décrite, se raréfient alors, & deviennent plus légères qu'elles ne

sont lorsqu'elles commencent à monter, on n'a qu'à considérer la nature de la glace. Dans le tems de la gelée une bouteille remplie d'eau se casse, parce que l'eau en se gelant se raréfie.

Les différentes raisons que nous venons de déduire, semblent démontrer, que c'est de la maniere dont nous l'avons dit que les vapeurs s'élèvent ; & que les nuages se forment ; que le froid qui regne à une certaine hauteur dans l'atmosphère, & la chaleur que la terre réfléchit continuellement, contribuent également à produire ces différens effets, & y sont absolument nécessaires ; que la région supérieure où le froid regne toujours, est pour ainsi dire le grand alambic du monde, où toutes les vapeurs produites par la chaleur du Soleil sont portées continuellement ; & qu'enfin ce n'est que le froid qui raréfie d'abord ces vapeurs dès qu'elles s'élèvent, qui leur donne la qualité nécessaire pour se soutenir dans l'air, & pour se mouvoir tout autour de la terre, & pour être placées d'une telle maniere, qu'elles puissent l'arroser.

On

On ne sauroit en cela trop admirer la Providence. Premièrement, en ce que la partie inférieure de l'atmosphère se trouve avoir une vertu élastique, & que la supérieure soit composée d'une matière plus subtile & plus rare, afin que cette diversité de température serve à borner l'élévation des nuages, & à les tenir à une hauteur convenable pour ne causer aucun dommage, ni aux arbres ni aux maisons, & pour ne nous point surprendre par un froid trop subtil dans quelque tems que ce soit. Secondement, en ce qu'elle a su si bien tempérer les opérations alternatives du chaud & du froid, & si bien regler la nature de l'air & de l'eau, que la quantité des pluies se trouve toujours la même, & qu'il n'en tombe ni trop ni trop peu pour les besoins de la terre, quoique Dieu dirige les vents & les nues d'une manière, que quelquefois un endroit a plus de pluie, & un autre moins. Passons à la formation des brouillards & de la grêle.

A l'égard des brouillards, on remarque ordinairement, sur tout en Angleterre, qu'ils se forment principale-

ment en Automne & en Hiver, où dans les tems que la chaleur du Soleil diminue, & non au Printems & dans le fort de l'Été, lorsque la chaleur augmente. Cette seule circonstance paroît suffisante pour en découvrir la cause; c'est qu'à mesure que le Soleil se rapproche du pôle antarctique, l'air, surtout la nuit, devient plus froid que la terre, & beaucoup plus encore que la mer, dont la qualité ne peut pas sitôt se changer, à cause de la chaleur qui s'y communique jusqu'à une profondeur considérable. Ce froid causé dans l'air par la déclinaison du Soleil dans le tems que la terre, & surtout la mer, conservent une chaleur considérable en comparaison de l'air, paroît être la principale cause qui produit & augmente les brouillards: c'est ce qu'on peut remarquer plus particulièrement sur les Côtes d'Irlande où l'Océan est plus profond, & où par conséquent l'eau a plus de chaleur en Hiver que vers l'Angleterre; ce qui fait que les brouillards y sont beaucoup plus épais que dans la Manche Britannique.

On doit attribuer cet effet à la même

me cause qui , lors d'une forté gélée , produit les brouillards au dessus des fontaines , des rivières , des lacs , &c. Tout le monde convient qu'il en est alors de ces eaux comme des caves , qu'on trouve chaudes en ce tems - là en comparaison de l'air de dehors. Il ne faut pourtant pas s'imaginer , que ces eaux puissent avoir la même chaleur en Hyver qu'en Eté , si l'air y a la moindre communication. Ce qui est incontestable , c'est que la mer , & toutes les eaux exposées au jour , sont en Hiver plus chaudes que l'air. Les deux qualités opposées du chaud & du froid étant alors dans un combat continuel , s'entremêlent , & forment une autre température qui participe de l'un & de l'autre. Plus la différence est alors grande entre la température de l'air & celle de l'eau , plus la chaleur du Soleil qui a pénétré la surface de la terre ou de l'eau , en fait exhaler des particules humides , surtout de l'eau , où la chaleur a pénétré plus profondément ; & comme nous l'avons remarqué en parlant d'une chambre chaude , & de la cause première & générale qui élève les vapeurs jus-

qu'à la moyenne région de l'atmosphère, le froid de son côté attire à soi avec la même force toutes les particules humides, qui voltigent séparément dans l'air. Dans ce tems-là, plus la cause de l'élévation des vapeurs est considérable, c'est-à-dire, plus la différence est grande entre les deux qualités opposées du chaud & du froid, plus par conséquent les particules sont grosses. Etant d'un poids égal à l'air inférieur, qui dans ce tems-là n'a point cette vertu élastique qu'il a ordinairement, ces particules ne peuvent point monter plus haut; mais comme il en sort continuellement de la surface de la terre & de la mer, ce mouvement perpétuel fait qu'elles s'entrechoquent, & forment un corps épais & visible, qui flotte autour de la terre jusqu'à ce que le Soleil puisse communiquer sa chaleur à l'air, & lui donner un nouveau ressort, pour dissiper ces particules, & les élever à une région plus légère & plus raréfiée. C'est ce qui se remarque ordinairement, lorsque le Soleil se leve & qu'il fait un beau jour; mais si le tems est couvert & froid, & qu'il fasse un peu de vent,

les brouillards alors se tiennent dans l'air, & y demeurent quelquefois plusieurs jours sans se dissiper. C'est ce qui arrive communément dans les endroits qui sont près de la mer ou d'autres grandes eaux, mais plus avant dans le continent.

De plus on remarque dans les Pays chauds, ou dans le tems de la chaleur dans quelqu'endroit du monde que ce soit, qu'au-dessus de ces montagnes qui sont élevées à une telle hauteur, qu'elles ne participent ni au grand froid qui regne dans la partie supérieure de l'atmosphère, ni à la chaleur qui enlève les vapeurs d'en bas, qu'au dessus, dis-je, de ces montagnes, l'air est trop rare & trop subtil pour pouvoir soutenir ces particules pesantes : & il est dans une telle température & a un tel degré de vertu élastique, qu'il est impossible que les brouillards puissent jamais s'y former. C'est ce qui se voit particulièrement sur le pic de Ténériffe, dont le sommet d'un côté & d'autre est toujours couvert de neige ; mais au pied du pic, & dans les autres endroits les plus élevés de

cette Île , aussi-bien que de plusieurs autres des Canariës , où ni la chaleur d'en bas , ni le froid des régions plus supérieures ne regnent point , on voit d'abord un brouillard qui s'y élève dès que le tems est calme.

A l'égard de la grêle , de quelque maniere qu'elle se forme & qu'elle se soutienne dans l'air , nous voyons que c'est un corps condensé & solide qui tombe d'une hauteur considérable , malgré tout ce qui a été dit , d'un côté de la nature des vapeurs & de la pluie , & de l'insuffisance de l'air pour soutenir rien qui ne soit léger , ou du moins d'un poids égal au sien , & de l'autre , pour prouver que la région supérieure de l'air est plus légère de beaucoup que l'inférieure.

Sans nous étendre ni sur sa nature ni sur sa cause , nous remarquerons seulement , que la grêle tombe toujours , ou du moins fort souvent , immédiatement après qu'il a fait des éclairs , & directement sous l'endroit où l'éclair a le plus paru , ou à une petite distance de-là. C'est aussi lorsqu'il fait une chaleur excessive & des éclairs

furieux , que l'on voit tomber les plus gros grains de grêle. C'est que l'éclair qui , comme on le fait , a une force prodigieuse , en s'élançant au travers des nues , fait fondre la neige , & la réduit en même-tems en gouttes deau ou en d'autres formes plus irrégulières. Si l'éclair a frappé le milieu, ou la partie supérieure d'un nuage qui est élevé jusqu'à la hauteur où la gelée est toujours très-forte , ces gouttes ainsi formées par l'éclair , se gèleront en tombant , de la même manière que de l'eau jettée dans l'air lors d'une forte gelée , se gèle avant que de tomber à terre ; & ces gouttes tombant ensuite au travers des flocons de neige qui sont au-dessus de l'endroit où elles ont été formées , ramassent en chemin de nouvelles particules de neige , & se condensent avec elles ; ce qui pourroit être la cause de cette inégalité qu'on remarque dans la grêle lorsqu'elle tombe à terre. Mais si l'éclair ne frappe que la partie inférieure d'un nuage , on voit alors tomber de grosses ondées , & quelquefois de la pluie & de la grêle en même-tems ;

c'est ce qu'on voit ordinairement après de grand coups de tonnerre & des éclairs extraordinaires.

Observations de M. Perry, Mémoires de Trévoux, Mai 1717. pag. 704.

ARTICLE VII.

Sur la cause de la suspension des Vapeurs dans l'air.

Selon le commun des Philosophes, c'est le Soleil qui attire les vapeurs dans l'air, & c'est sa chaleur qui les y soutient. Notre Auteur a considéré que les vapeurs s'élevant dans l'air lors même que le Soleil est sous notre horizon, la vertu attractive de cet Astre ne pouvoit pas être toujours la cause de leur élévation. De plus, elle se fait dans les lieux souterrains, & dans des cavités si profondes, qu'il n'y a pas d'apparence que les Astres portent la vertu jusques-là. Il est vrai que l'on peut dire, que la chaleur que les corps célestes répandent dans l'air, est

est la cause principale qui fait élever les vapeurs de l'eau & de tous les corps humides : car on ne peut nier , que la chaleur raréfiant l'eau , & lui donnant une plus grande étendue apparente , & par conséquent la rendant plus légère , cette raréfaction ne peut devenir assez grande pour rendre l'eau plus légère que l'air. Ceux qui s'arrêtent aux apparences , & qui ne portent pas leur vûe plus loin , pourroient être assez contens de cette raison , & se flatter qu'ils savent la véritable cause de ce phénomène ; mais si l'on fait réflexion , que dans les Pays où les Hivers sont les plus rudes, l'air se charge de vapeurs très-froides , on conviendra que si la chaleur donne la première impulsion aux particules de l'eau pour se séparer les unes des autres , & pour s'élever , on ne pourra pas dire qu'elle les tienne suspendues dans l'air. Il est impossible que de très-petites particules d'eau ne perdent en un moment leur chaleur dans l'air dont la froideur est excessive. Il s'ensuit donc qu'elles ne se soutiennent point dans l'air par la chaleur , puisqu'elles ne peuvent pas la conserver. Ainsi toute la

difficulté consiste à savoir, comment la petitesse des gouttes d'eau est la cause de leur suspension.

On suppose que la cause de la suspension des petites particules des corps dans des liquides plus légers, est fondée sur ce que ces petits corps ayant beaucoup de superficie & très-peu de masse par laquelle ils puissent tendre en bas, il est difficile qu'ils se fassent un passage pour descendre au travers des parties liquides, & qu'ils écartent celles qu'ils rencontrent dans leur route, & poussent celles qui s'opposent à leur mouvement en bas.

Ce raisonnement seroit solide, si les parties des liquides avoient quelque liaison; mais outre qu'elles n'en ont aucune, elles sont dans une perpétuelle agitation les unes auprès des autres; & leur mouvement se faisant en tout sens, & par conséquent les corpuscules étrangers des corps pesans étant également poussés de toutes parts par les particules d'une liqueur plus légère, il faut nécessairement qu'ils aillent du côté vers lequel il sont plus poussés; c'est-à-dire, qu'il faut que ces corpuscules pesans descen-

dent. Si ces corpuscules , tout pesans qu'ils sont , ne peuvent pas se faire un passage pour descendre à travers les particules d'un liquide moins pesant , parce qu'ils ont beaucoup de superficie & peu de masse , d'où vient que cette grande superficie dans une petite masse , avec le secours de la pesanteur , n'empêche pas ces corpuscules plus pesans de se faire un passage à travers les parties d'une liqueur plus légère pour monter ? D'où vient que les vapeurs fendent si facilement l'air , & s'élèvent avec tant de vitesse jusqu'à la moyenne région , bien que chaque goutte de vapeur ait peu de corps & beaucoup de superficie , & qu'elle pese mille fois plus ou environ qu'une égale quantité d'air ?

Que l'on ne dise point qu'une impulsion étrangere porte les vapeurs en haut : cette impulsion , quelque violente qu'elle soit , ne peut pas durer long-tems dans un petit corps , lequel , à proportion de sa masse , a beaucoup de superficie , par laquelle il doit bien-tôt perdre son mouvement , soit en le communiquant aux corps qu'il choque , soit parce que la pesanteur

travaille toujours à le détruire. Il y a bien plus d'apparence, que le mouvement horizontal empêche, ou du moins retarde le mouvement des corps pesans en bas, parce qu'il affoiblit l'effort de la pesanteur. De plus le milieu dans lequel se fait le mouvement, résistant plus au-dessous du mobile qu'au-dessus, cette résistance pourra non-seulement retarder la descente, mais encore déterminera le mobile à l'élever, surtout si la pesanteur est très-petite. Il est certain que les corpuscules qui nagent dans les liqueurs plus légères, ne peuvent pas se déterminer promptement à descendre, lorsque tout le liquide coule & se meut, parce que le liquide prenant les particules des corps pesans par-dessous, il les soulève, & les entraînant avec lui, les force à suivre son mouvement. Mais tout cela ne fait rien pour la suspension des vapeurs, dont les petites gouttes ne sont pas toujours mues horizontalement, ni soulevées par le mobile.

L'Auteur se réduit enfin à dire, que la matiere éthérée, dont tous les Philosophes conviennent, peut être

la véritable cause de la suspension des vapeurs. Les particules de cette matiere étant dans un mouvement très-rapide , & leur petitesse la rendant propre à passer par les plus petits intervalles des corps , il faut que sortant des pores d'un corps , si elle ne trouve pas ceux du corps voisin assez disposés à la recevoir , elle se détourne & recule entre ces deux corps , & qu'elle les tienne séparés , s'il n'y a pas quelque cause qui résiste aux effets qu'elle fait par son impulsion à les écarter l'un de l'autre. L'air & l'eau ont des ports fort différens ; d'où il résulte , que la matiere éthérée qui est repoussée par l'un ou par l'autre , coule entre ces deux corps quand ils sont voisins ; & c'est ce qui fait que les gouttes d'eau s'arrondissent quand elles sont environnées d'air. L'arrondissement vient de ce que la matiere éthérée , qui coule entre l'air & l'eau , écarte tout ce qui s'oppose à son mouvement , & qui n'est pas capable de lui résister, comme l'air & l'eau.

Cela supposé , notre Auteur en conclut , que la matiere éthérée coulant avec rapidité , & se conservant un

passage entre l'air & l'eau , on doit considérer les gouttes d'eau comme enveloppées d'une croûte de matiere éthérée , très-mince à la vérité. Or une petite goutte de la matiere environnée peut devenir plus légère qu'une pareille masse d'air. On ne peut mieux le faire comprendre , que par ces bouteilles d'eau de savon que les enfans font en soufflant , & qui voltigent dans l'air , & y demeurent suspendues. Cette suspension vient , de ce que l'eau dont ces bouteilles sont formées étant très-mince , a pourtant une très-grande superficie à proportion de sa masse , en sorte qu'elle a au dedans & au dehors une grande étendue de cette matiere éthérée , qui fait avec elle un corps plus léger qu'une masse égale d'air. Aussi voit-on que dès que ces bouteilles se réduisent en gouttes , elles tombent à terre , parce qu'elles ont alors moins de superficie. Ceci peut éclaircir la difficulté qui embarrasse bien des gens , pourquoi l'air chargé de vapeurs est plus léger qu'une égale quantité d'air pur , & pourquoi le Mercure monte dans le Barometre quand le tems est serein : car ce qui

fait que l'air est moins pesant, quand il est chargé de vapeurs, c'est que ces gouttes d'eau sont soutenues par cette enveloppe de matiere éthérée; autrement il arriveroit, qu'une masse composée d'air & de vapeurs seroit plus pesante qu'une masse égale d'air pur, & seroit monter le Mercure dans le Barometre; ce qui est manifestement contraire à l'expérience.

Par M. Bayle, Ouvrage des Sçavans pour le mois d'Août 1688. page 447.



ARTICLE VIII.

*Sur la quantité de vapeurs que la
chaleur du Soleil fait élever
de la Mer.*

IL paroît évident que la quantité des vapeurs dont l'air est chargé, est très-considérable, puisque les pluies & les neiges tombent quelquefois en si grande abondance, que l'on reconnoît que cette eau descendue des intervalles que les particules de l'air laissent entr'elles, faisoit une partie très-sensible du poids de l'atmosphère; mais personne, que je sçache, n'a bien examiné la proportion qui est entre la mer & ces vapeurs, qui sont l'origine non-seulement des pluies, mais encore des fontaines. Je crois qu'on ne sera pas fâché de voir la manière dont j'ai essayé de déterminer la quantité des vapeurs, qui s'élèvent par la chaleur.

J'ai pris un vase plein d'eau, pro-

fond de quatre pouces , & dont le diametre étoit de 7 pouces $\frac{9}{10}$, dans lequel j'ai placé un Thermometre ; ensuite par le moyen d'un réchaut plein de charbons allumés, j'ai échauffé l'eau jusqu'au même degré de chaleur que nous ressentons dans les Etés les plus chauds , comme il paroissoit par le Thermometre. Cela étant fait , j'ai attaché ce vaisseau sans en rien ôter à un bout du fléau d'une balance , & j'ai mis de l'autre côté des poids justement de la même pesanteur. Il étoit aisé de conserver le même degré de chaleur dans l'eau, en rapprochant ou en éloignant le réchaut plein de feu. Je remarquai bientôt que le poids de l'eau diminuoit sensiblement ; & au bout de deux heures il y manquoit un demie-once, poids de *Troyes*, moins sept grains, c'est-à-dire , 233 grains d'eau , qui s'étoit évaporée dans cet espace , quoiqu'on n'en vît monter aucune fumée , & que l'eau ne parût pas chaude au toucher. Cette quantité d'eau évaporée en si peu de tems semble très-considérable ; car il s'ensuit

de-là , qu'en vingt-quatre heures il s'évaporerait six onces d'eau d'une surface aussi petite que l'est celle d'un cercle de huit pouces de diamètre.

Pour tirer de cette expérience une supputation exacte , & déterminer la grandeur du volume d'eau qui s'étoit ainsi évaporée , je me sers de l'expérience qui a été faite dans la Société d'Oxford ; c'est qu'un volume d'eau de la grandeur d'un pied cubique d'Angleterre pèse 76 livres , poids de *Troyes*. Ce nombre étant divisé par 1728 , qui est le nombre des pouces cubiques contenus dans ce pied , donne 253 grains & $\frac{1}{4}$, ou une demi-once 13 grains pour le poids d'un pouce cubique d'eau. Le poids donc de 233 grains est $\frac{233}{253}$, ou 35 parties d'un pouce cubique divisé en 38. Or l'aire d'un cercle dont le diamètre est de 7 pouces $\frac{9}{10}$, contient 49 pouces quarrés , par lesquels divisant la quantité de l'eau évaporée , sçavoir $\frac{35}{38}$ d'un pouce , le quotient est $\frac{35}{1802}$ ou $\frac{1}{51}$; d'où il paroît que le volume de cette eau est la cinquante-troisième partie d'un pouce ; mais pour la facilité du calcul , nous

supposerons qu'elle n'en est que la soixantième. Si donc l'eau aussi chaude que l'air l'est en Été, exhale la soixantième partie d'un pouce en deux heures de la surface décrite, il s'en exhalera la dixième quantité suffisante pour fournir à toutes les pluies, fontaines & rosées. Ce calcul peut même supposer la mer, sans qu'elle diminue, ni se déborde, comme la mer Caspie, qui est toujours d'une égale hauteur, & supposer encore le courant, que l'on dit qui est toujours dans le détroit de Gibraltar, quoique la mer Méditerranée reçoive un grand nombre de rivières considérables.

Pour estimer la quantité d'eau qui s'élève en vapeurs de la mer, je crois qu'on la doit seulement considérer pendant le tems que le Soleil est levé : car pour la nuit, il retombe autant d'eau en rosée, ou même plus, qu'il n'en monte en vapeurs pendant ce tems-là. Il est vrai que l'Été, les jours sont de plus de douze heures; mais cette longueur du jour est contrebalancée par la foiblesse de l'action du Soleil lorsqu'il se leve, & avant que

l'eau soit échauffée. Ainsi je suppose qu'il s'élève par jour en vapeurs la $\frac{1}{10}$ d'un ponce de l'étendue marquée de la surface de la mer : on ne pourra pas rejeter cette conjecture.

Selon cette hypothèse , dix ponces en quarré de la surface de l'eau fourniront par jour en vapeurs un ponce cubique d'eau ; chaque pied en quarré une *demi-pinte* ; quatre pieds en quarré un *gallon* ; un mille en quarré 6914 tonneaux ; & un degré en quarré , supposé qu'il soit de 69 milles d'Angleterre , exhale en vapeurs trente-trois millions de tonneaux. Si l'on donne à la Méditerranée quarante degrés de longueur , & quarante-quatre de largeur , eu égard aux endroits plus larges & à ceux qui sont plus étroits , ce qui est sans doute le moins qu'on puisse lui donner , ce seroit cent soixante degrés de mer en quarré ; & par conséquent toute la mer Méditerranée dans un jour d'Été jettera en vapeurs 5280 millions de tonneaux. Cette quantité de vapeurs , quoique très-grande , est pourtant le moins qu'on

en puisse supposer, selon l'expérience que l'on a rapportée. Il est vrai qu'il y a une autre chose qu'on ne sçauroit réduire à des regles certaines; ce sont les vents, qui détachent de la surface de l'eau plus de particules que la chaleur du Soleil n'en fait évaporer, comme on le peut aisément concevoir, si l'on a fait quelque réflexion sur ces vents desséchans, qui soufflent quelquefois.

Il est très-difficile d'estimer la quantité d'eau que la mer Méditerranée reçoit des rivières qui y tombent, à moins que l'on n'eût les moyens de mesurer leurs embouchûres & leur rapidité. Tout ce que l'on peut faire dans cette occasion, c'est de leur donner plutôt une plus grande quantité d'eau, qu'elles n'en ont en effet, que de leur en ôter; c'est-à-dire, de supposer qu'elles sont plus grandes qu'elles ne le sont, selon toutes les apparences, & ensuite comparer la quantité d'eau que la Tamise porte dans la mer, avec celle de ces rivières qui doivent entrer dans notre calcul.

La mer Méditerranée reçoit ces neuf rivières considérables, l'Ebre, le Rhône, le Tibre, le Po, le Danube, le Niefter, le Boristhène, le Tanais, le Nil, les autres n'étant ni si célèbres, ni si grosses. Nous supposerons que chacune de ces neuf rivières a dix fois plus d'eau que la Tamise, non qu'il y en ait aucune qui en ait réellement dix fois autant, mais pour comprendre dans notre calcul les autres moindres rivières qui se déchargent dans la Méditerranée, dont on ne sçauroit autrement estimer la grandeur.

Pour mesurer l'eau de la Tamise, je la prends au Pont de *Kingston*, jusqu'où le reflux n'arrive jamais, & où l'eau coule toujours en bas. La largeur de son lit est de cent verges, & sa profondeur de trois, à la supposer partout égale, dans laquelle supposition je suis assuré que je lui donne plus d'étendue que moins qu'elle n'en a. Le volume de l'eau est donc en cet endroit de trois cens verges en quarré; cela multiplié par quarante-huit mille (c'est la quantité

d'eau que je crois qui s'écoule en vingt-quatre heures, à mettre deux milles par heure,) ou 84480 verges, donne 25344000 verges cubiques d'eau qui doivent s'écouler en un jour, c'est-à-dire, 20300000 tonneaux par jour. Je suis persuadé que par ce que j'ai donné de plus au lit de la rivière qu'il n'a réellement, je lui ai accordé une grandeur suffisante pour y comprendre les rivières de *Brent*, de *Wandel*, de *Lea*, de *Darwent*, qui sont de quelque considération, & qui se déchargent dans la Tamise au-dessous du Pont de *Kingston*.

Maintenant si chacune de ces neuf rivières a dix fois plus d'eau que la Tamise, il s'ensuivra que chacune portera par jour à la mer 203 millions de tonneaux, & que le tout ne fera que 1827 millions de tonneaux ; ce qui n'est qu'un peu plus que le tiers de ce que j'ai fait voir s'élever en vapeurs de la Méditerranée en douze heures de tems.

L'Auteur nous avertit en finissant, que pour faire l'expérience dont nous

avons parlé , il s'est servi d'eau qui avoit été salée jusqu'au même degré que l'eau commune de la mer , c'est-à-dire , en y dissolvant une quatrième partie de sel.

Par M. Halley , Bibliothèque Universelle pour l'année 1688. pag. 195.



ARTICLE

ARTICLE IX.*Observations sur les différentes causes des Vents.*

QUOIQ'ON sçache que le vent n'est autre chose qu'un air en mouvement, il est néanmoins difficile de découvrir les causes par lesquelles ce mouvement est produit, parce qu'outre que chaque sorte de vent peut avoir une cause particulière, il y en a certains qui en ont de compliquées. Il faut poser pour principe, 1^o. Que la chaleur dilate l'air, & que la flamme le chasse tout-à-fait de l'endroit où elle se trouve, tant qu'elle dure. 2^o. Qu'un certain volume d'air pèse plus ou moins, selon qu'il est plus ou moins dilaté. Or cette dilatation dans nos climats va du simple au double dans les saisons extrêmes. Ainsi dans le plus grand froid de nos hivers, un même volume de l'air qui nous environne, pèse le double de ce qu'il pèse dans le plus grand chaud de nos **Etés.**

*Tome II.***O**

Les vents peuvent être divisés en trois classes. Dans la première nous mettons les vents dont les causes paroissent évidentes ; dans la seconde , ceux dont les causes sont plus cachées ; & dans la troisième , ceux dont les causes sont encore inconnues. Il y a des vents dont la cause paroît évidente ; tel est celui qui précède le lever du Soleil , & qui suit son coucher. Ce vent n'est bien sensible qu'entre les deux tropiques , où l'air étant extrêmement raréfié par les rayons du Soleil , est repoussé de toutes parts vers les endroits de la terre qui n'en sont pas éclairés ; & comme entre les deux tropiques le Soleil se leve avec peu ou point d'obliquité , la dilatation de l'air par les rayons de cet Astre se fait brusquement ; ce qui produit dans l'endroit de la terre nouvellement éclairé un vent chaud , qui s'échauffe de plus en plus , jusqu'à ce que l'air y soit autant raréfié qu'il le puisse être par la présence du Soleil.

Le contraire doit arriver au coucher de cet Astre , qui disparoissant tout d'un coup , n'entretient plus la raréfaction de l'air ; en sorte que pen-

dant qu'elle cesse peu à peu, l'air froid & pesant des endroits voisins non éclairés par le Soleil venant à fondre sur cet air chaud & raréfié, le dérange d'autant plus fortement, que le poids de l'un est plus considérable que le poids de l'autre.

Aussi les soirs commence-t-on à sentir un vent frais, qui va toujours en augmentant, jusqu'à paroître très-froid & insupportable aux habitans. Les Marins appellent ces vents des *Brises*; & ils les distinguent en vents de terre & en vents de mer, parce qu'ils soufflent tous les jours alternativement pendant l'espace d'environ douze heures, les uns de la terre sur la mer, les autres de la mer sur la terre.

Parmi les vents dont les causes sont plus difficiles à découvrir, nous pouvons mettre les vents qu'on nomme *Alizés*. On en doit attribuer la cause au mouvement journalier de la terre sur son axe. Ce mouvement en imprime un semblable aux eaux de l'Océan; mais qui paroît en sens contraire, à cause de la lenteur de leur révolution. Si la surface de la terre

étoit unie , & que les montagnes ne s'opposassent point au mouvement des eaux , il est constant qu'il devroit suivre exactement la ligne équinoxiale ; c'est ce qu'on remarque aussi dans le grand espace de la mer du Sud , depuis les côtes Occidentales de l'Amérique jusqu'aux Indes Orientales , où le courant des eaux suit toujours cette même ligne , & ne s'en détourne que fort peu en certaines saisons. Mais comme les hautes montagnes , & principalement celles dont les côtes Orientales de l'Amérique sont bordées d'un pôle à l'autre , barrent presque tout-à-fait le passage des eaux , il arrive qu'une bonne partie de ces eaux est obligée de revenir sur ses pas par un grand détour , en glissant le long des côtes qu'elles rencontrent en chemin ; & l'on a donné le nom de *courans* aux différentes routes que cet obstacle leur fait prendre pour faire le tour de la terre. Comme l'air est un liquide qui nage sur toute la surface du globe terrestre , cette partie de l'air qui est porté sur ces courans , en est continuellement entraîné , & devient par-là un vent qui est toujours poussé

d'un même côté ; c'est ce qu'on appelle *vents Alizés*.

Tous les courans, & par conséquent les vents qui les suivent, ne gardent pas toujours la même route pendant toute l'année. Il y en a qui en changent selon les saisons ; ce qu'on peut principalement attribuer à la différente position du Soleil dans l'Ecliptique. Aussi les courans qui portent à l'Est ou à l'Ouest, de quelque maniere que ce soit, sont-ils tous sujets à ce changement ; au lieu qu'on n'en remarque presque point dans ceux qui portent au Nord ou au Sud, soit directement, soit un peu de biais. On observe ce changement dans les eaux qui tombent de la mer du Sud dans les Isles des Indes Orientales, & qui y produisent différens courans, dont un des plus considérables passe pendant notre Eté dessous le Cap de Comorin dans la mer Persique, & s'étend du Nord au Sud jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, parce que le Soleil étant pour lors dans les Signes Septentrionaux, pousse ses rayons du Nord au Sud pendant notre Hiver. Au contraire le Soleil parcourant les Signes Méridio-

naux, pousse les eaux de ces mêmes courans du Sud au Nord, & les fait remonter le long des côtes de l'Afrique vers les côtes du Malabar. Ainsi les vents qui suivent ces courans, doivent pour lors souffler de l'Ouest vers l'Est sur ces côtes, & y porter la pluie, parce qu'ils viennent continuellement de la mer sur la terre; & dans l'autre saison au contraire, les vents venant de l'Est à l'Ouest, qui à l'égard des côtes de Malabar sont des vents de terre, il n'y pleut jamais.

Pour les courans qui passent au-dessous du Cap de Bonne Espérance, comme ils trouvent en leur chemin le grand obstacle des terres de l'Amérique, ils sont obligés de monter en partie le long des côtes Septentrionales du Brésil, pour entrer dans le golfe du Mexique, d'où ayant pris le tournant de la Floride, & suivi les côtes de la Virginie & de la Nouvelle France, ils se confondent avec le courant qui descend de la mer Glaciale, & qui va du Nord au Sud vers les Tropiques.

Ce courant suit pendant toute l'année à peu près la même route, étant

trop fort pour être dérangé par les rayons du Soleil. Le vent qu'il produit ne change pas non plus, à moins qu'il n'arrive de fortes brises, qui produisent certains vents que les Marins appellent des *Tourbillons*, ou des *Tornados*.

Plusieurs expériences démontrent, que la pression de l'air doit être attribuée aux rayons du Soleil. La première est la fonte de tous les corps, & de l'or même, par les rayons concentrés du Soleil. Cette fonte ne se peut faire, que le Soleil ne presse assez fortement la matière de la lumière dans les pores du métal, & en assez grande quantité pour en écarter les parties, & se mêler entr'elles.

Quand on a redressé un ressort de montre, & qu'on l'engage par un de ses bouts dans un bloc de bois, si l'on pousse par secousses réitérées contre le bout libre du ressort le foyer d'un miroir ardent, le ressort fera des vibrations aussi sensibles que si on l'avoit poussé avec un bâton. Voilà ce que font les rayons concentrés. Les rayons libres ne sont pas dépourvus de cette propriété. En beaucoup d'endroits du

Danube, les moulins qui sont sur ce Fleuve, cessent de travailler depuis le lever du Soleil jusqu'à midi, qu'ils recommencent d'aller, & continuent jusqu'au lendemain matin, & cela régulièrement tous les jours de l'année. Quand on examine de près ce phénomène, on observe que la rivière, depuis Bude jusqu'à Belgrade, coule fort lentement de l'Occident à l'Orient; qu'ainsi le Soleil depuis son lever jusqu'à midi doit pousser ses rayons sur la surface de cette rivière, & la presser d'un sens contraire au mouvement de ses eaux, ce qui est capable d'en arrêter le cours qui est très-foible en cet endroit. Quand au contraire le Soleil a passé le Méridien, comme ses rayons pressent de l'Occident à l'Orient, selon le cours de la rivière, non-seulement ils ne s'y opposent plus, mais même ils l'accélèrent, & remettent par conséquent les moulins en état de travailler.

Les vents dont les causes sont inconnues, sont ceux qui régneront toujours en Europe, & particulièrement dans nos climats, qui sont à peu près également

également distans du Cercle polaire & du Tropicque. Ces vents soufflent continuellement , soufflant indifféremment de tous les points de l'horison , sans garder aucune regle connue. Il y a bien de l'apparence qu'ils ne sont pas produits par une seule cause. En voici une qui paroît fort probable , & qui peut concourir avec les autres. Si on joint brusquement un esprit acide , tel que l'esprit de nitre , avec une huile éthérée , comme l'huile de gérosfle , il en résulte une flamme qui est enlevée dans le moment par l'air pesant qui l'environne ; ce qui ôte le moyen de l'examiner davantage. Mais si on verse goutte à goutte l'esprit de nitre dans cette huile, l'effervescence se fait peu à peu sans que le mélange s'enflamme , & il en résulte une résine , qui étant distillée , rend un esprit acide , & une huile éthérée capable de s'enflammer , & de reproduire une résine comme auparavant.

De-là on peut conjecturer que les exhalaisons sulfureuses ou huileuses , & les salines ou acides qui s'élevent n tout tems de la terre , & qui na-

gent séparément dans l'air , venant à se joindre en assez grande quantité , s'enflamment de la même manière que dans l'expérience qu'on vient de rapporter ; ce qui forme ce que nous appellons des éclairs. Comme ces matières après avoir été enflammées ne font que se séparer , elles peuvent se réunir de nouveau une infinité de fois , & produire de nouveaux éclairs, jusqu'à ce que les exhalaisons aqueuses , qui nagent aussi dans l'air , s'étant rapprochées par les secousses des éclairs , forment la pluie qui ramène sur la terre toutes les autres exhalaisons , & fait cesser le tonnerre & les éclairs. Voilà ce qui arrive, quand les exhalaisons sulfureuses & acides se trouvent dans l'air pêle-mêle avec les exhalaisons aqueuses ; mais quand elles se trouvent au-dessus , il se fait des éclairs fort fréquens sans pluie & sans tonnerre , parce que les vapeurs aqueuses n'en sont pas ébranlées , & que le bruit de la percussion de l'air ne parvient pas jusqu'à nous à cause de la trop grande distance. Or , selon ces principes , ces éclairs étant de grandes flammes , doivent chasser l'air

d'alentour, & par conséquent produire des vents, qui ne font autre chose qu'un air mis en mouvement. Quand ces éclairs durent pendant quelque tems d'un même côté, ils peuvent donner au vent une détermination suivie & durable; & comme il se fait des éclairs indifféremment par-tout, ils produisent des vents qui viennent indifféremment de tous côtés, & qui changent continuellement. Les éclairs étant produits en bien plus grande quantité vers les Tropiques qui sont au Sud par rapport à nous, font que la plupart des vents nous viennent ordinairement du côté du Sud. Ceux qui nous viennent du Nord, sont produits par la pesanteur de l'air froid, qui vient à tomber sur l'air qui avoit été raréfié par les éclairs. On observe que nos vents qui sont tous variables, viennent toujours par secouffes; d'où l'on peut conjecturer que ces secouffes sont produites par les éclairs, qui se suivent de près les uns les autres.

Par M. Homberg, Mém. de Trévoux, Août 1708. page 1412.

ARTICLE X.

*Essai sur la cause des Vents
alisés.*

TOUT le monde convient que l'action du Soleil est la cause originale des vents alisés, & qu'il les produit en causant une plus grande raréfaction de l'air, dans les lieux où ses rayons tombant perpendiculairement, ou presque perpendiculairement, excitent un plus grand degré de chaleur qu'ils ne font dans d'autres endroits; de sorte que dans ces lieux où les rayons tombent perpendiculairement, l'air devenu spécifiquement plus léger que celui qui l'environne, doit être chassé de sa place par cet air plus frais, qui est plus dense & plus pesant. Mais il semble que le seul effet de cette raréfaction doive être de faire venir avec force l'air de toutes parts dans l'endroit où il est le plus raréfié, particulièrement du Nord & du Sud, où l'air est le plus frais, &

non pas principalement de l'Est & de l'Ouest , comme on le suppose communément ; de sorte que mettant à quartier le mouvement diurne de la terre , l'air viendra de tout côté vers l'endroit où l'action du Soleil est actuellement la plus forte : d'où il suit qu'il y aura successivement un vent de Nord ou Est le matin , & un vent de Nord-Est l'après midi , de ce côté ici du parallele de la déclinaison du Soleil , & un vent de Sud-Ouest & de Sud-Est de l'autre côté.

Ce mouvement perpétuel de l'air vers l'Ouest ne sçauroit être causé par la seule action du Soleil sur l'atmosphère , comme il paroîtra plus évidemment encore par le raisonnement suivant. Si l'on suppose que la terre soit en repos , ce mouvement de l'air fera communiqué d'abord aux parties superficielles , & produira peu à peu une révolution de tout l'air vers le même côté , à moins que la même quantité de mouvement ne soit communiquée en même tems à l'air dans d'autres endroits , mais dans une direction contraire ; ce qu'on ne sçauroit supposer. Mais si le globe de la

terre avoit auparavant un mouvement à l'Est, ce mouvement de l'air doit être pour cela même continuellement retardé ; & si l'on suppose que ce mouvement de l'air naît d'une action quelconque de ses parties l'une sur l'autre, la conséquence sera la même : c'est pourquoi il semble qu'il soit nécessaire de montrer, comment ce phénomène des vents alisés peut être causé sans qu'il y ait réellement un mouvement général produit dans l'air vers l'Ouest ; c'est ce qu'on montrera facilement ; si l'on considère en même tems le mouvement diurne de la terre.

Car supposons que l'air ait partout un mouvement égal au mouvement diurne de la terre ; en ce cas il n'y aura point de mouvement relatif de la surface de la terre & de l'air, & par conséquent point de vent. Maintenant que par l'action du Soleil sur les parties qui environnent l'équateur, & par la raréfaction de l'air produite par cette action, l'air soit attiré là des parties Septentrionales & Méridionales, les paralleles deviennent toujours plus grands à proportion qu'ils sont plus proche de l'équateur ; & l'équateur est plus grand que les tropiques, à

peu près dans la raison de 1000 à 9171 ; & par conséquent la différence de leur circonférence est à peu près de 2083 milles ; & la surface de la terre se meut d'autant plus vite sous l'Equateur , que la surface de la terre avec l'air sous les tropiques : d'où il suit que l'air qui se meut des Tropiques vers l'Equateur , ayant moins de vélocité que les parties de la terre auxquelles il arrive , aura un mouvement relatif contraire au mouvement diurne de la terre dans ces endroits-là ; lequel mouvement relatif étant combiné avec le mouvement de l'air vers l'Equateur , produira un vent de Nord-Est de ce côté ici de l'Equateur , & un vent de Sud-Est de l'autre côté.

A mesure que l'air approche de l'Equateur , ces vents deviennent toujours plus forts , & de plus en plus à l'Est , jusqu'à ce qu'ils deviennent tout-à-fait Est sous l'Equateur , (comme on le trouve aussi par expérience) à cause du concours des deux courans de l'air du Nord & du Sud ; & la vitesse du vent sera à raison de 2083 milles dans l'espace d'une révolution

de la terre ou d'un jour naturel , & de plus d'un mille & un tiers dans une minute ; ce qui est une plus grande vitesse que celle du vent dans les plus grandes tempêtes : car suivant les observations du Docteur Derham , l'air ne parcourt pas alors plus d'un mille dans une minute. Mais il faut remarquer qu'avant que l'air puisse être arrivé des Tropiques à l'Equateur , il faut que la surface de la terre ou de la mer lui ait communiqué un peu de mouvement vers l'Est , par où son mouvement relatif est diminué ; & dans plusieurs circulations successives , il sera réduit à la force que l'on trouve qu'il a effectivement.

L'Auteur se sert des mêmes principes pour rendre raison des vents alisés hors des Tropiques , & il finit par ces deux conséquences. Premièrement , sans le secours du mouvement diurne de la terre , la navigation seroit prodigieusement longue , principalement vers l'Est à l'Ouest , & il seroit peut-être impossible de faire tout le tour de la terre. En second lieu , il faut que les vents de Nord-Est & de Sud-Est qui soufflent en-

tre les Tropiques , soient compensés par des vents de Nord-Ouest & de Sud-Ouest qui soufflent ailleurs ; & en général il faut que tous les vents qui soufflent de quelque point que ce soit , soient compensés par des vents contraires qui soufflent en quelqu'autre endroit , sans quoi il faudroit qu'il y eût quelque changement produit dans le mouvement de la terre sur son axe.

Par M. Hadley , Bibliothèque Britannique , Tome XIII. page 345.



ARTICLE XI.

Dissertation sur les Causes Physiques des tremblemens de Terre.

TOut effet est proportionné à sa cause ; un effet terrible , violent , impétueux , ne peut venir d'une cause légère & foible : or que peut-on concevoir de plus violent & de plus terrible , que ces secousses qui ouvrent les entrailles de la terre , & en font sortir des rochers & des flammes qui s'élèvent jusqu'aux nues ? Les mines que l'on fait jouer par le moyen de la poudre , produisent bien des effets du même genre ; mais qu'il s'en faut bien qu'ils puissent leur être égales. Il s'agit donc de trouver quelque chose qui puisse agir avec assez de violence pour produire de si terribles effets.

Nous ne connoissons rien de plus actif dans la nature que le feu : sa promptitude & sa force paroissent surtout dans la poudre , qui allumée dans un canon , chasse le boulet avec

une vitesse qui égale presque celle de la foudre; mais comme l'analogie de la poudre peut servir extrêmement à expliquer la cause des tremblemens de terre, nous commencerons par expliquer de quelle maniere la poudre s'allume & agit.

La poudre est un composé de soufre, de salpêtre & de charbon. Le soufre & le charbon sont faciles à enflammer; le salpêtre est composé de parties insensibles assez semblables à un cône, & qui quand elles sont séparées & agitées, occupent beaucoup plus d'espace que quand elles sont en repos.

Il faut supposer ensuite, ce qui est invinciblement démontré, qu'il y a une matiere dans l'univers, qui a dans toute sa masse & dans toutes ses parties une agitation & un mouvement qui passe toutes nos expressions. Sa fluidité infinie & sa délicatesse fait qu'elle trouve des passages dans tous les corps, qui à son égard sont comme des cribles, quelque solides & quelque massifs qu'ils nous paroissent. C'est parce que cette matiere trouve dans le verre & dans les liqueurs transf-

parentes des routes droites , qu'elle apporte à nos yeux des objets qui sont au-delà , comme on l'explique dans la Dioptrique. Cette matiere , malgré son mouvement infini , ne dérange sensiblement rien dans l'univers par elle-même , parce que ses parties sont trop délicates pour agir sur les corps grossiers , & qu'elle trouve dans tous ces corps des passages qui facilitent son mouvement ; semblable à l'eau d'une riviere qui ne renverse pas les ponts , quelque rapide qu'elle soit , quand elle y trouve des arches assez larges pour s'écouler. Mais comme cette riviere deviendra capable de rompre les ponts les plus solides si elle entraîne avec elle de grosses pièces de glace , des poutres & des bateaux , dont elle heurte les piles & les arcades de ces ponts ; de même cette matiere subtile , quand elle peut environner de toute part quelques parties insensibles des corps auxquels elle puisse communiquer son mouvement , il n'y a rien qu'elle ne puisse détruire & renverser avec ce secours.

Si nous concevons donc que lorsqu'on frappe un morceau d'acier con-

tre un caillou, leur dureté mutuelle, leurs inégalités, & la violence du choc fait qu'il se détache avec rapidité quelque petite partie de l'acier. Cette petite partie est emportée dans l'air en tourbillonnant : elle écarte d'elle par son mouvement toutes les parties de l'air grossier qui l'environnoient ; & ne se trouvant plus environnée que de cette matiere subtile dont nous venons de parler, elle en suit le mouvement, & paroît à nos yeux sous la forme de feu, à cause de la nouvelle façon dont elle repousse vers eux la matiere de la lumiere. Cette petite partie d'acier entre les mains, pour ainsi dire, de cette matiere subtile, devient capable de tout : elle enflammera les corps sur lesquels elle tombe, & ces nouveaux corps enflammés augmenteront l'incendie ; à peu près comme lorsqu'un vaisseau qui suit le cours d'une riviere rapide a renversé un pont de bois, les pièces de ce pont tombant dans la riviere séparées, & y acquerant du mouvement, deviennent-elles mêmes capables de causer un nouveau dégât. Ainsi lorsque cette étincelle tombe sur un grain de pou-

dre, elle en agite avec violence les parties, elle les sépare, elle les fait nâger dans cette matiere subtile qui l'environne; & les parties de ce grain de poudre faisant à la ronde le même effet sur les grains qui les touchent, toute la poudre dans quelques instans se trouve divisée jusques dans ses plus petites parties, qui nâgeant toutes dans cette matiere subtile, sont poussées de toute part avec une extrême violence. En quoi il y a deux choses à remarquer: la premiere, que le feu ne se communique à la poudre que successivement; la seconde, que les parties insensibles de la poudre avant qu'elle s'enflamme, sont en repos les unes auprès des autres, & occupent peu d'espace: mais quand séparées les unes des autres, elles tournent & pirouettent chacune à part, elles se chassent & s'écartent mutuellement. Un grain de poudre ainsi divisé par le feu, occupe environ deux mille fois plus d'espace qu'avant d'être enflammé. C'est-là le principe des effets surprenans de la poudre.

En effet si l'on conçoit que la poudre renfermée dans un espace fort

étroit , comme pourroit être l'ame d'un canon , vient tout à coup à s'enflammer , comme il lui faudroit un espace beaucoup plus grand , afin qu'elle pût se dilater autant qu'il est nécessaire , elle fait effort de toute part contre les murailles de sa prison , & il faut absolument qu'elle se fasse jour par quelque'endroit.

On peut maintenant transporter aux tremblemens de terre ce que nous venons de dire des effets de la poudre. Il y a dans la terre des concavités de différentes grandeurs , dont quelques-unes communiquent avec les eaux de la mer , & en sont remplies , d'autres sont pleines seulement des exhalaisons qui s'échappent des terres voisines ; & ce sont ces gouffres qui donnent occasion aux tremblemens de terre. Voici comme on peut concevoir la chose. La terre intérieure est presque toute métallique ou minérale ; il n'est donc pas possible , que vers les régions où il s'engendre des mines de soufre , de salpêtre , de fer , ces gouffres souterrains ne se remplissent insensiblement d'exhalaisons sulfureuses , de parties subtiles de nitre , de fer ,

de bitume , &c. qui arrêtées par les voutes de ces cavernes s'y condensent , & forment un air épais très-capable de s'enflammer , & assez semblable à cette fumée grasse que rend une chandelle mal éteinte : car l'expérience nous apprend que cette fumée s'enflamme si aisément , que si on met une chandelle allumée au-dessus , la flamme en descendant suit cette fumée jusqu'à sa source , & rallume ainsi la chandelle qui étoit éteinte.

Il ne s'agit plus maintenant que de trouver quelque cause qui mette le feu à ces exhalaisons. Or il peut y en avoir plusieurs au lieu d'une : car une pierre peut, en se détachant des voutes naturelles de ces cavernes , produire par sa chute quelque étincelle ; ce qui suffit à une matiere si disposée à prendre feu. D'ailleurs comme le dedans de ces cavernes est enduit d'une croute de soufre , de bitume , de salpêtre qui s'y attache , quelques morceaux de cette croute peuvent en tombant des voutes où ils étoient collés , rouler sur d'autres croutes & s'enflammer , comme quelques peuples de l'Amérique n'allument du feu qu'en frottant
avec

avec force deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Enfin une exhalaison acide se mêlant à celle qui remplit déjà ces cavernes, peut l'enflammer ; comme il arrive dans la Chymie, où le mélange de l'esprit de nitre avec l'huile de térébenthine produit tout à coup une chaleur & des flammes qui surprennent. .

Supposé donc que quelqu'une de ces causes ait enflammé les exhalaisons contenues dans ces lieux souterrains , il doit arriver ce que nous avons dit de la poudre , c'est-à-dire , que tout à coup cette matière enflammée se dilate , & fait effort pour crever la prison. Souvent l'exhalaison n'est pas en assez grande quantité , & les terres qu'il faudroit soulever pour se faire jour sont trop épaisses ; & alors les peuples qui habitent les lieux sous lesquels ces choses se passent , n'entendent que des bruits sourds qui viennent de dessous la terre , & ne sentent que de légers frémissemens , quelquefois même rien du tout , comme il arrive lorsqu'on n'a pas chargé assez une mine : la

poudre qui ne s'y trouve pas en assez grande quantité , ne pouvant soulever le poids d'un bastion , ou de quelqu'autre édifice , demeure sans produire au dehors aucun effet sensible.

Quelquefois l'exhalaison étant assez forte , comme elle ne peut pas se faire jour ni vers le centre de la terre , ni vers les côtés des cavernes , à cause de la résistance qu'elle y trouve , elle souleve les terres , & se fait un passage en haut vers la surface ; de-là ces feux horribles , qui dans les tremblemens de terre sortent quelquefois des abymes pour s'élancer dans les airs. Quelquefois lorsque la surface de la terre soulevée s'entr'ouvre , il se détache des deux côtés de l'ouverture des rochers , des sables , des matières minérales que leur pesanteur portent en bas. Mais toutes ces matières rencontrées par l'exhalaison qui se fait jour , sont repoussées en haut avec tant de violence , & en si grande quantité , que les pays voisins en demeurent couverts , & qu'elles forment des montagnes.

considérables. Ces rochers & ces terres minérales mêlées à une flamme si vive & si active, se fondent quelquefois, & ressemblent assez au machefer, que les Forgerons trouvent dans leurs fournaïses ; le reste s'en va en cendres, que le vent porte au travers des airs jusques dans des lieux fort éloignés : c'est ainsi que les ouragans qui accompagnent quelquefois ces grands phénomènes, ont porté jusqu'en Afrique des cendres du Mont Etna par-dessus la mer Méditerranée.

Mais il n'arrive pas toujours que des flammes sortent de la terre, ni que l'exhalaison après avoir ébranlé & secoué les terres voisines lorsqu'elle s'est enflammée, s'ouvre un passage nouveau ; elle s'échappe quelquefois par destrous, tantôt imperceptibles, tantôt assez sensibles, & cela sans rien renverser, semblable à ces mines éventées, qui ne produisent qu'une petite partie de leur effet. Tout l'air néanmoins se trouve mêlé d'une odeur de soufre & de salpêtre, qui avertit assez que l'exhalaison est sortie. Les fontaines tarissent quelquefois pour

quelque tems , parce que cette matière enflammée qui s'élève , emporte avec elle & dissipe les vapeurs , qui se condensant vers la superficie de la terre , formoient les fontaines ; & quelquefois il paroît de nouvelles fontaines , parce que l'ébranlement des terres a déterminé les canaux ou les lits de la terre glaise à pancher vers de nouveaux endroits , ou formé même de nouveaux canaux.

On voit facilement pourquoi nous sentons quelquefois en France les tremblemens de terre dont les causes sont sous l'Italie & la Sicile. Les terres de ces régions étant continues avec les nôtres , du moins par dessous les mers , elles ne peuvent recevoir de grandes secousses , que leur continuité ne les transmette jusqu'à nous. En effet les terres étant appuyées les unes contre les autres , & liées ensemble par des chaînes de rochers , le mouvement se communique de là jusqu'à nous , & plus loin même : car il va toujours en diminuant.

Les peuples sous lesquels s'engendrent & s'amassent les exhalaïsons sulfureuses , sentent que la terre se sou-

leve sous leurs pieds. Tout paroît s'écrouler ensuite ; ils entendent un fracas de rochers brisés , des mugissemens affreux ; leurs genoux semblent se dérober sous eux ; & ils ne sauroient courir sans tomber ; mais ceux qui en sont éloignés , sentent seulement la terre poulée & repoussée vers quelque point de l'horison.

Les lieux élevés sentent bien mieux les impressions d'un tremblement de terre que les lieux bas. Ainsi on s'aperçoit plus aisément de ses secousses au haut d'un grand édifice , que sur le niveau de la campagne , parce qu'on est alors plus éloigné du centre du mouvement.

Il reste maintenant à expliquer la cause des secousses continuées , qui accompagnent ordinairement les tremblemens de terre. Qu'est-ce qui produit ces ébranlemens réitérés , qui durent quelquefois plusieurs jours ? Ceux qui travaillent aux feux d'artifices , en se servant de fils soufrés ou de trainées de poudre qui portent le feu en différens endroits , font durer très-long-tems ce spectacle agréable. C'est à peu près ainsi que nous devons penser que

le feu se communique peu à peu à différentes cavernes : il se glisse de l'une à l'autre par le moyen des soufres dont il y a des veines répandues dans les terres , qui portant la flamme de caverne en caverne , réitérent les secousses , & redoublent la peur & la consternation des peuples qui demeurent au-dessus. Quelquefois l'exhalaison enflammée renverse & enfonce les murs naturels qui séparent une caverne d'une autre , & y porte le feu. Alors ces deux effets se suivent de si près , & communiquent aux terres supérieures des ébranlemens si divers & si prompts , que ce sont ces tremblemens-là qui renversent les édifices les plus solides.

On peut penser raisonnablement qu'il arrive quelquefois, que de grands tremblemens ayant rompu les côtés de ces cavernes souterraines , & détaché de leurs voûtes des pièces énormes de rochers qui soutenoient la surface de la terre , cette surface s'affaisse insensiblement , & s'approche du centre ; d'où il arrive , que si la mer n'est pas si éloignée , les eaux gagnent , & couvrent insensiblement ces campa-

gnes , qui après avoir été habitées par les hommes , se trouvent peu à peu inondées. Que si la mer n'est pas voisine , les sources & les ruisseaux d'alentour s'y rendent comme dans des lieux plus bas , & y forment des lacs plus ou moins grands , selon l'étendue & la figure des terres qui se sont affaîssées.

Nous avons dit qu'il y avoit des cavernes souterraines remplies d'eau qui communiquoient à la mer, & celles-ci sont plus proches du centre de la terre; peut-être même que tout le centre de la terre, jusqu'à une très-grande distance, en est occupé : car l'Ecriture marque, que la terre est fondée sur les eaux. Il peut donc arriver, que les eaux détremper sans cesse le haut de ces cavernes qui les retiennent : elles en détachent des morceaux quelquefois aussi grands qu'une Province, qui se précipitant avec la vitesse qu'on peut concevoir dans ces abîmes, en divisent les eaux avec violence, & causent par leur chute un tremblement de terre presque universel, mais peu dangereux, & de peu de durée.

Il est aisé de faire voir , que l'explication que nous venons de faire des tremblemens de terre , est conforme à l'expérience. La Sicile & l'Italie sont les régions que nous connoissons les plus sujettes à ces accidens. Or tout le monde sait , que la Sicile surtout & le Royaume de Naples , sont pleins de soufre , de salpêtre , de fer &c. Le mont Etna & les environs sont si pleins de trous & de crevasses qui pénètrent bien avant dans les terres , qu'on peut croire que le dessous de ces Pays est tout en cavernes & en voûtes. Tout le terroir du mont Hecla en Islande , est de la même nature. Dans l'Isle de Ténériffe une des Canaries , où il se fit il y a quelques années des tremblemens de terre & des vomissemens de flammes si affreux , qu'il sembloit aux Habitans , que l'Univers allât retomber dans l'ancien cahos , on trouve du soufre , du salpêtre , du fer , & le terroir n'est au-dessous qu'un rocher plein de trous & de cavernes ; d'où il s'ensuit , que la résistance étant plus grande , l'effet en doit être plus violent.

Que si on veut voir en petit , & sans danger ,

danger, une imitation des tremblemens de terre, il n'y a qu'à faire un mélange de parties égales de soufre, de limaille de fer, du poids de 50 livres ; réduire le tout en pâte avec un peu d'eau, ensuite enfouir cette masse renfermée dans un pot de terre long & étroit, à un pied de profondeur en terre : quand la chaleur du Soleil en Été (car il faut que ce soit en Été) a échauffé cette composition, elle se fermente, s'agite, soulève la terre, y fait des crevasses d'où il sort des vapeurs sulfureuses mêlées de flammes : les ouvertures s'élargissent, & il s'en élève des cendres jaunes & noires, qui se répandent tout autour.

On peut aisément reconnoître dans cette expérience toutes les circonstances de notre explication. Le pot de terre long & étroit représente les cavernes souterraines ; la limaille de fer & le soufre, les exhalaisons sulfureuses & nitreuses qui y sont renfermées, & qui s'y allument : les secousses de la terre, les flammes & les cendres élançées au loin, tout cela est commun dans l'un & dans l'autre, & se fait de la même manière & par les

mêmes raisons en grand & en petit ; mais il y a cette différence, que la nature travaille dans ses grands laboratoires souterrains avec plus de lenteur, que l'art qui emploie les matieres toutes préparées.

Pour ce qui est des ouragans qui accompagnent souvent les tremblemens de terre , on conçoit assez qu'une exhalaison enflammée, qui sort avec une impétuosité inexprimable du sein des cavernes souterraines, & s'élance dans l'air, y doit causer de grands mouvemens, & y former des tourbillons capables de tout renverser, & d'étouffer par sa seule chaleur & sa nature sulfureuse, les hommes & les animaux qu'elle rencontre dans sa route.

Par le P. Aubert Jésuite, Mémoires de Trévoux, Juin 1728. p. 1058.



ARTICLE XII.

*Sur les Causes, les Prognostics
& les différentes sortes de
Tremblemens de terre.*

LEs anciens & nouveaux Philo-
sophes ont toujours été fort
partagés sur la cause des trem-
blemens de terre, Democrite, Ana-
ximenes, Epicure, Lucrece & plu-
sieurs autres, croyoient qu'il rouloit
sous la terre de grands fleuves, &
qu'il y avoit des lacs fort étendus,
& de grandes cavernes; que l'eau,
le feu ou le tems venant à ronger les
soutiens de ces cavernes, elles tom-
boient & se précipitoient avec de gros-
ses masses de terre qu'elles soute-
noient, & souvent des montagnes en-
tieres; ce qui, selon eux, ébranloit
& faisoit trembler non-seulement les
terres voisines, mais encore les plus
éloignées, & quelquefois même la
terre entière, lorsque ces grosses mas-
ses de terre tombant dans ces lacs sou-

terrains , excitoient dans les eaux un mouvement alternatif , si fort & si violent , qu'il pouvoit faire pencher la terre d'un côté & d'autre.

Quelques-uns ont crû , que cela pouvoit arriver par la violence des vents , comme Aristote , au rapport de Plutarque qui dit , que si lorsque quelque exhalaison est en mouvement , elle trouve le passage fermé , elle retourne pour lors en arriere , & se replie sur elle-même ; de sorte qu'en heurtant de tous côtés , pour chercher un passage , ou rompre l'obstacle qui le lui ferme , elle ébranle ainsi la terre.

D'autres Philosophes , persuadés que les effets violens de quelques tremblemens de terre , tels que furent ceux du tremblement qui arriva dans le Pérou proche de Lima , qui s'étendit environ trois cens lieues le long du rivage de la mer , & soixante & dix au dedans du continent , bouleversant les Villes & les montagnes , transportant le lit des fleuves & les sources des fontaines , faisant disparaître quelques lacs , & en découvrant où il n'y en avoit jamais eu , &c. ou de celui qui , en 1538 forma une nouvelle Isle de

quatre lieues de tour entre celles des *Terceres*, par la quantité de pierres que la mer vomissoit avec un bruit & un fracas épouvantable : persuadés, dis-je, que tels effets ne peuvent être produits par la violence des vents, les attribuent à l'inflammation des exhalaisons souterraines, lesquelles, selon la disposition des cavernes où elles s'enflamment, ont plus ou moins de violence, ainsi qu'il arrive dans une mine où, selon la nature du terroir, la poudre en s'allumant fait plus ou moins de fracas.

Les tremblemens de terre qui se font sentir si souvent dans les lieux où l'on voit des montagnes qui vomissent des flammes, semblent appuyer cette opinion, que nous regardons comme la plus probable ; & Pline qui est dans ce sentiment, & qui compare les tremblemens de terre au tonnerre, en rapporte un fait extraordinaire, qui arriva près de Rome à la vûe de quantité de Chevaliers Romains, où l'on vit deux montagnes s'entrechoquer plusieurs fois avec un grand bruit & un grand fracas ; & dans le tems qu'elles s'approchoient & s'éloignoient ainsi :

il sortoit du milieu de ces montagnes des tourbillons de flammes & de fumée , ce qui faisoit un spectacle qui en même - tems jettoit l'admiration & l'horreur dans les esprits.

Quant aux signes ou prognostics des tremblemens de terre , Aristote , Plin & Seneque en rapportent un grand nombre , qui peuvent se réduire à quatre. Le premier est , lorsque les flots de la mer s'enflent & s'élèvent sans qu'il fasse aucun vent , lors même que le ciel est le plus serein & le plus tranquille , ainsi qu'il arriva dans le tremblement d'Antioche , & celui qu'on ressentit à Calais l'an 1580 : le second , lorsque l'on entend des bruits souterrains ; ce qui arriva en Italie au tremblement de Ferrare, où l'on entendit de grands bruits comme des coups de canon : le troisième , quand les oiseaux & autres animaux demeurent comme étonnés & stupides ; ce que l'on remarqua par la retraite des troupeaux dans le tremblement arrivé à Dijon. Le quatrième enfin , quand l'eau des puits se trouble , devient d'un mauvais goût ou d'une odeur puante , comme on l'a souvent éprouvé , & en

particulier à Strasbourg. Il ne nous reste plus à parler que des différentes sortes de tremblemens de terre.

Ammian Marcellin rapporte, après Aristote, plusieurs especes de tremblemens de terre, ou plutôt plusieurs effets différens de ces tremblemens. On en peut rapporter quatre des plus considérables : le premier est, lorsque dans le tremblement la terre s'élève par faillies & se remet en place : le second, lorsque la terre comme par un bouillonnement, vomit une grande quantité de sable, de terre, de rochers, &c. ainsi qu'il arriva lorsque l'Isle de Delos se découvrit, ou dans le tremblement de Ferrare en 1570, qui jetta fort loin par une caverne une grande abondance de sable ; ou enfin comme dans celui de Pouzolles près de Naples, où l'on vit sortir de la terre dans une nuit des cendres & des montagnes de pierres-ponces. Le troisiéme est, quand un Pays est ébranlé de côté & d'autre ; ce qui cause souvent la ruine des bâtimens & des Villes entieres. Le quatriéme enfin, lorsque la terre s'affaissant ou s'abîmant, les montagnes s'applanissent.

ou qu'il s'ouvre de grands gouffres dans les campagnes, qui engloutissent les Villes & les Habitans, comme Plin rapporte qu'il arriva du tems de Neron; ce qui a donné occasion à quelques Philosophes de craindre, qu'il ne se fit enfin quelque jour un bouleversement général de la terre.

*Journal des Savans, Lundi 1 Juint
1682. pag. 164.*

ARTICLE XIII.

*Conjectures sur la cause physique
des Débordemens du Nil.*

SI l'on ne considère que le débordement du Nil, sans faire attention aux signes merveilleux qui le précédent, & aux effets qui le suivent, il est assez facile de rendre raison pourquoi ce fleuve inonde tous les ans les campagnes de l'Égypte. Car on pourroit dire que les pluies, qui font le débordement des autres rivières, sont aussi cause de celui du Nil; & com-

me les pluies aussi-bien que les vents sont ordinairement réguliers entre les Tropiques , on n'auroit pas de peine à expliquer pourquoi ce fleuve se déborde toujours en un certain tems de l'année. Mais parce que cette inondation est accompagnée de plusieurs circonstances qui ne peuvent pas venir de cette cause , il faut chercher une autre raison.

Selon M. de la Chambre , Auteur de ces Observations , c'est le nitre dont le Nil est plein , qui cause les débordemens de ce fleuve : & voici les preuves qu'il en apporte.

Le sel est le principe de la fertilité de la terre , aussi-bien que de la fécondité des animaux : car toutes les choses qui servent à engraisser la terre , sont pleines de sel ; & on a observé , qu'en faisant tremper dans l'urine les graines avant que de les semer , elles levent plutôt , & deviennent plus grosses & plus fortes , à cause du sel que l'urine leur a communiquée. Il est même probable , que ce qui rend la semence des animaux féconde , c'est qu'une des veines spermatiques prend son origine de l'émulgenté , par la-

quelle passent les sérosités nitreuses & salées, qui se déchargent dans les reins & dans la vessie.

Ce qui fait pousser les plantes au Printems, c'est que la terre étant fermentée par le nitre, les esprits nitreux s'insinuent dans leurs pores. Tous ces petits trous qu'on voit dans la terre après la pluie, pleins d'une poussière moite & légère, ne sont qu'un effet de la fermentation, que les esprits de nitre ont faite dans la terre qu'ils ont soulevée en s'évaporant. Autant de considérations qu'il étoit nécessaire de faire, avant que de passer aux principales circonstances du débordement du Nil.

Trois ou quatre jours avant que ce fleuve commence à se déborder, toute son eau se trouble : il tombe alors une certaine rosée, que les Egyptiens appellent la goutte, qui a vertu du levain, & fermente la pâte exposée à l'air. Le limon qu'on a tiré de l'eau devient plus pesant, lorsque ce débordement commence, qu'il n'étoit auparavant ; & par l'augmentation du poids de ce limon, on juge de la grandeur du débordement qui doit arriver.

Notre Auteur prétend , que le nitre dont le Nil abonde , est cause de tous ces effets surprenans. Car lorsque le nitre est échauffé par la chaleur du Soleil , il se fermente , & se mêlant parmi l'eau , la rend trouble , l'enfle & la fait passer par dessus ses bords de la même maniere que les esprits qui sont dans le vin lorsqu'il est nouvellement fait , le rendent trouble , & le font bouillir dans la cuve. Et certainement il est assez-vraisemblable , que ce limon que le Nil charie , ne vient pas de loin ; autrement il élèveroit enfin tellement les bords du rivage de ce fleuve , qu'il ne pourroit plus se répandre sur les terres. Cependant depuis plus de deux mille ans ses bords n'en sont pas devenus plus hauts puisqu'il ne lui faut maintenant que seize coudées de crue pour inonder les terres , non plus que du tems d'Hérodote ; ce qui fait voir que ce limon n'est qu'un nitre volatil , qui venant à s'exhaler , n'augmente point le terrain. C'est pourquoi la conjecture d'Herodote , qui croyoit que l'Égypte intérieure n'avoit été autrefois qu'une mer , qui s'est remplie par l'abord continuel

de ce limon , est aussi mal fondée que la peur qu'il avoit , que les bords de ce fleuve s'élevant tous les ans , les eaux ne se pussent plus un jour répandre sur les terres.

Cette rosée , que les Egyptiens appellent la goutte , & l'augmentation du poids du limon , viennent aussi de la même cause : car les esprits du nitre dont l'eau du Nil est pleine , s'étant élevés dans l'air avec les vapeurs qui exhalent continuellement de ce fleuve , il se fait de leur mélange une rosée qui rafraîchit l'air , fait cesser les maladies , & produit tous ces autres admirables effets qui la font souhaiter des Egyptiens avec tant de passion ; & ces mêmes esprits de nitre se joignant à la pâte & au limon , font lever l'une , & augmentent les poids de l'autre.

Ce que M. Buratini remarque , qu'au tems de ce débordement les rivières des lieux voisins vomissent le nitre tout liquide , & qu'on voit sortir de la terre quantité de cristaux de nitre , sert beaucoup à fortifier cette conjecture , qui est encore confirmée par la fertilité que le limon de ce fleuve

ve communique à la terre. Car les plantes y naissent en si grande abondance , qu'elles s'étoufferoient les unes les autres , si l'on n'y remédioit en jettant du sable dans les campagnes ; de sorte que les Egyptiens ont la même peine à répandre ce sable pour dégraisser leurs terres , que les autres Peuples en ont à engraisser les leurs par le moyen du fumier qu'ils y répandent.

*Journal des Savans , Lundi 21 Juin
1666, Discours par M. de la Chambre.*



ARTICLE XIV.

Dissertation sur la cause du Flux & du Reflux de l'Euripe.

L'Isle de Negrepont s'étend le long de la Côte Orientale de la Grece, partie du Sud au Nord, partie du Sud-Est au Nord-Ouest. Le bras de mer qui la sépare de terre ferme, forme un canal d'environ deux cens milles de long. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que ce canal est si inégal, qu'en de certains endroits il n'a pas plus d'un mille de large, & quelquefois beaucoup moins, & qu'en d'autres endroits il forme des golphes de vingt à trente lieues de largeur. En second lieu, quoique tout ce canal soit plein de courans, ce n'est à proprement parler, que sous un pont de bois que le flux & le reflux se fait sentir d'une maniere qui surprend. On le passe au sortir de la Forteresse de Negrepont pour aller en Terre-Ferme. On voit la mer couler avec beaucoup de

rapidité tantôt d'un côté & tantôt de l'autre ; de sorte que la roue d'un moulin qu'on a pratiqué dans la muraille de la Forteresse au Midi du pont , tourne tantôt au Sud & tantôt au Nord , selon que les eaux coulent d'un côté ou d'autre ; ce qui arrive communément tous les jours.

Vers le milieu du canal , long d'environ deux cens milles , l'Isle de Negrepont s'approche tellement de Terre-Ferme , qu'il n'y a presque aucun lieu de douter qu'elle ait été autrefois attachée en ce lieu - là , tant le canal est étroit , & tant il y a peu de profondeur. C'est sur cette pointe de l'Isle qu'est bâtie la Forteresse de Negrepont , sur un terrain peu élevé par rapport à la terre voisine , qui s'élevant du bord de la mer par une pente assez roide , forme la montagne sur laquelle est situé le Fort nommé *Carabala*. L'espace qui est entre la Forteresse & la Terre-ferme , est d'environ cent pas. Il est occupé en partie par deux Tours , bâties autrefois par les Vénitiens avant que Mahomet II. eût conquis cette Isle sur eux, Mais comme ces Tours se suivent du Sud au

Nord, il n'y en a qu'une qui occupe la largeur du canal. Cette Tour est jointe à la terre - ferme par un pont de pierre de cinq à six petites arches, sous lequel il coule si peu d'eau, qu'il n'y a point d'Esquif, pour petit qu'il soit, qui puisse y passer. Reste l'espace qui est entre la Tour & la Forteresse : il est d'environ 30 pieds ou 20 pas. Cet espace est occupé par le pont de bois dont on vient de parler, & sous lequel l'Euripe se fait sentir dans toute sa force. Il y a pareillement si peu d'eau sous ce pont, qu'il n'est pas possible qu'un Vaisseau, si petit qu'il soit, y passe, même étant déchargé. Les Barques mêmes, quand elles sont d'environ mille tonneaux de port, ne sauroient y passer que déchargées. Souvent même il faut ôter une partie du lest; & pour leur donner passage, on est obligé de lever de part & d'autre une partie du pont de bois, dressé entre la Tour & la Forteresse.

Pour faire voir quelle est la cause de l'Euripe, il ne reste plus qu'une chose à ajouter. C'est que les montagnes de l'Isle de Negrepont, aussi-bien que celles de la Terre - Ferme qui lui est opposée,

opposée , sont fort hautes , & rendent ce canal sujet à des vents violens. Ils y sont si variables , qu'ils regnent pour l'ordinaire au Nord-Est & à l'Est pendant le jour , & au Nord-Ouest & à l'Ouest pendant la nuit ; au lieu que dans les autres bouches , qui sont dans l'Isle de Negrepont & celle d'Andros , Andros & Tine , Tine & Miconi , Miconi & Nicassie , Nicassie & Samos , Samos & la Terre-Ferme d'Asie , les vents y sont pour l'ordinaire fort opiniâtres au Nord.

Ces faits supposés , il est aisé de concevoir premièrement, que le flux & le reflux de l'Euripe vient de ce que la mer est quelquefois plus haute , & quelquefois plus basse , dans un côté du canal que dans l'autre. De - là il arrive , que les eaux dont la situation naturelle est d'être au niveau , trouvant sous le pont de bois que nous avons marqué , un passage ouvert pour couler de la partie du canal où elles sont plus élevées , dans celles où elles le sont moins , ne peuvent manquer d'y couler , & de former un courant qui varie du Nord au Sud , & du Sud au Nord , selon que les vagues sont plus

hautes d'un côté ou d'autre.

En second lieu , il n'est pas moins clair que cette variation des vagues vient des vents violens & variables , auxquels nous avons remarqué que le canal de Negrepont est sujet. Les hautes montagnes , entre-coupées de divers valons dont il est entourré , en font la véritable cause. Il est sûr , que selon que les vents seront plus ou moins violens d'un côté du canal que de l'autre , & qu'ils y entreront plus ou moins directement , la mer y sera plus ou moins haute , & le niveau des eaux plus ou moins trouble : il arrivera de-là que l'eau , sous le pont dont on a parlé , devra couler tantôt d'un côté & tantôt de l'autre. Mais comme les vents ne sont pas tellement réglés dans ce canal , qu'ils commencent & finissent toujours à la même heure , quoique le flux arrive pour l'ordinaire tous les jours , quelques heures d'un côté , & quelques heures de l'autre , il ne se fait pas avec ce mouvement impétueux qu'on voit dans les vagues , lorsque pendant la tempête l'une pousse l'autre , mais par un mouvement doux & uniforme , semblable à celui qu'on

remarque dans les eaux , qui coulent d'un réservoir dans un autre.

Pour rendre la chose encore plus intelligible , supposons un vase de la figure du canal de Negrepont , c'est-à-dire , composé de deux especes de bouteilles à demi-pleines , qui communiquent entr'elles par un tuyau commun : il est sûr que quand il n'arrivera aucun accident à la liqueur enfermée dans ces bouteilles , qui en trouble le niveau , il ne se fera ni flux ni reflux de l'une à l'autre , comme il arrive quelquefois dans l'endroit où se forme l'Euripe. La mer y est presque sans mouvement ; mais du moment que les eaux viendront à s'élever dans l'une des bouteilles plus que dans l'autre ; elles commenceront à couler de l'une dans l'autre , jusqu'à ce que celles-ci venant à s'enfler à leur tour , elles se trouvent de niveau.

Or il est sûr que ce qui trouble le niveau des eaux dans le canal de Negrepont , ce n'est ni l'influence de la Lune , ni la pression de ce corps céleste , ni le mélange de certains esprits qui y causent de la fermentation , puis-

S'ij

que ces raisons vaudroient pour les mers voisines, où ce flux & ce reflux n'arrivent point; d'ailleurs le cours de l'Euripe n'a point du tout de rapport avec celui de la Lune. Les courans y changent souvent deux fois en 24 heures, & quelquefois trois, quand les zems sont obscurs & orageux. Il faut donc avoir recours à d'autres principes. Il est constant que ce qui trouble pour l'ordinaire le niveau des eaux de la mer, ce sont les vents dont elle est agitée; d'ailleurs l'expérience enseigne, que selon la diversité des vents qui regnent, & qu'à proportion de leur violence ou de leur douceur, les gens de mer jugent sûrement si les courans seront bons pour entrer dans le canal de Negrepont: il s'ensuit donc que le flux & le reflux de l'Euripe n'a point d'autre cause, que les vents variables qui élèvent les vagues tantôt d'un côté & tantôt de l'autre, & qui troublent le niveau des eaux, les font quelquefois couler du Sud au Nord, & d'autres fois du Nord au Sud.

On peut former ici une objection. Sur le pont même, où nous avons

dit que l'Euripe se fait sentir avec le plus de force, on voit souvent le vent souffler du Nord au Sud, tandis que le courant vient du Sud au Nord. On pourroit conclure de-là, ce semble, que le flux & le reflux de l'Euripe ne vient point des vents.

Le fait est vrai; mais les Habitans du Pays & les Matelots nous apprennent, que ce vent du Nord est à peine levé, qu'il a déjà dompté en partie la rapidité du courant; & qu'outre cela c'est une assurance, que les eaux doivent bientôt changer de cours, & suivre celui du vent. En effet pour peu qu'on ait été sur mer, on sait assez que le vent ne s'étend pas en un instant d'un lieu à l'autre; qu'il peut être Nord-Ouest dans la moitié du canal de Negrepont, & Nord-Est ou Sud-Est dans l'autre moitié. Il y a plus: quand le vent seroit le même partout le canal, il ne s'ensuivroit pas qu'il se fût d'abord soumis tous les flots qu'on voit venir d'un côté, tandis que le vent vient de l'autre, à cause d'un vent plus violent qui a précédé. Ainsi ce ne seroit pas une chose surprenante, quand la mer se trouveroit tellement

élevée dans la moitié du canal de Negrepoint , à cause des vents qui y ont regné quelque tems auparavant , qu'il fallût plusieurs heures du vent opposé pour calmer ces flots , & pour élever de plus hautes vagues dans l'autre moitié.

Ce système ne pourroit-il pas servir pour expliquer le flux & le reflux en général de l'Océan ? Il semble qu'en matière de flux & de reflux , il est naturel d'en expliquer un plus grand par un plus petit , & de se figurer que l'un & l'autre sont de même espèce. Nous voyons que dans la Méditerranée , où les vagues sont peu élevées , le flux & le reflux n'est presque point sensible ; & qu'au contraire dans la mer Océane , où les vagues sont très-hautes , le flux & le reflux s'y fait sentir dans toute sa force. Il est donc clair qu'il y a une grande connexion entre les vagues & le flux & le reflux. Mais ces vagues ne sont-ce pas les vents qui les élèvent ? Ainsi ne peut-on pas dire, que si la Lune sert à régler par son cours le flux & le reflux de la mer , ce n'est qu'autant qu'elle sert à régler les vents ?

De plus il est certain , que chaque mer & chaque golfe a pour l'ordinaire de certains vents qui leur sont propres , & qui y regnent le plus souvent. Pour peu que la mer soit agitée , on la voit former sur le rivage une espece de flux & de reflux en avançant ses eaux jusqu'à un certain point , d'où elle ne les retire que pour les y porter d'érêchef , jusqu'à ce qu'elle se calme peu à peu. On pourroit donc conclure , ce semble , que les émotiions violentes que l'Océan souffre continuellement par les vents dont il est agité , sont suffisantes pour produire un flux & un reflux , tel qu'on le remarque dans la Manche & sur les Côtes voisines. Si dans les tempêtes la mer s'élève quelquefois au-dessus de toutes les digues , qui peut douter qu'un corps aussi fluide que le sont les eaux de la mer , agitées , comme nous le voyons dans l'Océan , avec quelque sorte de regle & d'uniformité par tant de vents violens qui y élèvent de si hautes vagues , ne puisse s'étendre réglément pour reprendre son niveau ? Si cette cause nous suffit pour expliquer un effet si merveilleux , qu'est-il besoin

d'en aller chercher d'autres plus propres à embarrasser la matiere qu'à l'éclaircir ?

*Mémoires de Trévoux, Mai 1705.
pag. 871.*

A R T I C L E X V .

*Sur les Seiches, ou le Flux & le
Reflux du Lac de Geneve.*

O N observe un flux & reflux singulier à la partie supérieure & inférieure du Lac, c'est-à-dire, à l'entrée du Rhône, qui le traverse selon sa longueur, & à l'issue de ce fleuve où se trouve la Ville de Geneve. L'eau croît subitement d'un pied plus ou moins, & décroît bientôt avec vitesse; & cette alternative de hautes & basses eaux se succède plusieurs fois de suite en un jour, de maniere cependant, que les intervalles de tems entre les crues sont plus ou moins grands, suivant que l'élévation des eaux est plus ou moins considérable.

Lorsque

Lorsque les eaux du lac montent de 7 à 8 pouces , l'intervalle entre deux crues est d'environ 15 à 16 minutes , & de 24 à 26 lorsqu'elles montent d'un pied.

Il n'est pas aisé d'assigner la cause de ce phénomène : quelques personnes l'ont attribué à des vents souterrains qui s'échappent avec violence & par reprise , soulevant les eaux du lac ; mais si cette cause avoit lieu , on apercevrait les crues d'eau ailleurs qu'aux extrémités du lac : il bouillonneroit , & l'on verroit sortir des bulles d'air de sa surface ; ce que l'on n'a pas encore observé.

M. Fatio de Duillier , savant Géometre , qui connoissoit parfaitement l'histoire naturelle des environs du lac de Geneve , attribue cette espece de flux & de reflux aux vents orageux du Midi , lesquels soufflant avec violence , soutiennent les eaux de ce lac , & les empêchent de s'écouler dans le Rhône avec la même abondance , jusqu'à ce que le vent venant à diminuer , ou l'eau surmontant par sa pesanteur l'effort du vent , elle coule avec plus de liberté & en plus grande quantité

qu'auparavant. Mais comment accorder cette explication avec les seiches qui arrivent en tems sec, comme on l'a souvent remarqué ? & comment rendre raison par-là de ce qu'elles arrivent à l'extrémité du lac où est située la Ville de Geneve, & d'où en montant vers le Nord-Est, ce lac est renfermé dans un canal d'environ quatre lieues de longueur, sur une demi-lieue ou une lieue de largeur tout au plus ?

M. Jallabert, avant que de proposer l'explication qui lui paroît la plus vrai-semblable, fait ces deux remarques.

1^o. Que vers l'embouchûre du Rhône dans le lac, on n'observe les seiches qu'au Bouveret & à Villeneuve, Bourgs situés au fond des deux petits Golfes, l'un à gauche, l'autre à droite des bouches de ce fleuve. Dans les endroits plus éloignés de cette extrémité du lac, à Saint-Gingo, par exemple, qui n'est pas à une lieue de Bouveret, & à Vervei, qui ne s'éloigne pas de deux lieues de Villeneuve, ce phénomène est tout-à-fait inconnu. A l'autre extrémité vers Geneve, le flux & le reflux n'a lieu que dans la

partie du Rhône qui est au-dessus du confluent de ce fleuve & de la rivière d'Arve, qui se jette dans le Rhône à moins d'un mille au-dessous de Geneve; c'est-à-dire, que les seiches ne se manifestent dans cette partie du lac qu'à deux ou trois milles au-dessus de Geneve, qui est à peu près le terme où le lac commence à acquérir de la pente, pour se faciliter la sortie des eaux qu'il a reçues dans son sein.

2°. Que les tems auxquels on apperçoit les seiches, sont ordinairement des tems couverts qui menacent de la pluie, où l'air est fort adouci, & pendant lesquels les neiges fondent en plus grande quantité sur les montagnes, l'expérience ayant appris qu'un pareil tems accélère plus la fonte des neiges, que ne feroit un beau Soleil.

Ces faits établis, M. Jallebart entre dans l'explication du phénomène, en commençant par les seiches qu'on apperçoit près de l'embouchûre du Rhône.

On fait que ce fleuve prend sa source au mont *Forca*, ou de la Fourche, qui est à l'extrémité orientale du Pays de Valais; & qu'avant que de se jet-

ter dans le lac , il coule entre d'autres montagnes du même Pays toujours couvertes de neiges. Dans le tems doux la neige fond , le Rhône s'enfle considérablement , & entrant alors avec impétuosité dans le lac , il en chasse les eaux à droite & à gauche dans les deux petits golfes situés près de son embouchûre , & au fond desquels sont Villeneuve & le Bouveret. Ces eaux s'élevent sur les rives de part & d'autre , & retombent ensuite par leur propre poids devenu supérieur à l'action des eaux du Rhône contre elles , & reprennent le niveau du reste du lac ; & comme l'impétuosité du Rhône ainsi enflé subsiste un certain tems, il doit résulter de son action sur les eaux du lac , & de la réaction de celles-ci , un flux & reflux , qui se succèdent à peu près comme les allées & les venues d'une pendule. Du reste il ne faut que jeter les yeux sur une Carte du lac de Geneve , pour voir que les seiches qui se font sentir à cette extrémité , ne sçauroient passer au-delà de Villeneuve & de Bouveret ; parce que ce lac y acquiert d'abord une si grande largeur , qu'une pareille crue

d'eaux, répandues sur sa surface, ne peut y être sensible.

Une explication toute semblable, ou son inverse, aura lieu pour le flux & le reflux qu'on observe à l'autre extrémité. La rivière d'Arve, qui prend sa source dans les Alpes de Savoye toujours chargées de neige, & qui, comme nous l'avons dit, se jette dans le Rhône à environ un mille au-dessous de Geneve, ne peut manquer de grossir considérablement pendant la fonte des neiges. Ses eaux grossies & d'autant plus élevées, que son lit est plus étroit, arrêteront donc celles du Rhône ou les feront grossir; & celles-ci, en quoi consiste une grande partie de celles du lac dans ce canal étroit qui le contient au-dessus de Geneve, produiront à leur tour l'élévation des eaux du lac jusqu'à environ deux ou trois milles au-delà, & tout au plus jusqu'à Genton & Bellerive, où l'expérience nous apprend, que se terminent les seiches qui se font sentir à cette extrémité. Leur reflux ou leur abaissement se fera de même par l'action de leur poids, lorsqu'elles seront parvenues à une cer-

aine hauteur , qui est ordinairement d'un pied plus ou moins ; & cette action & la réaction alternative des eaux du Lac , qui s'achevent dans l'intervalle de 15 à 20 minutes au plus , produiront le flux & le reflux qu'il s'agissoit d'expliquer. En un mot l'Arve grossie , fait ici sur le Rhône & par le moyen du Rhône sur les eaux contiguës du lac , ce que les eaux de ce fleuve & celles du lac faisoient réciproquement les unes sur les autres à l'autre extrémité de ce lac.

Il est clair que tous ces effets seront d'autant plus considérables , que la cause qui les produit , selon M. Jallabert , sera plus marquée & plus subite ; & c'est ce que l'expérience justifie encore en sa faveur. Lorsque la fonte des neiges & la chute des pluies ont été extraordinaires , & que la crue de l'Arve atteint ou surpasse la hauteur des eaux supérieures du lac , ces eaux & celles du Rhône ne pouvant s'écouler toutes au-dessous de Geneve , sont contraintes de refluer vers la Ville & vers le lac ; & alors celles du Rhône remontant le long de la rive droite supérieure & septentrionale , & celles de

l'Arve le long de la rive gauche & méridionale, les unes & les autres demeurent distinctes par la couleur qui leur est propre, ou qu'elles ont accidentellement. C'est ce qui fut observé le 3 Décembre 1750. le 21 Novembre 1751. le 10 Février 1711. le 15 Septembre 1733. & le 21 Décembre 1740. où l'on vit avec surprise les eaux du Rhône entraîner vers le lac tous les bateaux & tous les autres corps qui furnageoient, & faire tourner les roues de moulin en sens contraire.

On pourroit alléguer contre l'hypothèse de M. Jallabert, que l'on a quelquefois apperçu des seiches auprès de Genève, en un tems où les eaux de l'Arve étoient basses, mais outre que ces cas sont très-rares, & que les seiches sont alors peu sensibles, elles n'arrivent jamais que dans des tems où les eaux du Rhône sont aussi fort basses; & ce qui appuye les conjectures de M. Jallabert, c'est que les seiches sont toujours précédées d'un vent chaud.

Histoire de l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1742. p. 26.

ARTICLE XVI.

Dissertation sur les changemens de iems , & sur la maniere d'en chercher la véritable cause , avec des Observations sur les changemens du Barometre & sur les Météores.

LE Peuple s' imagine , que l'éloignement ou la proximité du Soleil est la cause de la variété des Saisons ; qu'il fait plus chaud quand le soleil s'approche , & plus froid quand il s'éloigne. Les Astronomes ont reconnu l'erreur du Peuple. Le Soleil en Hiver est plus proche de la terre qu'en Eté ; & la différence du froid & du chaud vient , selon eux , de la différente maniere dont la terre réfléchit les rayons du Soleil. Quand il est sous l'équateur , ses rayons poussés par des lignes obliques , réfléchis sous leur angle d'incidence , s'écartent & se dispersent ; mais quand le Soleil

• approche de la ligne équinoxiale ou qu'il l'a passée, les rayons poussés selon des lignes presque perpendiculaires, se réfléchissent sous un moindre angle, se réunissent, tombent en grande quantité sur la terre, & échauffent l'air. Les Astronomes ajoutent, que la longueur ou la brièveté du tems que le Soleil demeure dans cette situation à notre égard, augmente ordinairement la chaleur. M. Veidler ne conteste point aux Astronomes cette maniere d'expliquer les Saisons : les principes en sont vrais ; mais elle ne lui paroît ni suffisante, ni assez exacte. Car puisqu'il est certain que le mouvement du Soleil décline toujours également de l'équateur, il est indubitable que les rayons qu'il pousse vers la terre lorsqu'il est dans le signe du Taureau, ne sont pas moins obliques que lorsqu'il est dans le signe de la Vierge ; & que si l'on s'en tient précisément à l'explication commune des Saisons, la température de l'air devoit être la même en Eté & au Printems. Notre Auteur croit qu'on doit avoir égard aux vapeurs & aux vents pour résoudre cette difficulté.,

& que les Saisons & la différente constitution de l'air ne dépendent pas uniquement du Soleil. Il suppose que la terre renferme beaucoup de feu; que les rayons du Soleil qui la pénètrent, réveillent les feux souterrains, leur communiquent un nouveau mouvement; & les délivrent de leur prison; que ces feux réunis emportent, en sortant de la terre, des particules d'eau & de terre dont se forment les vapeurs; que les rayons du Soleil obliques & divergens ne tombent plus sur la terre qu'en petit nombre, & glissent sur elle sans la pénétrer, ce qui arrive quand le Soleil est sous l'équateur. Les vapeurs retombent; de là les pluies, les neiges, la glace: la terre, que le froid resserre, ne donne plus passage aux feux souterrains; & de jour en jour le froid augmente jusqu'à ce que quelque vent chaud dissipe les vapeurs, fonde la glace, ouvre les passages aux flammes captives, & amène le dégel. Cependant le Soleil s'élève au-dessus de l'équateur; & ses rayons plus directs & plus abondans causent un dégel universel. Ajoutons que les vents de Nord sont toujours

froids, & que les vents de Midi le deviennent, quand ils passent par de hautes montagnes couvertes de neiges.

Ces montagnes couvertes de neiges dans le plus fort de l'Eté, & sous le climat le plus ardent, sont un phénomène assez difficile à expliquer. Voici les raisons qu'en apporte un célèbre Mathématicien d'Iené. Ces raisons sont, que les rayons du Soleil réfléchis sur la terre s'écartent d'autant plus, qu'ils s'avancent plus loin après la réflexion; d'où il suit, que peu de ces rayons arrivent jusqu'à la partie de l'atmosphère où le sommet des hautes montagnes s'élève: la subtilité de cette partie de l'air y contribue, & donne un passage facile aux rayons, sans en retenir, autant que l'air inférieur qui est plus épais. D'ailleurs la glace polie comme un miroir réfléchit promptement & repousse les rayons, & les maintient par-là dans le même degré de froideur.

Outre ces variations plus constantes de l'air, qu'on appelle Saisons, nous en éprouvons tous les jours de passagères. Les Astrologues les attri-

buent aux influences des Planettes : ainsi en observant quelle est chaque jour leur situation par rapport à la terre , par rapport au soleil , par rapport aux étoiles fixes & entr'elles , on fait la qualité & la quantité des influences qui se mêlent dans l'air ; & on peut ainsi déterminer quelle sera chaque jour la disposition de l'air , & quels vents regneront.

M. de Veidler prétend , que c'est de la Fable qu'on a pris ce qu'on débite sur la nature des Planettes , que Saturne est pesant & froid ; Venus, doux & humide , mais ardent ; Mercure , léger , &c. Mais l'Astrologue répond , que c'est la Fable qui a emprunté de l'Astrologie les caractères des Planettes quand elle en a fait des Dieux.

Notre Auteur demande des preuves de cette action qu'on attribue aux Planettes & aux Etoiles fixes sur notre air. On ne peut pas , dit-il , la fonder sur l'exemple du Soleil : son action vient de son feu ; les autres Planettes sont des corps lourds , grossiers , sans feu & sans lumière.

L'Astrologue répliquera , qu'il est

certain que la Lune agit sur notre air : qu'elle agisse sur lui par la pression seule, par les exhalaisons qu'un feu caché dans son centre pousse tantôt plus tantôt moins, qu'elle agisse par la manière dont elle éfléchit les rayons du Soleil , les autres Planettes peuvent agir comme elle à proportion. Pour les Etoiles fixes, ce sont autant de Soleils. Mais leur prodigieux éloignement, reprend M. Veidler , n'ôte-t-il pas toute la force à leur influence ? Non , il la diminue cette force ; mais il ne la détruit pas entièrement. On voit ces Astres ; leurs influences peuvent donc se faire sentir ? Rien de plus incertain, s'écrie notre Auteur , que les prédictions des Almanachs faites sur ces principes. On a pû , dira l'Astrologue , mal observer les Astres ; il faut faire des expériences plus exactes.

Avouons -le , il y a bien de l'apparence que les changemens de l'air dépendent en quelque façon des Astres.

M. Veidler le nie absolument ; la peur qu'inspirent les Comètes lui semble une terreur panique. On a vu cependant certaines maladies popu-

laire faire de grands ravages après l'apparition d'une Comete. M. Veidler répondra sans doute, qu'on accu-
soit à tort la Comete d'avoir causé
cette maladie, je le veux; mais quoi,
les taches du Soleil n'auroient-elles
aucune part au changement de tems?
Elles nous cachent le Soleil, & nous
privent de beaucoup de ses rayons;
peut-être sont-ce des alterations de
la matiere solaire. M. Veidler ne les
excepte pas de sa regle générale: la
plus grande de ses taches, selon les
Observations du savant Pere Schei-
ner, Jésuite, est tout au plus égale à
Venus; d'où l'Auteur conclut qu'elles
ne font pas plus d'impression sur l'air,
que cette Planete. Les Eclipses mê-
mes, si on l'en croit, ne causent au-
cun changement sensible dans l'atmos-
phere. L'Auteur permet néanmoins
qu'on observe les taches du Soleil,
pour découvrir quel rapport elles peu-
vent avoir à certaine température de
l'air.

Les vents seuls font, selon lui, les
tyrans de l'air; ils font seuls le beau
& le mauvais tems. On s'en convain-
dra, dit-il, si l'on observe que le vent

ne change jamais , sans faire changer le tems.

L'Auteur veut donc que l'on observe avec soin les vents , leur nature , leurs mouvemens , leurs effets , leur durée. Leur cause prochaine est une raréfaction ou une condensation extraordinaire de l'air. Des exhalaisons de la terre , mêlées de nitre , de soufre , composées de parties élastiques , en font la matiere. La diversité des exhalaisons met une grande différence entre les vents , & ne permet pas de connoître exactement ni leur nature , ni leur origine ; il faut vaincre cet obstacle par des observations multipliées. Il est encore plus important de découvrir , si les mouvemens des vents impétueux n'ont pas des règles fixes & constantes. Il faut joindre à ces observations l'étude assidue des moindres changemens de l'air , en examiner sa légèreté & sa pesanteur par le Barometre , sa chaleur ou sa froideur par le Thermometre , son humidité ou sa sécheresse par l'Hygrometre , son agitation par l'Axiometre , sa condensation ou sa raréfaction par le Manometre.

On doit encore s'étudier à bien connoître le Pays qu'on habite , la nature de chaque terroir , les vapeurs qui s'en élèvent , leurs sources ; il faut consulter les Pilotes , les Matelots , les Laboureurs. La seule expérience leur a fait découvrir des signes assez certains des mutations de l'air.

Pour rendre encore ces observations plus utiles , il faut les comparer aux observations de quelques habiles Médecins sur le rapport qu'ont les vents avec les maladies , & sur les changemens que produisent dans nos corps les changemens de l'air.

*Mémoires de Trévoux , Novembre
1718. page. 872.*



ARTICLE

ARTICLE XVII.

*Sur la cause générale du Froid de
l'Hiver, & de la Chaleur
de l'Été.*

S Il le Soleil étoit plus près de la terre en Été qu'en Hiver, & que la différence en fût d'un million de lieues, on ne balanceroit pas à attribuer à cette différence celle des Saisons de chaque année; & telle est l'opinion du peuple. En Hiver le Soleil se présente comme dans un lointain fort reculé; au lieu qu'en Été on le voit presque sur sa tête: il est vrai cependant que ce lointain & ce voisinage ne sont qu'apparens, & que réellement le Soleil est plus près de la terre en Hiver qu'en Été d'un million de lieues.

Forcés par conséquent de laisser le voisinage & l'éloignement réels, les Philosophes ont compris, que le voisinage & l'éloignement apparens du Soleil étoient encore plus efficaces que les réels, pour produire la variété

que nous éprouvons dans les Saisons ; ils ont compris aussi , que la différence de longueur qui se trouve entre les jours d'Hiver & les jours d'Été , influoit beaucoup dans cette variété : ce sont-là les idées générales qu'on a eues jusqu'ici sur cette matière. Entrons dans un plus grand détail.

D'abord la cause générale de l'éloignement apparent , ou de l'obliquité du Soleil en Hiver , peut être rapportée à trois chefs. M. de Mairan , Auteur de ces Observations , fait voir que les rayons sont affoiblis. 1^o. Parce que la lumière agissant comme un fluide , plus la terre se présente obliquement à l'action de ce fluide , moins il y a de filets ou de rayons qui tombent sur elle. 2^o. Parce que le choc de ces filets ou rayons est d'autant plus foible , qu'il est plus oblique. 3^o. Parce que plus l'incidence est oblique , plus les rayons ont de trajet à faire dans l'atmosphère pour arriver jusqu'à la terre. Or ce trajet les affoiblit , à cause des parties d'air & des atomes qu'ils trouvent sur leur route.

L'Auteur remarque cependant , que la seconde cause n'est vraie qu'en gé-

néral, & d'une manière spéculative ; & qu'en effet la terre étant pleine d'inégalités, elle présente ses parties à la force du choc des rayons dans une situation aussi perpendiculaire en Hiver qu'en Été. Il y a une raison secrète, mais aussi naturelle que subtile, qui supplée à celle-là. Il est vrai qu'en Hiver le Soleil éclaire aussi directement qu'en Été les surfaces des hauteurs, des cailloux, du gravier qui sont tournés vers lui ; mais comme sa lumière est toujours fort oblique par rapport au total de la surface d'un Pays, d'une Province, d'un Royaume, en un mot des lieux où c'est l'Hiver, à tout prendre, il éclaire moins de surface ou une moindre surface en Hiver qu'en Été. Une hauteur, un caillou, un grain de sable ou de terre, jettent une grande ombre sur ce qui est derrière eux. *Une allée de jardin sablée avec du gravier, peut nous montrer en petit ce qui arrive à cet égard dans une grande plaine*, dit M. de Mairan ; & la comparaison est fort juste. En Hiver, ou même tous les soirs & les matins, lorsque le Soleil est proche de l'horison, on

voit toute la terre semée de lumière & d'ombre, & à mesure que le Soleil est plus vertical, on voit les ombres diminuer; de sorte qu'on peut dire, qu'en Hiver la terre est couverte de charbons de feu fort dispersés, mais qu'en Été ce n'est qu'un brasier de charbons réunis de près.

M. de Mairan rejette avec raison le système de M. Rohaut, qui a cru que la cause du froid de l'Hiver venoit de ce que beaucoup plus de rayons sont réfléchis par la surface de l'atmosphère, à mesure qu'ils y tombent plus obliquement. Une chose sembleroit fort appuyer ce système, & M. de Mairan ne le dissimule pas: un corps jetté fort obliquement sur l'eau en est réfléchi, & la lumière même ne pénètre plus un corps après un certain angle d'incidence; il semble donc qu'avant que d'arriver à cet angle, le nombre des rayons réfléchis devroit augmenter. Mais M. de Mairan prétend que la réfraction manque tout à coup, & se change en réflexion; & la chose paroît évidente: car il y a un sophisme dans l'objection; & ce n'est point du tout sur le nombre:

des rayons que doit tomber le soin d'amener la réflexion par nuances. Tous les rayons ont ici la même incidence, & l'un ne doit point être réfléchi avant l'autre; c'est comme une poignée de gravier qu'on jetteroit dans l'eau, & dont tous les grains y tomberoient avec la même inclinaison: car tous seroient ou totalement réfléchis & rejetés, ou rompus & admis; mais la réfraction bien analysée n'est qu'une réflexion, & par-là le merveilleux de l'objection s'évanouit.

Le système de M. Rohaut paroît donc faux, à le prendre en rigueur tel qu'il l'énonce; mais peut-être en sauveroit-on une partie, en remarquant que les rayons sont moins condensés ou resserrés par la réfraction, à mesure qu'ils s'éloignent de la perpendiculaire. Ne pourroit-on pas aussi sauver une partie du système de Riccioli, que M. de Mairan réfute fort solidement, tel qu'il est énoncé par cet Astronome? Ce n'est pas précisément en passant ou repassant dans l'air que les rayons s'échauffent: c'est surtout par la réverbération de la cha-

leur qu'ils communiquent à la terre. Plus les rayons donnent perpendiculairement sur la terre, plus grande est l'épaisseur de la surface qu'ils en échauffent : car non-seulement la chaleur de l'Été est plus intense que celle de l'Hiver; mais elle est en quelque façon plus profonde, mieux enracinée, & par-là plus propre à échauffer l'air qui en reçoit la réverbération. L'Auteur entre ici dans un curieux détail des causes de la chaleur, qui proviennent de la longueur des jours.

Une circonstance remarquable dans les découvertes de M. de Mairan, c'est celle d'un principe de chaleur constante propre à la terre. Selon les Observations les plus exactes, la chaleur de l'Été est communément à celle de l'Hiver, comme 8 à 7 : or, selon les calculs & les raisonnemens de l'Auteur, la chaleur que le Soleil communique en Été à la terre, est à celle qu'il lui communique en Hiver, comme 66 à 1; il faut donc que la terre ait un fond de chaleur, lequel soit de 393 degrés par rapport à celle du So-

leil. M. de Mairan en indique plusieurs causes , entre lesquelles le feu souterrain & central paroît le plus vraisemblable.

Mémoires de Trévoux , Décembre 1722. pag. 2114.

Froid produit par le Sel Ammoniac.

VOici la maniere la plus simple & la plus facile de faire des mélanges froids avec le sel ammoniac. Prenez une livre de sel ammoniac en poudre , & environ trois chopines d'eau : mettez-y le sel tout à la fois , si vous voulez produire un froid bien sensible , mais de peu de durée ; ou mettez-le à plusieurs reprises , si vous aimez mieux qu'il soit durable quoiqu'il soit violent. Remuez ce sel dans l'eau avec un bâton ou un os de baleine , pour en faciliter la dissolution : car c'est de la vitesse de la dissolution que dépend l'intensité du froid.

Cette opération produit réellement un degré de froid considérable, qui se fait sentir. 1.^o. En le touchant. 2.^o. En ce que, si l'on fait cette expérience dans un vaisseau de verre ou dans un verre à boire, on peut remarquer que durant la dissolution, il se forme au dehors du vase & jusqu'à la hauteur du mélange quantité de petites gouttes d'eau, comme il arrive quand on met dans des verres ou autres vases un mélange de neige & de sel: car alors les vapeurs aqueuses qui flottent dans l'air près des côtés de ces vases, sont frappées de froid, & se condensent en eau. 3.^o. La meilleure façon & la plus sûre de déterminer alors le degré du froid, est de plonger dans cette liqueur un bon Thermomètre rempli d'esprit de vin coloré, & scellé exactement: car en mettant la boule dans ce mélange, l'esprit descendra beaucoup plus bas qu'il ne feroit en plein air, ou dans de l'eau commune de même température que celle dans laquelle on a fait dissoudre le sel; & si vous retirez ensuite la boule de dedans le mélange pour la plonger

plonger dans de l'eau commune , l'esprit coloré remontera ; ce qui arrivera aussi quand on la met dans de l'eau nouvellement impreignée de salpêtre.

Ce froid se dissipe bien-tôt en Été & dans le tems chaud ; mais si on y met beaucoup de sel & d'eau , le froid en sera plus considérable , & durera plus long-tems : la qualité différente du sel contribue pareillement à la production de cet effet , comme M. Boyle l'a expérimenté. La durée de ce froid peut encore dépendre de la façon de mettre le sel dans l'eau : car si on l'y jette tout à la fois , l'eau acquerra bien-tôt un grand degré de froid ; mais elle en reprendra plus vite sa première température. Si vous versez le sel petit à petit , le froid sera plus durable , quoique moins grand ; par conséquent il sera plus propre à faire rafraîchir les liqueurs. Quand l'esprit de vin coloré descend lentement , ou qu'il est resté en repos , ou qu'il a remonté , mettez deux ou trois cuillerées de sel de plus , il commencera bien-tôt à redescendre , s'il étoit arrêté ou en devoir de remonter , ou descendra avec

beaucoup plus de vitesse qu'auparavant. Si vous voulez faire durer l'expérience plus long-tems, mettez un peu de sel ammoniac pilé grossièrement, afin qu'il soit plus long-tems à fondre, & par conséquent à refroidir l'eau. M. Boyle a trouvé qu'un froid artificiel sensible, produit par une livre de sel ammoniac, dure au moins deux ou trois heures.

Mettez les liqueurs que vous voulez rafraîchir, dans des vases de verre mince, & dont l'entrée soit bouchée, & tenez-les toujours au-dessus du mélange; remuez-y les vases de tems à autre, & ensuite tirez-en les liqueurs pour les boire. On peut se rafraîchir les mains sur le champ, en les appliquant sur le dehors du vaisseau qui contient le mélange. On peut donner beaucoup de fraîcheur à ces morceaux ou boules de cristal dont on se sert pour rafraîchir la bouche & les mains des malades. Quand il s'agit de refroidir l'air & les liqueurs pour ajuster les Thermometres, ou pour rafraîchir une petite quantité de vin, de bière, &c. il ne faut pas tout à fait une livre de sel ammoniac: car on peut ob-

Servir par le Thermometre , que quelques onces bien pulvérisées & dissoutes promptement dans quatre fois autant d'eau , fussent.

Pour confirmer tout ce qui vient d'être dit , M. Boyle rapporte quelques expériences , après avoir fait la description de son Thermometre , dont le tube cylindrique étoit long de 16 pouces , la boule grosse comme une noix , & le diametre du tube d'environ $\frac{1}{8}$ ou $\frac{1}{9}$ de pouce.

Au mois de Mars ayant trempé dans l'eau son Thermometre dont la liqueur étoit à la hauteur de 8 pouces $\frac{5}{8}$, & l'y ayant laissé quelque tems en l'agitant un peu , il descendit un peu au-dessous de 7 pouces $\frac{5}{8}$; ensuite il y jeta du sel ammoniac : en moins d'un quart d'heure la liqueur descendit à 2 pouces $\frac{11}{16}$; mais auparavant les vapeurs avoient commencé à geler au dehors du verre ; & quand la puissance réfrigérente fut à son plus haut point , il trouva qu'en remuant vivement le mélange , l'eau qui tapissoit légèrement le dehors du verre , se glaçoit en un quart de minute. Trois quarts d'heure après qu'il eut versé le

sel, le Thermometre qu'il avoit été
quelquetems auparavant, & qui avoit
remonté jusqu'au terme de la glace,
étant remis dans le mélange, baissa
d'un pouce. Deux heures & demie
après la premiere dissolution du sel,
la liqueur colorée s'arrêta au milieu
entre les degrés de la glace, dont
l'un étoit à 5 pouces $\frac{1}{2}$ (à laquelle hau-
teur il gele au dehors) & l'autre à
4 pouces $\frac{3}{4}$, terme auquel la liqueur
descend dans les gelées les plus fortes
& les plus longues de l'Hiver. Trois
heures après avoir commencé cette
observation, il trouva la liqueur plus
élevée que le terme ordinaire de la
glace; après quoi elle continua à mon-
ter bien lentement encore une heure.
Ce mélange étant fait dans un vaisseau
de verre dont le fond étoit grand &
plat, un peu d'eau qu'on avoit laissé
tomber sur la table, se trouva gelée si
fortement que le vase tenoit à la table,
& que la glace étoit en quelques en-
droits de l'épaisseur d'un demi-écu.

Le même M. Boyle fit le même
Printems une autre Observation pour
faire voir la durée du froid: car la
premiere fois qu'il trempa le Thermo-

mettre bien scellé dans l'eau commune , la liqueur étoit à 8 pouces $\frac{1}{8}$; mais l'y ayant laissé un tems considérable , & ayant remué l'eau une ou deux fois , la liqueur colorée descendit seulement à 7 pouces $\frac{1}{8}$, ou tout au plus à 6 $\frac{6}{8}$. Pour lors il mit dans l'eau le mélange frigorifique ; la liqueur descendit en moins d'un demi-quart d'heure au-dessous de trois pouces trois quart : le Thermometre en ayant été tiré , & remis ensuite une heure après que l'eau avoit été glacée pour la premiere fois , descendit au-dessous de cinq pouces , & conséquemment à $\frac{1}{4}$ de pouce du point de la glace la plus forte.

*Par M. Boyle , I. Vol. de l'Abregé
des Transf. Philos.*



ARTICLE XVIII.

*Observations & Expériences sur
la Rosée.*

IL n'est pas douteux que de la terre il ne s'élève de la rosée, & que cette rosée ne monte successivement, & pour ainsi dire, par degrés. Pour s'en convaincre, il faut couper de grands morceaux de flanelle blanche de la même piece, & les couper de la même grandeur. Si la rosée s'élève, que doit-il arriver après qu'on aura étendu ces morceaux de flanelle sur des chassis, & qu'on les aura suspendus de niveau à différentes hauteurs de terre? Les morceaux qui seront les plus proches de la terre doivent s'humecter plutôt; ceux qui sont plus élevés doivent s'humecter ensuite, & ainsi successivement. Le morceau qui est le plus bas, doit peser davantage que celui qui est au-dessus; & c'est précisément ce qui arriva. M. *Mussenbraek* posa en divers tems, les uns

après les autres, ces morceaux de flanelle; & il se trouva que ceux qui étoient les plus pesans, étoient ceux qui avoient été le plus proche de la terre; & que les morceaux les plus élevés étoient les moins chargés de rosée, & par conséquent pesoient le moins. Ces derniers étoient suspendus à 120 pieds; marque certaine & démonstrative que la rosée s'élève.

Comme toutes les parties de la rosée qui s'élèvent ne sont point également mobiles, & qu'elles ne sont point poussées avec une égale force, la rosée ne peut pas toujours monter à la même hauteur. De-là M. *Musschenbroek* conclut que quand la rosée est parvenue à une certaine élévation, elle flotte lentement dans l'air où elle est emportée par le vent; qu'elle environne tous les corps qu'elle trouve à sa rencontre; que tantôt elle monte, tantôt elle descend; que du lieu d'où elle s'est élevée, elle est portée dans des lieux éloignés. Enfin non-seulement la rosée monte, mais elle monte encore d'un mouvement continu pendant toute la nuit.

Il semble que rien n'est plus simple

que la Théorie de la rosée : c'est une vapeur extrêmement fine & rare , qui s'élève de la terre de la même manière que s'élèvent toutes les vapeurs ; & quand elle vient à se condenser , ses particules se réunissent , & forment des gouttes sensibles : pour lors elle s'attache aux corps qu'elle touche , ou bien elle retombe ; ainsi la chute de la rosée est une suite nécessaire de son élévation. Les vapeurs qui forment les pluies s'élèvent de même , & retombent de même. La matière de la rosée est plus déliée ; elle s'élève par une moindre chaleur , elle s'élève moins haut. La matière de la pluie au contraire est plus grossière , plus abondante ; il faut une plus grande chaleur pour l'élever , & elle monte plus haut. Enfin la rosée & la pluie ne diffèrent que par la nature des vapeurs dont elles sont formées , par le tems dans lequel elles s'élèvent , & par la forme sous laquelle elles retombent.

La rosée en général vient (selon M. Gersten, Auteur de ces Observations) des exhalaisons qui s'élèvent des végétaux , ou de la terre. Quant à celle des végétaux , notre Auteur juge

que ce n'est que la transpiration des feuilles des plantes qui est condensée par l'air. Trois circonstances sont nécessaires pour qu'il y ait dans un endroit une grande quantité de rosée. Il faut d'abord que durant le jour le lieu ait été exposé aux rayons du Soleil pendant un tems considérable : car dans les lieux couverts, & où le Soleil ne donne que fort peu, il n'y a que très-peu ou point de rosée. 2^o. Il faut qu'il y ait une différence considérable entre la chaleur du jour & la fraîcheur de la nuit. 3^o. Enfin il doit y avoir une humidité suffisante dans la terre.

A l'égard de l'espece de rosée qui s'exhale de la sève des plantes, & qui transpire par les feuilles, notre Auteur observe que quand on examine certaines plantes avec attention, on remarque sur la surface, & aux extrémités de leurs feuilles, de petites gouttes de rosée arrangées d'une maniere très-réguliere, & non point jettées au hazard.

Pour déterminer si cet arrangement merveilleux des particules de la rosée est dû à la descente de l'air froid & condensé sur la plante, ou à la sécré-

tion de la sève par les pores de la plante même, M. Gersten a couvert plusieurs plantes avec des vaisseaux de verre ou de terre retournés; & le lendemain il a trouvé une grande quantité de rosée arrangée sous sa forme régulière.

Cette observation est confirmée par les expériences de M. *Musschenbroek*. Ce Physicien a examiné avec soin la rosée qu'on trouve le matin dans les prairies, sur les plantes & sur l'herbe, & il s'est convaincu qu'elle ne tomboit point de l'air; que ce n'étoit point une pluie, ou un brouillard condensé, mais que c'est une humeur sortie des vaisseaux excrétoires des plantes. Il a remarqué que les gouttes de cette rosée diffèrent entr'elles en grandeur, en quantité & en situation. Tantôt elles sont rassemblées proche du pédicule des feuilles; tantôt elles environnent le bord des feuilles: quelquefois elles sont plus réunies vers le centre; d'autres fois elles sont élevées vers le sommet ou la pointe. Tout cet arrangement des gouttelettes de rosée dépend de la position des tuyaux excrétoires des feuilles. Dans les serres

les mieux fermées, on voit les plantes chargées de rosée; sous les cloches on observe qu'elles sont couvertes d'une rosée plus abondante, que si elles avoient été exposées à l'air. Lorsqu'il fait du brouillard, la partie inférieure & la partie supérieure des feuilles se trouvent entièrement couvertes d'humidité; elles sont également mouillées. Quand au contraire il n'y a eu que de la rosée, on trouve une disposition, un arrangement tout différent. La rosée des plantes doit différer suivant les plantes; ce qui semble indiquer l'utilité qu'on en pourroit tirer en Médecine.

Quant à la rosée ordinaire, M. *Gerssen* a fait un grand nombre d'expériences très-variées & très-différentes, qui combattent l'opinion commune de la chute de la rosée; si ces expériences sont vraies, le système vulgaire est entièrement renversé, & il est insoutenable. Nous allons rapporter les principales expériences.

Pendant les mois de Juin & de Juillet, on mit par terre toutes les nuits plusieurs plaques de cuivre très-unies; & dans aucune de ces expériences,

M. Gersten n'a pû appercevoir la moindre trace de la rosée sur la surface supérieure de ces plaques, tandis que la face intérieure en étoit toute couverte. Il a répété les mêmes expériences, & toujours avec le même succès, excepté dans un seul cas, où une plaque de cuivre trop proche d'un pied de lavande, étoit un peu humectée dans la partie de la surface supérieure voisine de la plante; le reste de la plaque étoit fort sec. Il a suspendu aussi horizontalement avec des fils ces plaques de cuivre, & il a trouvé que la rosée s'étoit attachée également à la surface supérieure & à l'intérieure; les plaques étoient suspendues à la hauteur de trois, de quatre & de cinq pieds. A la distance d'un pied & demi, la surface inférieure étoit plus chargée de rosée; mais à un pouce, deux pouces & trois pouces, la surface inférieure en étoit toute couverte, & la supérieure n'en navoit pas une goutte.

Notre Auteur rapporte quelques expériences qu'il a faites, & qui paroissent d'abord contredire sa Théorie. Par exemple, quand il s'est servi

de corps convexes, ronds ou cylindriques, il a trouvé la surface supérieure couverte de rosée ; & cela, soit qu'il ait mis ces corps sur la terre, ou qu'il les eût tenus suspendus à quelque distance de la terre.

Cette observation est générale, & s'étend à tous les corps de cette espèce, qui sont contigus, & qui ne sont point continus, comme les monceaux de foin, de paille & de laine ; & c'est aux observations de cette nature que l'opinion vulgaire de la chute de la rosée doit son origine & le crédit qu'elle a.

Comme on pourroit se servir de ces expériences mêmes pour combattre l'hypothèse de l'élévation de la rosée, notre Auteur oppose expérience à expérience : il coucha par terre une planche de bois de $2 \frac{1}{2}$ pouce d'épais, & il mit dessus un quarré de papier, qui d'un côté débordoit la planche de la valeur d'un pouce.

Pour empêcher le vent d'emporter le papier, il le perça avec un poinçon de fer qui avoit un manche de bois ; & au lieu de poids il posa dessus un couteau, dont le manche étoit aussi

de bois , & de figure cylindrique. Quand il alla pour examiner l'effet de la rosée sur ces matieres , il trouva que le petit coin de papier qui débordoit la planche , étoit humecté de rosée , pendant que le reste du papier & la surface supérieure de la planche étoient secs ; mais les parties supérieures des manches du poinçon & du couteau étoient humides.

Il y a un peu de différence entre cette expérience & une autre qui fut faite avec un tube de verre , qui étoit placé horizontalement sur une plaque de cuivre de 14 pouces en quarré , & qui débordoit la plaque de $\frac{1}{2}$ pouce. Pour empêcher le tube de rouler , on avoit mis à ses côtes deux parallépipèdes , l'un de cuivre , & l'autre de plomb. Toute la surface du tube fut couverte de rosée , & la surface supérieure de la plaque de cuivre demeura sèche.

Notre Auteur ayant fait diverses expériences avec des vaisseaux concaves , dont les ouvertures étoient tournées vers le Ciel , & qui étoient placées à différentes élévations de terre ,

n'a jamais trouvé de rosée dans la cavité de ces vaisseaux , ni sur leurs parois , excepté peut-être à un pouce du bord.

Il faut observer que différens corps exposés à la même rosée , s'en chargent très-différemment , les uns plus , les autres moins, quelques-autres point du tout. Les verres & les cristaux sont, pour ainsi dire , préférés à tous les autres ; mais la rosée ne touche point aux métaux.

Que l'on mette un vase de cristal sur un plat d'argent qui le déborde , le vase sera humecté de rosée , & les bords du plat parfaitement secs. Il s'attache aussi beaucoup de rosée sur toutes sortes d'étoffes de soye , sur toutes sortes d'étoffes de laine , sur les cuirs , sur le parchemin , sur le papier ; à peine en tombe-t-il sur les pierres de taille polies.

M. *Musschenbroek* voulant s'assurer si les couleurs ne faisoient aucun effet sur la rosée , comme couleurs , prit plusieurs petites écuelles de bois semblables & très-égales ; il les enduisit intérieurement de différentes couleurs : la rosée y tomba très-inégale-

ment; & il résulta de ces expériences, que ce sont les matieres qui servent à colorer, & non les couleurs en elles-mêmes, qui font que certains corps reçoivent la rosée plus abondamment que d'autres. Plusieurs expériences répétées plusieurs fois sur des maroquins & des cuirs différens, montrèrent aussi que ni l'épaisseur, ni la dureté, ni la sécheresse, ni la souplesse, ne contribuent à la quantité de rosée.

M. *Dufay*; après avoir vérifié les expériences de M. *Musschenbroek*, a imaginé à cette occasion un rapport entre les phénomènes de la rosée & ceux des corps électriques, & des corps qui donnent du phosphore. Tous les corps qui peuvent être frottés, deviennent électriques parmi les métaux; tous les corps, excepté les métaux, peuvent devenir phosphores; & tous les corps, horsmis les métaux, s'humectent à la rosée.

Tous ces rapports ou cesseront de l'être, ou cesseront d'être merveilleux, si l'on admet une idée bien simple de M. de *Réaumur*. Cet habile Physicien pense qu'un corps admet la rosée, parce

parce qu'il est froid, & qu'il la repousse, parce qu'il est chaud, ou qu'il conserve encore de la chaleur. De tous les corps, ceux qui se refroidissent le plutôt, sont les verres & les cristaux, les porcelaines; & ce sont aussi ceux qui s'échauffent le plus facilement. Les métaux au contraire se refroidissent le plus lentement, parce qu'ils ont beaucoup de peine à s'échauffer; donc lorsque le verre se charge de rosée, le métal pénétré & encore environné de chaleur, doit la repousser. Cette conjecture est fondée sur l'expérience. Mettez une tasse de porcelaine sur une pierre posée sur du fumier: placez à une distance assez considérable au-dessus du fumier une autre tasse; la dernière se chargera de rosée, la première n'en aura pas une goutte. Il s'ensuit de-là, que quand le métal sera parfaitement refroidi, il se chargera de rosée; aussi s'en charge-t-il. Diverses expériences ont montré de la rosée sur de l'argent, sur du cuivre, sur de l'acier, sur de l'étain, &c.

Revenons aux expériences de notre Auteur. Comme la gelée blanche

n'est autre chose que la rosée ordinaire congelée. M. Gersten a répété pendant le tems des gelées blanches, plusieurs expériences qu'il avoit faites sur la rosée avec des plaques de cuivre posées sur terre; & il a trouvé que la surface supérieure des plaques n'étoit point couverte de gelée blanche, & que ce n'étoit que l'inférieure, conformément à son hypothese générale.

M. Gersten finit sa Dissertation par une recherche curieuse sur la nature & l'origine de la rosée mielleuse, *Lac mellis*. Selon lui, cette rosée n'est autre chose que les excréments de quelques insectes qui s'attachent à la surface inférieure des feuilles des plantes, qui se nourrissent de leur suc, & qui rendent ces petites gouttelettes; & pour démonstration de son sentiment, il en appelle au témoignage des sens.

Ceux qui voudront faire la même observation, dit M. Gersten, n'auront qu'à mettre une feuille de papier au-dessous des feuilles qui sont chargées de ces petits animaux; & en très-peu de tems ils trouveront une grande quantité de liqueur, ou de matière

molle, qui sera tombée sur le papier, la même précisément que l'on nomme *Rosée mielleuse*.

Par la rosée mielleuse, on entend ordinairement une matiere végétale, dont ont parlé quelques Anciens & plusieurs Modernes. C'est une matiere gommeuse, oléagineuse ou résineuse, qui transpire à travers les feuilles, & qui se condense sur leur surface; c'est une matiere que l'on ramasse, tantôt sous la forme de miel, tantôt sous la forme de manne. Plusieurs Naturalistes ont décrit cette rosée avec soin, & on la voit très-sensiblement sur la partie inférieure des feuilles lorsqu'il a fait bien chaud. *Stanhufus* rapporte, qu'il a observé à Weimar dans la Thuringe certains grains de la forme & de la grosseur à peu près de la graine de coriandre, mais qui se terminent en pointe de chaque côté. Les gens du Pays les ramassent, & en font une bouillie qui a un goût extrêmement doux. Il n'est par conséquent pas possible de douter de l'existence d'une matiere oléagineuse & épaisse sur la surface des plantes. Cette matiere seroit-elle différente de celle dont parle

M. Gersten ? Quoique cet habile Physicien dise dans son ouvrage, qu'il entend par la rosée de miel, ou rosée mielleuse, une matiere fluide, gommeuse, transparente, d'une saveur douce, & déposée sur les feuilles des plantes par certains insectes, ne seroit-il pas probable que ces insectes viendroient la ramasser sur les feuilles ? N'auroit-on pas pris pour les excréments des insectes tombés sur le papier, les gouttelettes mêmes de la liqueur dont se nourriroient les insectes ?

Par M. Mussenbroek, Histoire de l'Académie des Sciences pour l'année 1736. page 1.



ARTICLE XIX.

*Dissertation sur la formation , la
nature & les effets de la
Glace.*

L'Eau ne se glace que parce que ses parties perdent le mouvement qui leur est naturel , & qu'elles s'attachent les unes aux autres ; mais il faut remarquer , 1^o. Que l'eau se glaçant paroît se dilater , & qu'elle devient plus légère ; au lieu qu'il semble qu'elle devroit se resserrer , & devenir plus pesante. 2^o. Que l'eau glacée est un peu moins transparente , & que les corps transpirent moins librement à travers qu'auparavant, quoique tout le contraire doive arriver , ce semble, s'il est vrai que l'eau se dilate en se glaçant. Ce sont ces contrariétés apparentes qui se trouvent dans les effets & les propriétés de la glace , qui en rendent la nature obscure , & difficile à expliquer.

Les Philosophes croient commun-

nément que ce qui fait la glace, ce sont certains esprits de nitre, qui en hiver se mêlent parmi les parties d'eau, & qui étant d'eux-mêmes peu propres au mouvement, à cause de leur figure & de leur inflexibilité, affoiblissent & détruisent peu à peu celui des parties auxquelles ils sont attachés. Cette opinion est appuyée sur quelques expériences, qui prouvent du moins qu'en certaines occasions les esprits de sel & de nitre contribuent à former la glace. On n'a garde de contester ici ces expériences: on dit seulement qu'il n'est pas sûr que les esprits de nitre entrent toujours dans la composition de la glace; & quand ils y entrentoient toujours, cela seul ne suffiroit pas pour pouvoir en expliquer tous les effets. Par exemple, on ne conçoit pas comment ces esprits de nitre, qui pénètrent les pores de l'eau, & qui en fixent les parties, peuvent obliger l'eau à se dilater, & la rendre plus légère; au lieu que naturellement ils devroient en augmenter le poids. Cette difficulté, & quelques autres que l'on pourroit rapporter ici, font voir la nécessité d'un

nouveau système pour expliquer la nature de l'eau.

En voici un dans lequel il semble que tout s'explique plus aisément, & d'une manière plus simple que dans le système ordinaire.

On dit donc que l'eau ne se glace en hiver, que parce que ses parties étant plus serrées les unes contre les autres, s'embarassent mutuellement, & perdent tout le mouvement qu'elles avoient; & l'on prétend que l'air est la seule, ou du moins la principale cause pourquoi les parties de l'eau se serrent ainsi les unes auprès des autres. Voici comme cela s'explique.

Il y a une infinité de petites parties d'air grossier mêlées parmi les parties de l'eau, comme chacun peut s'en convaincre par ses propres yeux: car si on enferme dans la machine pneumatique un vase plein d'eau & ouvert; à mesure qu'on pompera l'air de la machine, on verra l'eau bouillir, & jeter une grande quantité d'air grossier.

Ces parties d'air grossier semées parmi celles de l'eau, ont chacune la vertu de ressort; ce qui est mainte-

nant si bien établi dans la Physique, que personne n'oseroit plus le révoquer en doute.

Si donc on pourroit faire voir, que les petits ressorts de l'air grossier semé dans l'eau ont plus de force en hiver, & qu'alors ils se débandent un peu, on concevrait aisément que d'un côté ces ressorts se débandant de la sorte, & de l'autre l'air extérieur continuant à presser la surface de l'eau, les parties de l'eau enfermées entre ces petits ressorts qui les repoussent de toutes parts, devroient se serrer les unes contre les autres, perdre leur liquidité, & former un corps dur, c'est-à-dire, de la glace. Toute la difficulté est de savoir, si en effet les ressorts de l'air qui est semé dans l'eau se débandent un peu en hiver; & c'est ce qui est aisé à prouver.

L'air grossier que les yeux n'aperçoivent point dans l'eau tandis qu'elle est liquide, s'y remarque aisément quand elle est glacée. On y voit souvent alors une grande quantité de bulles d'air très-sensibles & quand ces bulles sont trop petites pour être remarquées chacune séparément, on ne
laisse

laisse pas de les voir , pour ainsi dire , en gros & confusément : car l'eau glacée est toujours un peu plus blanche , qu'elle n'étoit auparavant. Or pour peu qu'on ait étudié la nature des couleurs , on sçait que cette blancheur ne vient que des petites bulles d'air mêlées parmi la glace ; c'est ainsi que toutes les écumes sont un peu blanches , & que les bulles d'air mêlées dans le verre ou le cristal , paroissent plus blanches que le reste.

Ajoutez à cela, que les petites bulles d'air grossier qui sont absolument insensibles dans l'eau tandis qu'elle est liquide , ne peuvent devenir sensibles dans l'eau glacée , que parce qu'elles sont chacune plus grosses qu'elles n'étoient ; & elles ne sçauroient devenir plus grosses que par l'une de ces raisons , ou parce que l'eau en se glaçant a attiré du nouvel air , ou parce que l'air déjà ferré dans l'eau occupe un plus grand espace , & que ses ressorts se sont un peu débandés. On ne conçoit pas comment l'eau en se glaçant auroit pû attirer du nouvel air , puisque les pores de la glace sont constam-

ment plus petits que ceux de l'eau , au travers desquels l'air grossier ne passe qu'avec peine. Il faut donc que l'air déjà serré parmi les parties de l'eau se soit dilaté , & que les ressorts se soient un peu débandés.

Mais pourquoi quand il fait froid , les ressorts de l'air ont-ils plus de force pour se débander que dans une autre saison ? On répond premièrement , que pour établir le système qu'on propose ici , c'est assez de prouver que la chose arrive en effet de la sorte , sans qu'il soit nécessaire d'en expliquer la cause. On répond en second lieu , que cette cause n'est pas difficile à trouver. Tout le monde sçait que les corps à ressort ont d'autant plus de force , qu'ils sont plus roides , & que leurs pores sont plus petits ou plus serrés. Or le propre du froid est de restreindre les pores. Pendant le chaud , les pores sont plus ouverts , parce que la matière subtile qui passe toujours au travers , étant alors dans un mouvement plus violent , a plus de force pour les étendre , & pour les tenir ouverts ; au lieu qu'en hiver son mouve-

ment étant beaucoup ralenti, tous les corps se resserrent, & leurs pores se rétrécissent: de-là vient qu'en hiver les corps des animaux transpirent beaucoup moins que dans une autre saison. Puis donc que le froid resserre les petites parties de l'air grossier, & qu'il les rend moins souples & plus roides, parce qu'il en rétrécit les pores, il faut dire aussi qu'il augmente la force de leur ressort; le ressort devenant plus violent à mesure que le corps devient plus roide.

Ainsi pendant l'hiver les ressorts de l'air qui est serré dans l'eau, ayant notablement plus de force, ils doivent un peu se débander; & en se débendant, presser les unes contre les autres les petites parties d'eau qu'ils tiennent renfermées. Cela supposé, il n'y a rien dans la glace qu'on ne puisse expliquer naturellement.

1. L'eau en se glaçant doit faire un corps dur, parce qu'alors ses parties étant pressées les unes contre les autres, elles s'embarrassent mutuellement, & perdent ainsi tout le mouvement qu'elles avoient.

2. L'eau en se glaçant doit devenir plus légère : car quoique ses parties soient plus pressées qu'elles n'étoient auparavant , cependant la masse composée des parties de l'eau ainsi pressées & de l'air dilaté , doit être plus ample , & par conséquent plus légère qu'elle n'étoit lorsque l'eau étoit liquide.

3. L'eau glacée occupe un plus grand espace que quand elle étoit liquide , parce que les ressorts de l'air qui est serré dans l'eau , en se débarrassant , obligent l'eau de s'élever dans le vase qui la contient. Il est vrai que l'air extérieur presse aussi de son côté la surface de l'eau , & qu'il fait effort pour la repousser. Mais cet air extérieur étant plus libre , & ses petits ressorts étant moins bandés , parce qu'ils se sont relâchés à mesure que le froid a resserré tous les corps voisins , il a moins de force que celui qui est enfermé dans l'eau , dont les ressorts ne sçauroient se débarrasser qu'en faisant grossir le volume de l'eau.

4. Si l'on enferme un vase plein d'eau dans la machine pneumatique ,

L'air qui est serré dans l'eau se dilate extraordinairement, quand on pompe l'air de la machine ; cependant l'eau ne se glace pas, parce que la surface extérieure de l'eau n'étant plus pressée, l'air qu'elle contient peut en se débordant s'échapper librement, comme il s'échappe en effet.

5. L'eau glacée doit être toujours moins transparente que la même eau quand elle est liquide, parce que les bulles d'air qui sont insensibles dans l'eau à cause de leur petitesse, étant plus sensibles & plus grosses dans la glace, la doivent aussi faire paroître plus blanche, & par conséquent moins diaphane.

6. Les corps doivent bien moins transpirer au travers de la glace qu'au travers de l'eau, parce que les parties de l'eau glacée sont en effet plus pressées qu'elles n'étoient auparavant, & qu'ainsi elles laissent un passage moins libre aux corps étrangers.

7. L'eau dont on a tiré beaucoup d'air par le moyen de la machine pneumatique, doit aussi se glacer plus difficilement.

8. L'esprit de vin, l'eau de vie, & les autres liqueurs du même genre, doivent ne se point glacer du tout, ou ne se glacer qu'avec peine. Car leurs parties étant dans un grand mouvement, comme il paroît par l'évaporation qui s'en fait, il s'ensuit que l'air serré entre les parties de ces liqueurs est beaucoup plus subtil, & par conséquent qu'il a moins de ressort que celui qui est serré entre les parties de l'eau commune, puisque le ressort de l'air est principalement dans ses parties grossières.

9. L'huile, la graisse, & les autres liqueurs visqueuses doivent se figer plus aisément que l'eau ne se glace, parce que leurs parties peu propres au mouvement, s'embarrassent bientôt les unes dans les autres. Mais ces liqueurs en se figeant ne doivent point devenir aussi dures que la glace, ni se dilater comme elle : car quoi qu'elles renferment entre leurs parties branchues une plus grande quantité d'air que l'eau, cependant cet air est plus subtil, il a moins de ressort, & s'échappe facilement par les pores de ces mêmes liqueurs.

10. Le vif-argent ne petit pas se glacer, parce qu'il ne contient pas une assez grande quantité d'air grossier; que ses parties sont fort polies; & qu'elles peuvent aisément glisser les unes contre les autres, sans s'embarasser & s'accrocher.

11. A mesure que le froid devient plus âpre, les ressorts de l'air serré dans la glace doivent avoir plus de force pour repousser les parties de l'eau glacée, & le volume composé de l'air & de l'eau glacée doit de plus en plus grossir; c'est aussi ce qu'on a éprouvé de la maniere suivante. On avoit rempli d'eau un boulet de fer creux, qui avoit une ouverture de bois de trois ou quatre lignes de diametre; l'eau s'étant glacée dans ce boulet, & n'ayant pas eu la force de le rompre, la glace sortit par le trou, & forma une espece de tige, qui s'allongeoit à mesure que le froid augmentoit, & qui crut jusqu'à la longueur d'un doigt. Cette tige ayant été rompue, & le boulet exposé à l'air pendant une nuit très-froide, il se fit une nouvelle tige, quoique plus courte que la premiere, la glace se

filant , pour ainsi dire , en passant par le trou du boulet , comme font l'or & les autres métaux en passant à travers la filiere:

12. Dans le systême qu'on vient d'exposer , les esprits de nitre peuvent aussi contribuer à former la glace , en ce que s'attachant aux petites parties de l'air serré dans l'eau , ils contribuent à les rendre plus roides & plus inflexibles , & à augmenter la force de ses ressorts.

*Mémoires de Trévoux , Février 1701.
page 162.*



ARTICLE XX.

*Observations expérimentales sur
la formation de la Glace.*

PREMIERE EXPERIENCE.

DE l'eau commune ayant été mise dans un vase de cuivre , & ayant été exposée à l'air pendant une forte gelée , quelque tems après il commença à s'y former de longs filets de glace , dont les uns pénétoient l'eau de haut en bas , les autres étoient couchés de travers ; quelques-uns étoient attachés au fond & aux côtés du vaisseau , & d'autres se croisoient en divers endroits. Ensuite ces filets s'élargirent en larmes très-déliées, qui avoient toutes environ trois lignes de largeur , étant séparées les unes des autres par des intervalles égaux , dont la largeur étoit aussi d'environ trois lignes.

II. EXPÉRIENCE.

Le même vaisseau ayant été rempli de nouvelle eau froide, & exposé à la gelée, il s'y forma d'abord des filets & des lames de glace comme auparavant ; & ensuite les lames de glace qui étoient au fond s'élargirent peu à peu, & composèrent une glace continue qui couvrit tout le fond du vaisseau. Les lames de glace qui étoient au-dessus de l'eau se joignirent aussi ensemble ; mais il y avoit vers le milieu de la surface de l'eau un petit endroit qui ne geloit point, & la glace avoit déjà plus d'un pouce d'épaisseur, que ce petit endroit n'étoit pas encore pris. L'eau sortoit peu à peu par ce trou, & se glaçoit à l'entour à mesure qu'elle se répandoit ; de sorte que le trou se rétrécissoit toujours, & il se fit tout autour une éminence de glace d'environ un pouce de hauteur, qui formoit un petit canal : enfin le trou s'étant entièrement bouché, la glace, à quelque tems de-là, se fondit avec bruit, avant que toute l'eau qui étoit au milieu fût glacée.

III. EXPÉRIENCE.

Pour connoître ce qui faisoit sortir l'eau par ce petit canal , & ce qui avoit fait rompre la glace, l'Observateur prit un grand verre de figure conique ; & l'ayant rempli d'eau jusqu'à trois ou quatre lignes près du bord , il considéra soigneusement le progrès de la congelation. Après qu'il se fut formé de petits filets , & puis de petites lames de glace , dont quelques-unes étoient découpées comme des feuilles de persil , & d'autres dentelées comme une scie, plusieurs petites bulles d'air commencerent à paroître au fond & aux côtés du verre , & grossirent peu à peu. Quelques-unes de ces bulles demeuroient engagées dans la glace , d'autres se détachotent & montoient jusqu'en haut. Plus l'eau se geloit , plus il se formoit de bulles : cependant l'eau sortoit toujours par le petit canal ; & comme elle se geloit aussi-tôt qu'elle s'étoit répandue , la glace devint enfin si haute à l'entour du petit canal , que d'un côté elle surpassoit les bords du verre , de maniere que l'eau couloit

par-dessus. Alors il fit une petite ouverture avec une épingle à l'autre côté où la glace étoit moins épaisse , & aussi-tôt l'eau prit son chemin par-là. Cette ouverture ayant été renouvelée de tems en tems , le premier trou par où l'eau ne sortoit plus, se ferma entièrement : ensuite la glace boucha aussi la seconde ouverture , que l'on avoit cessé de renouveler ; & cependant il y avoit toujours des bulles qui se formoient dans l'eau qui n'étoit pas encore gelée , & s'élevoient jusqu'au haut de cette eau. Quelque tems après que le second trou fut bouché , la glace craqua , & l'on trouva qu'elle s'étoit fendue par le haut en deux endroits ; que vers les deux tiers de la hauteur du verre , la glace de dessus s'étoit entièrement séparée de celle de dessous par un espace d'environ deux lignes , & que dans le milieu de la glace il y avoit un peu d'eau qui n'étoit pas encore gelée. On remarqua aussi que dans toute cette glace il y avoit une infinité de petites bulles qui se terminoient en pointes , & qui s'allongeoient presque toutes vers le milieu du verre ; & qu'à l'endroit où

l'eau avoit gelé la dernière , la glace étoit blanchâtre & peu transparente , presque comme de la neige presée. Selon M. Mariote , l'Auteur de ces expériences , voici la raison de ces divers phénomènes.

L'eau enfermée dans la glace s'élevoit & se répandoit par en haut, parce que les bulles qui se formoient venant à s'étendre , la pressoient & la pousoient dehors : le petit canal avoit demeuré long-tems sans se glacer , parce que l'eau qui y passoit continuellement l'entretenoit ouvert. Lorsque la glace avoit enfin bouché ce passage, les bulles dont le nombre augmentoit toujours , avoient enfin été trop pressées , & par l'effort qu'elles faisoient pour s'étendre, avoient rompu la glace; c'étoit aussi ce même effort qui avoit fait séparer la glace de dessus d'avec celle de dessous. La blancheur & l'opacité de la glace qui s'étoit formée la dernière , venoit de ce qu'il s'y étoit mêlé quantité de ces bulles.

Si l'on demande d'où ces bulles viennent , on répond qu'elles se forment d'une matière aérienne , dont l'eau est toute remplie ; comme l'on

voit par l'expérience du vuide : car si l'on met un verre plein d'eau dans le récipient, on voit sortir de l'eau quantité de semblables bulles lorsque l'on pompe l'air, & la même chose arrive quand on fait bouillir de l'eau sur le feu. On dira peut-être que dans l'eau bouillante ces bulles viennent du feu; mais notre Auteur a vû plusieurs de ces bulles demeurer plus de six semaines au fond d'un plat rempli d'eau, sans diminuer notablement de volume, quoique le plat ne fût plus sur le feu, & même qu'il fût exposé à un air assez froid; d'où il paroît que l'on doit conclure que ces bulles ne sont pas des particules de feu. On pourroit aussi douter si elles ne viennent point de la matiere du vaisseau, ou de l'air qui est contenu dans ses pores. Ce doute qui semble assez bien fondé, a donné occasion à M. Mariote de faire une expérience assez curieuse : il versa de l'huile dans un petit vaisseau, & avec la tête d'une épingle il mit doucement une goutte d'eau au-dessus de cette huile. Ayant ensuite mis le vaisseau sur le feu, il ne vit point de bulles sortir de l'huile; mais il en vit beau-

coup sortir de la goutte d'eau. Lorsqu'elle fut plus échauffée, la goutte d'eau tomba au fond, & les bulles continuerent à en sortir; mais ce qu'il y a de surprenant, un peu après il se fit une espèce de fulmination, & au même instant le dessus de l'huile fut tout couvert de bulles, dont quelques-unes étoient plus grosses que toute la goutte d'eau. Cette expérience lui fit juger que la matière dont les bulles se forment est contenue dans l'eau, & qu'elle se change en air lorsque l'eau gele, ou qu'on la fait bouillir, ou que l'on pompe l'air d'alentour en faisant l'expérience du vuide.

Il reste à sçavoir comment les bulles se forment, pourquoi elles s'enflent, & comment se font les filets qui paroissent au commencement de la congélation. Tout cela peut encore s'expliquer aisément suivant les mêmes principes. Il y a beaucoup d'apparence, que la fluidité des liqueurs aqueuses vient de ce que leurs parties sont continuellement agitées par le mouvement de cette matière aérienne, & que ce mouvement est entretenu par

la chaleur : d'où il s'ensuit que lorsqu'il fait un très-grand froid , ce mouvement devient si foible , qu'il ne peut plus agiter les parties de l'eau , de manière qu'elles s'attachent au vaisseau , & puis elles se joignent les unes aux autres ; & de-là viennent ces filets & ces lames de glace , que l'on voit paroître lorsque l'eau commence à geler. Alors la matiere aërienne se dégage de l'eau qui gèle ; & comme les esprits du vin nouveau étant séparés de la matiere grossiere du vin , se mettent en mouvement , font sortir le vin par le bondon , & rompent le tonneau si on ne leur donne passage : ainsi cette matiere aërienne, en se dilatant, fait sortir l'eau par le petit trou qui demeure ouvert ; & lorsque ce trou est bouché , elle rompt la glace qui la tient trop pressée. Pour faire voir qu'il n'y a point d'autre cause de cette rupture , notre célèbre Auteur fit l'expérience suivante.

IV. EXPÉRIENCE.

Il mit de nouvelle eau froide dans
le

le vaisseau dont il s'étoit servi aux deux premières expériences ; & lorsque l'eau fut toute gelée par dessus , enforte qu'il ne restoit plus d'ouverture , il perça la glace avec une grosse épingle : aussitôt il sortit un jet d'eau de la hauteur de plus de deux pouces , qui enleva l'épingle qui étoit demeurée dans le trou. Il continua de percer la glace de tems en tems jusqu'à ce que l'eau fût toute gelée ; & après cela il la laissa exposée à un air très-froid deux jours & deux nuits de suite ; mais la glace ne creva point , quoique d'autre glace qu'on n'avoit point percée crevât tout auprès.

V. EXPERIENCE.

Il voulut voir s'il falloit beaucoup de ces bulles pour rompre la glace ; & ayant pour cela fait geler d'autre eau dans le même vaisseau , il perça la glace de tems en tems. Quand l'eau fut presque toute gelée , il tira la glace entière hors du vaisseau , l'ayant un peu fait chauffer , & il la laissa exposée à l'air sans la percer davan-

rage. Un quart-d'heure après il l'entendit rompre , & il la trouva séparée en deux parties presque égales , en chacune desquelles il y avoit une cavité d'environ un pouce de diametre , qui étoit l'espace qu'occupoient les bulles , & le reste de l'eau qui étoit demeuré liquide. La glace étoit tout autour épaisse de plus de trois doigts , & néanmoins les bulles qui s'étoient formées du peu d'eau qui restoit , n'avoient pas laissé de la rompre.

VI. EXPÉRIENCE.

Plusieurs personnes ont tâché de faire des miroirs ardens avec de la glace ; mais il est difficile d'y réussir , parce que d'ordinaire la glace n'est pas parfaitement transparente. Notre Auteur ayant jugé par les expériences précédentes , que si l'on faisoit sortir la matiere aérienne qui est dans l'eau avant que de l'exposer à la gelée , on pourroit avoir de la glace très-pure , il voulut en faire l'essai. Il fit donc bouillir de l'eau nette sur le feu environ une demi-heure pour faire évap-

porter la matière aérienne, & il l'exposa ensuite à un air très-froid. Tout proche de cette eau chaude, il en mit autant de froide dans un autre vaisseau, afin de les comparer ensemble. L'eau froide commença à geler avant que la chaude fût seulement refroidie, & il s'y forma quantité de bulles. L'eau chaude gela aussi à la fin; mais la glace avoit deux pouces d'épaisseur de tous côtés, qu'il ne s'y étoit encore formé aucune bulle; de sorte qu'elle étoit parfaitement transparente. Il mit un petit morceau de cette glace dans un petit vaisseau concave sphérique; & ayant approché ce vaisseau du feu, il fit fondre peu à peu la glace d'un côté, jusqu'à ce qu'elle eût prit une figure convexe sphérique; il en fit autant de l'autre côté, retournant souvent la glace, & versant l'eau de tems en tems à mesure que la glace se fondoit. Lorsque la glace eut une figure convexe assez uniforme, il la prit par les deux bords avec un gant, afin que la chaleur de sa main ne la fît pas sitôt fondre, & il l'exposa au Soleil. Cette

expérience eut le succès qu'il en attendoit : car en fort peu de tems , par le moyen de cette glace , il mit le feu à de la poudre fine , qu'il avoit placée au foyer ou point brûlant , où les rayons se réunissent. Il est vrai que quelque soien que l'on prenne , il est impossible de faire évaporer de l'eau toute la matière aérienne , & d'empêcher qu'il ne se forme quelques bulles dans le milieu de la glace ; mais on en a toujours une épaisseur considérable , qui est parfaitement transparente :

Par M. Mariote , Journal des Sçavans , Février 1672. page 55.



ARTICLE XXI.

Explication physique des divers Phénomènes de la glace.

LA glace ne se formant pas moins dans la machine du vuide que dans l'air, il faut que le corps étranger qui agit sur les liqueurs pour les geler, soit quelque fluide beaucoup plus subtil que l'air; & il est plus que probable que ce n'est autre chose que la matière subtile elle-même, qui est comme la source de tous les mouvemens, & par-là de tous les changemens de la nature.

Pour découvrir de quelle manière se fait la congélation, il faut connaître d'abord en quoi consiste la nature des liquides, que l'on doit distinguer des fluides, en ce que ceux-ci forment un genre dont les premiers ne sont qu'une espèce. Un fluide est un corps dont les parties intégrantes ne sont pas liées ensemble, qui cède facilement au toucher, qui résiste peu à la division, & qui se répand comme de

lui-même. Parmi les fluides , il y en a qui se répandent par leur ressort & par leur poids, comme l'air , ou seulement par leur poids, sans que leur surface supérieure se mette exactement de niveau , comme un monceau de sable , ou enfin par leur poids & par le mouvement qu'ont en tous sens leurs parties , en sorte que s'ils sont en suffisante quantité , ils coulent & s'étendent jusqu'à ce qu'ils se soient mis de niveau ; & ces derniers sont les *liquides* proprement dits. Quoique le mouvement intestin des particules des liquides ne soit pas visible , il n'en est pas moins réel ; & rien ne le prouve mieux , que la dissolution que ces mêmes liquides font des corps durs.

Par les *parties intégrantes* d'un liquide , on entend celles qui entrent dans sa composition , suivant le dernier degré de division actuelle où elles doivent être pour former un tel liquide , & non pas suivant le dernier degré de division possible où elles sont capables d'arriver , la matière étant divisible à l'infini. Ce qu'on nomme parties intégrantes dans les liquides , est ce qu'on appelle *Molécules* dans la

matiere subtile , avec cette différence , que par les parties intégrantes d'un liquide on ne doit entendre , que de petits amas de matieres composés d'autres parties qui sont en repos les unes à l'égard des autres ; au lieu que les molécules de la matiere subtile sont comme de petits amas de matiere extrêmement agitée , ou plutôt comme autant de petits balons , ou de petits tourbillons d'un fluide très-subtil , qui tournent autour de leur centre avec une rapidité presque infinie , d'où ces molécules tirent leur force pour se dilater , & pour repousser autant qu'elles sont poussées ; ce qui fait leur *resfort*.

Un autre principe important , c'est que la dureté des corps ou la résistance que leurs parties apportent à leur désunion , ne vient que de la matiere subtile qui les environne & qui les comprime , parce qu'elle remplit le monde , & n'y laisse aucun vuide par ses divisions & subdivisions infinies. Suivant ces principes , les parties intégrantes d'un liquide seront plus ou moins dures , selon qu'elles seront plus ou moins comprimées par la matiere

subtile ; & c'est le plus ou le moins de cette matiere enfermée dans un liquide , selon qu'elle a plus ou moins d'agitation & de ressort , qui fait principalement le plus ou le moins de liquidité. Mais le plus ou le moins d'agitation de cette matiere dépend de la grosseur , de la figure , de la nature des surfaces planes , convexes ou concaves , polies ou raboteuses , & de la densité des parties intégrantes du liquide.

La pesanteur naturelle des parties d'un liquide est déjà une des puissances , qui les assujettit dans le vase où elles sont contenues ; mais outre cela les parties intégrantes de la plupart des liquides glissant les unes sur les autres , suivant qu'elles ont des surfaces plus ou moins polies , elles présentent d'autant moins de surface à la matiere subtile intérieure , qu'elles se touchent par plus d'endroits ; & celles qui se trouvent vers les extrémités , lui en présentent encore moins que les autres , puisqu'elles ont un côté vers le dehors. Elles en présentent donc davantage à la matiere subtile extérieure ; & comme cette matiere a plus de liberté ,

liberté , & se meut avec plus de vitesse que l'intérieure , il est clair qu'elle doit avoir plus de force pour repousser les parties du liquide vers la masse totale , que la matiere subtile intérieure n'en a pour les séparer. Ainsi le liquide demeurera dans le vaisseau qui le contient ; & de plus il aura quelque viscosité , ou résistera un peu à la division.

Mais c'est par l'action & la réaction continuelle & réciproque entre les parties du liquide & la matiere subtile qu'il contient, & entre ce tout & la matiere subtile extérieure , que l'équilibre se conserve entre les parties intégrantes du liquide, la matiere subtile intérieure, & la matiere subtile du dedans; en sorte que les vitesses , les compressions & les masses multipliées de part & d'autre, donneront toujours un produit égal de force ou de mouvement, & ce mouvement & cet équilibre subsisteront tant que le liquide perséverera dans son état de liquidité. Il suit de-là, que les parties intégrantes d'un liquide sont ce qui s'y meut avec le moins de vitesse ; que la matiere subtile qui coule entr'elles , est plus agitée ; & qu'en-

fin c'est la matiere subtile extérieure dont l'agitation passe celle de tout le reste.

La nature des liquides étant ainsi établie , rien de plus facile que d'expliquer la formation de la glace. Voulez-vous de la glace (dit M. de Mai-ran , l'Auteur de cette sçavante Dissertation ,) c'est-à-dire , voulez-vous changer un corps liquide tel que l'eau , en un corps solide ? Chassez une partie de la matiere subtile qui coule entre ses interstices , ou diminuez son mouvement ou son ressort , en sorte qu'elle ne puisse plus vaincre la résistance des parties intégrantes du liquide : c'est tout ce que fait le froid ; & vous aurez de la glace. En effet la chaleur n'étant autre chose, que le mouvement de la matiere subtile entretenu par les fréquentes secousses ou vibrations du corps du Soleil , qui occupe le centre de notre tourbillon , ce mouvement ne peut s'affoiblir que de deux manieres , ou par l'éloignement de sa source , c'est-à-dire du Soleil , ou par les obstacles que certains corps branchus , tels que l'air de notre atmosphere , y peuvent apporter. C'est de

la premiere maniere que la chaleur est apparemment moins grande dans Saturne que sur notre globe , parce que cette planete est dix fois plus éloignée que nous du Soleil ; mais c'est de la seconde seulement qu'en général il fait moins chaud , ou plus froid dans nos climats en Hiver qu'en Eté , & dans les Zones glaciales que dans les Zones tempérées & torride , parce que les rayons du Soleil dont la direction devient alors plus oblique , sont interceptés en partie par une plus grande quantité d'air.

Avec ces idées du chaud & du froid , si l'on imagine que le lieu où est un liquide , vienne à se refroidir peu à peu jusqu'au degré nécessaire pour la congélation , il est certain que la matiere subtile extérieure venant à diminuer de vitesse & de ressort , il faut qu'une partie de celle qui étoit renfermée dans le liquide en sorte ; & cette effusion doit continuer , jusqu'à ce que le nombre , la tension & la vitesse des molécules de celle qui y restent , soient diminuées au point nécessaire , pour demeurer en équilibre avec la matiere subtile du dehors ; ce

qui se prouve par l'exemple de ce qui arrive à l'eau enfermée dans la machine pneumatique dont on vient à pomper l'air. Car à chaque coup de pompe, l'air qui appuyoit sur la surface de l'eau, se trouvant plus rare & plus lâche, parce qu'il est en moindre quantité, il comprime d'autant moins l'eau & l'air qu'elle contient entre ses interstices; c'est pourquoi celui-ci se dégage, & sort de l'eau pour passer dans le récipient de la machine, où il est beaucoup plus au large.

Pour revenir maintenant au liquide qui commence à se geler, notre Auteur observe, que les parties integrantes de ce liquide ne tenant leur mouvement que de la matiere subtile qui les environne chacune en particulier, il est clair que leur mouvement doit diminuer avec celui de cette matiere. De-là naissent de plus grands frottemens entre leurs surfaces, parce que ces parties se rapprochent d'autant plus, que les molécules qui doivent les tenir séparées, ou les faire glisser les unes sur les autres, ont moins de vitesse & de ressort. Ainsi le liquide diminuera un peu de volume,

& commencera à s'engourdir & à devenir moins coulant. Mais si le froid augmente toujours, les frottemens & la densité augmenteront avec lui, parce que l'agitation & le ressort de la matiere subtile intérieure qui devoit les vaincre, diminuent; & il y aura bientôt plusieurs parties integrantes du liquide qui s'appliqueront les unes sur les autres, qui s'accrocheront & s'entrelaceront si elles sont crochues & rameuses, sans qu'elles puissent être séparées par le choc ou par le ressort des molécules affoiblies qui viennent encore les heurter. Les premiers assemblages de ces parties se trouveront vers les bords du liquide & vers la surface; car c'est-là que l'effusion de la matiere subtile intérieure, & l'affoiblissement de son ressort, doivent commencer. Mais si l'augmentation du froid continue, ou seulement si le froid persévère dans un certain degré, à ces parties assemblées il s'en joindra bientôt d'autres, sçavoir celles qui en sont les plus voisines, & à celles-ci d'autres encore; & enfin toute la masse du liquide demeurera fixe & immobile; elle sera dure, elle oc-

cupera moins d'espace , en un mot elle fera glacée.

Une observation qu'il ne faut pas omettre , c'est qu'il s'en faut bien que la matiere subtile intérieure conserve toujours un même rapport d'agitation & de ressort avec la matiere subtile extérieure , lorsque le mouvement de celle-ci diminue , c'est-à-dire , que la diminution de vitesse de la matiere subtile intérieure , doit être avec la diminution de vitesse de l'extérieure en raison composée : 1^o. De la diminution de la vitesse de cette dernière ; 2^o. Du plus grand nombre de surfaces qui viennent à se toucher immédiatement ; 3^o. Et de la plus grande densité du liquide ; en sorte que si la matiere subtile du dehors diminue de quatre degrés de vitesse , par exemple , celle du dedans diminuera beaucoup plus que de quatre degrés.

La diminution du mouvement de la matiere subtile est donc la cause immédiate de la congélation. A l'égard des causes moyennes & accidentelles aux deux qui ont été spécifiées plus haut , sçavoir l'éloignement du Soleil & l'obliquité de ses rayons , il

faut joindre encore le nitre subtil répandu dans l'air & les vents. Dans les Pays dont le terroir contient beaucoup de nitre ou de salpêtre, comme par exemple à la Chine, l'esprit de sel remplissant quelquefois l'atmosphère, y cause même au milieu de l'Été un froid si violent, que les lacs & les rivières en sont glacés. Ce phénomène s'explique, en supposant ce qui est avoué de tous les bons Physiciens : 1°. Que l'air est un fluide fort branchu, dont les molécules ont une figure propre à leur donner du ressort ; 2°. Que les corpuscules nitreux au contraire ressemblent à de petites pyramides droites, roides & pointues. Cela posé, on comprend aisément que les corpuscules nitreux venant à s'en aller, & à se répandre dans l'air, soit par la chaleur du Soleil, soit par telle autre cause qu'on voudra, ce seront autant de petits dards qui s'embarraferont entre les rameaux de l'air, lesquels se joignant plusieurs ensemble, feront des pelotons plus gros & plus ferrés qu'auparavant ; d'où il résultera un corps plus compacte & plus dense. Cette densité par rapport aux rayons

du Soleil , produira le même effet que l'obliquité de l'atmosphère , c'est-à-dire , que l'activité de la matière subtile en sera émoussée ; & de cet affoiblissement suivra la congélation des rivières , des lacs , & des veines d'eau qui coulent près de la surface de la terre.

Enfin pendant le froid & la gelée , le vent sec contribue à la congélation ; 1°. Parce qu'il chasse violemment l'air qui touche la surface du liquide , & qui a perdu de sa froideur , en recevant les molécules de matière subtile qui s'échappent de ce même liquide ; 2°. Parce qu'à la place de cet air chassé , il en substitue un autre plus froid & plus dense , & tel qu'il le faut pour procurer la congélation , en affoiblissant la matière subtile extérieure qui touche le liquide , & par ce même moyen , celle qui y est renfermée. Cet effet qu'on attribue ici au vent , choque le préjugé commun , suivant lequel le vent est un obstacle à la formation de la glace ; & cela se trouve vrai lorsque le vent a beaucoup de prise sur une grande surface d'eau , qu'il n'empêche de geler qu'en tant qu'il l'agite par

des secouffes continuelles. Mais il est toujours certain en général, que le vent doit accélérer la congélation; & pour s'en convaincre, il n'y a qu'à en faire l'expérience, en exposant pendant la gelée deux vaisseaux de même grandeur pleins d'eau, l'un au vent sec, l'autre à l'abri du vent.

Il y a différentes congélations, selon la différence des liquides en général. Il y a des liquides qui se gèlent facilement, & dont la glace n'est pas dure, comme l'huile d'olive: il y en a d'autres qui ne se gèlent que difficilement, comme les liqueurs spiritueuses; quelques-unes qui ne se gèlent presque jamais, comme l'huile de térébenthine; quelques-autres qui ne se glacent point du tout, comme l'esprit de nitre, l'esprit de vitriol, & le Mercure. L'Auteur en donne des raisons qui se tirent très-naturellement de son système, en supposant aux molécules de ces divers liquides une figure convenable. Nous allons à présent parler des divers phénomènes de la congélation dans ses commencemens, dans sa perfection & dans sa destruction, ou dans le dégel.

I. Les phénomènes de la congélation de l'eau dans ses commencemens sont , 1^o. La formation des premiers filets de la glace ; 2^o. Et celle des bulles d'air qui se voyent dans l'eau quand elle commence à se geler.

Les premiers filets de glace paroissent d'abord vers la surface du liquide couchés horizontalement , & attachés par un bout aux parois du vaisseau , avec lesquels ils forment divers angles , rarement l'angle droit. A ces filets il s'en joint d'autres qui leur sont aussi diversement inclinés , & ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en résulte un premier tissu de glace , qui devient toujours plus épais , à proportion que le froid continue ou qu'il augmente. On conçoit facilement que ces filets de glace sont formés de plusieurs petits glaçons qui s'accrochent bout à bout ; mais quelle cause produit le premier de ces petits glaçons , & qu'est-ce qui les détermine à prendre une telle situation entr'eux ?

Notre Auteur est persuadé que dans la nature il n'y a point de corps si parfaitement uniforme , qu'il n'admette quelque inégalité de parties. Or il

suffit qu'un liquide ait quelques - unes de ses parties intégrantes plus grosses , moins polies que les autres , ou plus ferrées entr'elles , pour donner prise par cet endroit à la cause de la congélation , qui formera le premier glaçon d'un petit amas de ces sortes de parties. A ce premier glaçon se joindront les parties intégrantes du liquide les plus voisines , auxquelles il communique sa froideur ; & voici comment se fait cette communication. Les corpuscules qui composent le glaçon ne sont pas si étroitement unis , qu'ils ne laissent entr'eux quelques intervalles , lesquels quoique fort étroits , offrent à la matiere subtile un passage plus libre , que les interstices qui partagent les autres parties du liquide , & qui varient à chaque instant à cause du mouvement intestin de toutes ces parties : ainsi selon la loi inviolable , qu'un fluide pressé de tous côtés s'échappe vers celui où il est moins pressé , la matiere subtile doit abandonner les parties du liquide les plus voisines du petit glaçon , pour passer dans les petits canaux de celui-ci , &

laisser par conséquent immobiles les molécules dont elle s'éloigne , lesquelles forment elles-mêmes d'autres petits glaçons.

Mais pourquoi s'unissent-ils bout à bout ? Il faut supposer pour cela, que chaque glaçon est en petit ce qu'est un paquet d'une vingtaine de bâtons de cire d'Espagne : par exemple , comme le paquet laisseroit suivant sa longueur plus de passage à l'air que suivant sa largeur ; de même les premiers glaçons laissant plus d'ouverture à la matiere subtile selon leur longueur que selon leur largeur , ils doivent se joindre entr'eux bout à bout plutôt qu'en tout autre sens.

Les premiers filets de glace sont couchés horizontalement sur la surface de l'eau , 1^o. Parce que cette surface étant plus exposée au froid que le dedans , c'est par l'extrémité du liquide que la congélation doit commencer ; 2^o. Parce qu'en quelqu'endroit que se forment les filets , lorsque la congélation se fait lentement ; ils ont le tems de monter à la surface , étant plus légers qu'un pareil volume d'eau.

Les filets sont ordinairement attachés par un de leurs bouts aux côtés du vaisseau ; 1^o. Parce que la congélation devant commencer par les endroits les plus minces du liquide , les bords de la surface , près des côtés du vaisseau , sont ce qu'elle a de plus facile à pénétrer par le froid ; 2^o. Parce que quand même les filets se formeroient vers le milieu de la surface , ils iroient bientôt d'eux-mêmes s'attacher aux parois du vaisseau , pourvû qu'il ne soit pas plein par-dessus les bords , ou qu'il ne soit pas enduit par-dedans de quelque liqueur grasse ; & cela conformément à ce phénomène curieux expliqué dans quelque Traité de Physique , que tout corps qui nâge sur l'eau , & qui se mouille facilement , va toujours se joindre aux parois du vase qui contient l'eau , en quelqu'endroit de la surface qu'on le mette , pourvû que le vase soit mouillé lui-même par cette eau , & ne soit pas tout-à-fait plein : au lieu que ce corps viendroit des parois vers le centre de la surface , si le vase étoit frotté par-dedans de quelque matiere gras-

se, ou qu'il fût plein jusques par-dessus les bords.

Enfin les premiers filets de glace font avec les côtés du vaisseau divers angles , & rarement l'angle droit , parce qu'un premier filet de glace qui tend à se coler perpendiculairement aux parois de ce vase , n'est pas plutôt formé , qu'il s'en forme de seconds à côté de lui , lesquels s'attachant à ce premier par un de leurs bouts , tendent par l'autre vers les bords du vase , & attirent le premier filet du côté où ils se rencontrent plus forts & en plus grand nombre. Or comme il arrive rarement que cette attraction soit égale de part & d'autre , il est rare aussi que les premiers filets demeurent perpendiculaires aux côtés du vaisseau , & forment avec eux un angle droit.

II. Les phénomènes qu'on observe dans la glace lorsqu'elle est formée ; sont sa pesanteur & son volume , sa dureté & sa résistance , son goût , sa transparence & sa couleur , sa réfraction & sa figure par rapport à la palingénésie.

Quoiqu'il soit vrai à la rigueur que

tout liquide se resserre à mesure qu'il se refroidit , & que par conséquent il doit avoir moins de volume étant gelé qu'en tout autre état ; il est cependant certain que la glace de l'eau est plus légère , ou occupe plus d'espace que cette même liqueur , puisque les glaçons nagent toujours dessus ; & il n'est pas moins indubitable , que c'est l'air seul renfermé dans la glace qui la rend plus légère que l'eau , puisque celle-ci étant bien purgée d'air par la machine pneumatique , la glace qui en vient a moins de volume que l'eau ordinaire , & descend au fond si on l'y plonge.

Mais pourquoi l'air qui étoit dispersé dans l'eau en une infinité de parcelles avant la congélation , augmente-t'il le volume de l'eau, lorsqu'il s'est rassemblé en de plus grosses gouttes après la congélation , surtout quelque portion de cet air sortant du liquide pendant qu'il se gele ? en un mot, comment est-il possible qu'une bulle d'air , par exemple , formée de huit petites bulles d'air qui étoient répandues dans le liquide , ait plus de force & de ressort pour écarter les

parties de l'eau en se dilatant , que les huit petites gouttes n'en avoient auparavant , étant dispersées çà & là ?

Cela s'explique tout d'un coup par ce principe de Géométrie : Que les corps qui augmentent de grosseur , sans changer de figure , augmentent de solidité en raison triplée de leurs côtés ou diametres , & de surface seulement en raison doublée ; ce qui est rendu sensible par l'exemple d'un gros dez à jouer formé de l'assemblage de huit autres plus petits : d'où il paroît que les bulles d'air , qui dans la glace naissent de la réunion d'une infinité de goutelettes répandues dans l'eau avant la congélation , doivent avoir plus de ressort après cette réunion pour écarter les parties de l'eau , & y faire des vuides plus considérables , que toutes ces particules ensemble n'en avoient étant dispersées.

A l'égard de la force de la dilatation de la glace par rapport aux vaisseaux qui la contiennent & qu'elle creve , on peut dire en général que ses effets sont quelquefois si violens , qu'un pen d'eau ou d'humidité dans
les

Les pierres & dans les marbres est capable de les fendre, & de les faire éclater pendant la gelée.

La glace est d'autant plus dure & plus forte, qu'elle s'est formée plus lentement, parce qu'alors elle contient moins d'air. On peut juger de sa résistance en général par celle d'un petit cylindre de glace long de six pouces, & du diamètre de quatre lignes, lequel soutenoit dans son milieu sans se rompre le poids de dix-sept onces deux gros.

La glace ordinaire est plus blanche & moins transparente que l'eau, à cause des bulles d'air qu'elle renferme, & des fêlures qu'elles y causent; mais la glace formée d'eau purgée d'air est d'une couleur plus foncée, & quelquefois si transparente, qu'étant taillée en lentille sphérique par le moyen d'un bassin concave un peu chaud, elle rassemble, comme nous l'avons déjà remarqué dans un autre article, les rayons du Soleil, presque avec la même justesse que les meilleurs miroirs ardents.

Quant aux différentes figures que

prennent les glaçons dans les rivières & dans les mers , figures qui quelquefois approchent beaucoup de certains ouvrages de l'art , l'Auteur est persuadé qu'il seroit inutile d'en rechercher la cause , qui dépend presque toujours d'un enchaînement de circonstances ignorées , & qu'il est impossible de déterminer.

III. Les phénomènes de la destruction de la glace sont , 1°. La lenteur avec laquelle elle se fond; 2°. L'évaporation qui s'en fait; 3°. Le dégel.

1. Comme la glace doit se détruire par des causes contraires à celles qui l'ont produite , il semble qu'il n'y a pas de manière plus naturelle d'en expliquer la destruction , que par l'inversion de la plupart des raisonnemens qui ont servi à montrer comment elle se forme. Mais il faut observer, qu'elle ne se détruit pas exactement dans l'ordre renversé de sa formation , puisqu'elle se dégele beaucoup plus lentement qu'elle ne s'étoit formée. La raison en est, que la matière subtile intérieure trouve bien

plus de facilité à s'échapper d'entre les parties intégrantes d'un liquide pendant qu'elle les tient séparées, qu'elle n'en trouve à s'y glisser, après que leurs surfaces se sont appliquées l'une contre l'autre, & que plusieurs de ces parties ne lui laissent aucun passage pour les diviser, & pour vaincre la compression de la matiere subtile environnante qui entretient leur union. L'Auteur estime qu'il faut presque toujours que la matiere subtile ébranle les particules de la glace par son choc, avant que de pouvoir s'insérer entr'elles, & que cet ébranlement demande un grand nombre de molécules de cette matiere subtile, une extrême agitation dans ces molécules, & un tems considérable.

C'est la raison pourquoi une piece de glace demeurera beaucoup plus long-tems à se fondre auprès du feu, & à une distance où l'on auroit peine à tenir la main, que dans l'eau tiède, & même un peu froide. En effet les parties intégrantes de l'eau empruntant toute leur agitation de la matiere subtile, heurtent continuellement les parties de la glace, les séparent, &

s'y font un passage ; comme le choc des glaçons & des troncs d'arbres poussés par une rivière , abbatent un pont, d'ailleurs inébranlable à la seule impétuosité de l'eau. L'action de l'air sur la glace est fort inférieure à celle de l'eau , non-seulement parce que ses petits flocons sont sept à huit cens fois plus légers qu'un pareil volume d'eau , mais encore parce qu'il affoiblit plus la matiere subtile à cet égard par ses rameaux , qu'il ne lui aide par la grosseur des particules qui le composent : car tout le reste étant égal , un morceau de glace qui est six minutes vingt-quatre secondes à se dégeler dans l'air libre , se fond en quatre minutes dans la machine du vuide.

2. Il est prouvé par plusieurs expériences , que la glace toute solide qu'elle est , s'évapore en plus grande quantité pendant une forte gelée , que ne fait l'eau dans un tems moyen entre le grand chaud & le grand froid ; ce qui paroît assez extraordinaire. Voici la raison qu'en donne l'Auteur. Il suppose que l'évaporation des liquides peu spiritueux vient principalement du choc de l'air contre leurs par-

ties extérieures , & que cette dissipation se fait moins selon leur quantité , que suivant la grandeur des surfaces qu'ils présentent à l'air. Or la glace ayant presque toujours des rides , des inégalités & une bosse sur la superficie , & de plus se détachant ordinairement des vaisseaux évasés qui la contiennent , elle présente plus de parties à l'air que n'en présentait l'eau dont elle est formée. A la vérité elle résiste davantage par sa dureté au choc des particules de l'air ; mais en récompense celles-ci en enlèvent de plus grosses pièces , tant parce que les molécules de la glace se trouvent fortement liées les unes avec les autres , que parce qu'elles sont plus légères qu'un pareil volume d'eau.

3. Si ce qu'on appelle proprement : *dégel* , mérite quelque attention particulière , c'est principalement par rapport à cette circonstance , que le froid semble se redoubler lorsqu'il est près de finir ; ce qui doit s'expliquer par les effets des sels par rapport à l'eau : & à la glace , & de la glace artificielle.

On a vu que les particules salines :

répandues dans l'air pouvoient le refroidir , & produire la congélation des rivières. Ici c'est tout le contraire; les sels mêlés avec la glace la fondent très - promptement. Mêlés avec la glace , & appliqués autour d'une bouteille pleine d'eau , ils font geler cette eau ; enfin étant mêlés avec l'eau , ils l'empêchent de se geler , & néanmoins ils la rendent plus froide. Comme c'est du premier de ces phénomènes que dépend l'explication de tous les autres , notre Auteur a eu soin de s'affurer du fait par des expériences très-exactes ; d'où il résulte que de quatre morceaux de glace parfaitement égaux ; de même figure , & dont trois seulement étoient également enveloppés , le premier de sel marin , le second de sel armoniac , & le troisième de salpêtre , le premier morceau s'est toujours fondu en moins d'une heure , le second cinq à six minutes après , le troisième au bout de trois heures , & le quatrième qui étoit de glace pure , a toujours duré plus de cinq heures & demie. L'accélération de la fonte de la glace par les sels vient certainement de leurs corpucules poin-

rus , qui comme autant de coins écartent çà & là les parties intégrantes de l'eau glacée , ou du moins les ébranlent par leur choc en détruisant la congruité , & font en un moment ce qu'une assez grande chaleur ne feroit qu'à la longue.

Pour expliquer maintenant la propriété qu'ont ces mêmes sels , de procurer la congélation de l'eau enfermée dans une bouteille , lorsqu'étant mêlés avec de la glace ou de la neige , on les applique à l'entour , il faut supposer un fait averé par le raisonnement & par l'expérience ; sçavoir que les sels en faisant fondre la glace , augmentent pour quelques minutes sa froideur. Or cette augmentation de froid ne venant que de la diminution du mouvement & du ressort de la matiere subtile contenue dans les pores de la glace , & que l'écartement subit des particules de celle - ci par les sels oblige à dilater son ressort , il est clair que la matiere subtile enfermée dans le liquide , & qui en fait toute la liquidité , le doit quitter , & se mettre

en partie à la place de celle qui cesse par son relâchement de lui résister, ou de lui faire équilibre ; c'est-à-dire, que ce liquide doit se geler. Cette glace artificielle est en tout semblable à celle qui se fait naturellement par un froid très-vif & très-prompt, à quelques petites différences près.

Par le même principe on peut expliquer, comment se forme très-promptement une croute de glace autour de la peau des fruits que l'on fait dégeler en les plongeant dans de l'eau médiocrement froide ; pourquoi le froid augmente considérablement dans le tems du dégel ; pourquoi la différente promptitude des congélations, selon les différens sels qu'on y emploie, ne suit pas les différens degrés de promptitude de la fonte de la glace par le moyen de ces sels ; pourquoi la congélation artificielle est plus prompte, selon que le vaisseau environné de sel & de glace est d'une matiere plus dure & moins pliante ; pourquoi le sel armoniac & le nitre dissous à froid dans en suffisante quantité, la rafraichissent.

fraîchissent extrêmement ; enforte qu'elle peut servir , faute de glace , à rafraîchir une bouteille d'eau ou de vin ; enfin pourquoi les sels entretiennent la liquidité de l'eau , & sont un obstacle à sa congélation , quoiqu'ils la refroidissent : autant de phénomènes qui peuvent s'expliquer par le principe que nous avons établi.

*Dissertation par M. de Mairan ,
Journal des Sçavans , Mars 1719 ,
page 145.*



ARTICLE XXII.

*Sur la formation de la Glace dans
les grandes Rivières.*

LA congélation des rivières ne commence pas par leur fond, comme quelques-uns l'ont pensé, mais par leur bord & par leur superficie, comme on convient qu'il arrive aux étangs, & en général à toutes les eaux dormantes.

L'eau qui se durcit & se gele, ne reçoit un tel changement, que par le contact ou par l'approche de quelque autre corps dur ou fluide, dont le degré de froideur surpasse celui qu'elle avoit actuellement, & va tout au moins jusqu'au froid de la congélation : ce ne peut donc être que par sa superficie, par la partie la plus exposée à l'action de ce corps ou de ce fluide, de l'air, par exemple, que l'eau commence à se glacer ; & c'est aussi ce que l'expérience confirme en général. Si dans un tems de gelée on

présente à l'air froid un gobelet plein d'eau , on verra bientôt paroître à la superficie de cette eau de petits filets de glace , qui venant à se multiplier & à se joindre bout à bout & latéralement , ou sous une certaine inclinaison , y formeront d'abord une espece de réseau , une pellicule , & enfin une larme sensible de glace plus ou moins épaisse , selon que le froid sera plus ou moins grand. Et s'il étoit possible que ces premiers filets , ou ces glaçons naissans , se formassent au-dessous de la superficie de l'eau , ils y monteroient aussi-tôt par leur légèreté , puisque la pesanteur spécifique de la glace est beaucoup moindre que celle de l'eau dans son état de liquidité ; ainsi les premières masses sensibles des glaçons qu'on y appercevrait , se trouveroient toujours à la superficie. Les bords des rivières doivent être glacés avant leur courant , non-seulement par cette raison , mais encore parce que l'eau y est plus tranquille , moins profonde , & plus près d'un terrain déjà refroidi par l'air extérieur.

Par quelle circonstance extraordina

naître ces gros glaçons qu'on voit flotter au milieu des grandes rivières, se feroient-ils donc formés au fond de l'eau, ou sur le terrain qui est au-dessous, avant que de monter à la superficie ? La froideur de ce fond & de ce terrain n'étoit-elle pas avant la gelée moindre que celle de la congélation ? Le froid qui a dû d'abord se faire sentir dans l'atmosphère, n'a-t-il pas dû aussi frapper la surface extérieure du liquide, avant que de pénétrer jusqu'à celle du fond, & jusqu'au terrain qui lui est contigu ?

A une théorie si simple & si lumineuse, on oppose l'expérience, ou pour parler plus exactement, le témoignage d'un nombre de gens fort peu en état de discerner & de constater l'expérience. Les Meuniers, les Pêcheurs, les Bateliers, &c. déposent unanimement que la glace se forme au fond des rivières, & sur le terrain de leur lit, plutôt qu'à la surface de l'eau; ils disent en avoir vu monter les glaçons, ou les en avoir arrachés avec leurs crocs, s'ils n'aiment mieux attribuer cet effet au Soleil qui les détache, disent-ils, du fond où ils s'é-

toient formés pendant la nuit , & les attire pendant le jour vers la superficie. Quelques-uns disent que l'on aperçoit souvent sur un des côtés des glaçons flottans , des vestiges non équivoques du terrain & du gravier sur lequel ils se sont formés ; mais ces glaçons ne viendroient-ils pas des bords de la riviere, des isles, des bancs de sable , & des bas-fonds qu'elle rencontre dans son cours , & d'où ils auroient été détachés & entraînés vers le courant ? Ne faudra-t-il pas aussi en attribuer un grand nombre aux ruisseaux & aux petites rivières qui se jettent dans la grande , & qui par leur peu de largeur , & la proximité de leurs bords , n'en sçauroient guères fournir que de cette espece ?

M. de Hales, de la Société Royale de Londres , dit formellement avoir vû en même-tems sur une riviere, & la glace de la superficie qui avoit un tiers de pouce d'épaisseur , & à travers celle-ci une autre glace adhérente au fond , laquelle étant rompue , se trouva de près d'un demi-pouce. Cette glace de dessous se joi-

gnoit, ajoutoit-il, à celle de dessus au bord de l'eau, & les deux lits de glace s'éloignoient de plus en plus l'un de l'autre, à mesure que l'eau devenoit plus profonde.

» Comme l'on n'a jamais vû, dit-il, » les étangs, les mares, & toutes les » eaux calmes commencer à se gla- » cer par le fond, il faut nécessaire- » ment que le courant de l'eau en soit » la cause dans les rivières : car il est » sûr que dans les eaux calmes, aussi » bien que dans la terre, la surface est » bien plus froide que le dessous, au » lieu que dans les eaux courantes, le » dessus & le dessous se mêlant en- » semble, deviennent à peu près aussi » froids l'un que l'autre; & le dessus » ayant toujours plus de vitesse que » le dessous, & pas plus de froid, il » ne se glace que le dernier «.

Mais M. l'Abbé Nollet remarque d'abord, que les observations rapportées par M. Hales, ont été faites dans un endroit de la rivière qui sert d'abrevoir, & où par conséquent elle avoit peu de profondeur.

2°. Que la glace qu'il y a vûe n'ayant

qu'un tiers de pouce d'épaisseur, n'a pû lui permettre de marcher dessus pour l'examiner plus avant.

3^o. Que le témoignage des Pêcheurs est si souvent employé dans ce récit, qu'il est à craindre que M. Hales n'y ait mis trop de confiance.

Il convient qu'en général le dessous de la glace qui se forme sur les rivières n'est pas uni, comme on le voit ordinairement à la glace des eaux dormantes; qu'il est moins compacte, & comme enduit d'une poussière de petits glaçons plus ou moins grumelés, en cela assez semblable aux pierres qu'on tire de la carrière, & qui sont couvertes de cette partie tendre qu'on nomme le *Boufin*, comme les Bateliers appellent aussi cette espèce de glace; que de plus on y trouve souvent de la terre & mille petites saletés, telles qu'il peut y en avoir au fond des rivières. Mais M. l'Abbé Nollet est bien éloigné de croire que ces glaçons se soient formés sur ce fond & au-dessous de l'eau, comme on le suppose, & qu'on les y ait vus adhérens. Ce n'est pas qu'il n'ait pû arriver quelquefois à des Bateliers de

retirer de gros morceaux de glace avec leurs crocs à quelques pieds de profondeur auprès des bords des rivières ; mais ce n'est sans doute que parce qu'il arrive souvent , qu'après une gelée suivie d'un commencement de dégel , les rivières viennent à grossir & à se geler de nouveau , avant que la glace qui s'étoit formée la première fois à leurs bords ait fondu ou s'en soit détachée. Il n'en a pas fallu davantage pour faire croire à des gens sans principes , qu'une pareille glace s'étoit formée au-dessous de l'eau.

M. l'Abbé Nollet cherche ensuite la cause de cette différence que l'on remarque entre les glaçons des rivières , & ceux des étangs & des eaux dormantes. Pendant la gelée de 1746 il fit ouvrir de la glace épaisse de plusieurs pouces sur la rivière de Seine , & en des endroits où l'eau avoit neuf à dix pieds de profondeur. Le glaçon enlevé , il vit contre son attente que le bousin qui y étoit attaché , ressembloit très-souvent à celui qu'il avoit observé plus près du rivage ; il y remarqua les mêmes saletés , & ils s'ap-

perçut aussi que la surface de l'eau en étoit couverte, quelque soin que l'on prit de les en ôter.

Le boufin mêlé de toutes ces saletés monteroit-il ainsi du fond vers la superficie, & seroit-ce par cette voie qu'il s'attacheroit à la partie inférieure des glaçons qu'il rencontre? Pour s'en éclaircir, M. l'Abbé Nollet fit venir un tonneau dont on ôta les deux fonds; il fit faire dans la glace un trou de même diametre, & il y plongea perpendiculairement le tonneau jusqu'aux trois quarts de sa longueur: il forma de cette maniere une espece de puits, d'où l'on enleva bientôt tout le boufin qui couvroit l'eau; après quoi il n'en vit plus, & il demeura convaincu que cette poussiere, ces débris, & pour ainsi dire ces gravais de glace, avec toutes les matieres étrangères qui s'y attachent, obéissent au courant, ne se fixent point aux endroits où la gelée les fait naître, & ne venoient point du dessous de l'eau.

D'où viennent-ils donc? ou plutôt quelle est la cause de leur formation? Il n'est pas mal-aisé de l'imaginer. Une infinité de petits glaçons formés

sur toute la superficie de l'eau , & principalement vers ses bords , sont entraînés , choqués , brisés , atténués de toutes parts , & quelquefois arrondis par d'autres glaçons , & par le courant même , avant qu'ils aient eu le tems de grossir ou de s'unir. Poussés contre la surface inférieure des grandes pièces de glace , ou jetés au-dessus par les vagues , les uns s'y attachent plutôt ou plus tard , selon que mille cas fortuits les y déterminent , tandis que les autres continuent de rouler avec le courant ; enfin chargés de toutes les particules de matiere étrangere qu'ils portent avec eux , ou qu'ils rencontrent sur leur chemin , de terre , de vase , d'écume , de paille , de brins d'herbe , ils forment au-dessous , aux côtés , ou au-dessus des gros glaçons , tantôt cette espece de duvet rare & spongieux qu'on y observe , tantôt cette superficie aigre & grumeleuse qui n'y est pas moins ordinaire , & où l'on croiroit voir l'empreinte d'un terrain sur lequel ils auroient pris naissance. Et il ne faut pas douter que parmi tous ces glaçons qui couvrent les ri-

vières pendant les fortes gelées, il ne s'en trouve plusieurs où cette apparence d'empreinte n'est pas trompeuse, & qui retiennent même des fragmens de la rive dont ils se sont détachés; mais ceux-ci, selon M. l'Abbé Nollet, sont en très-petit nombre. En un mot, on n'a nullement besoin de recourir à la prétendue congélation du fond de l'eau, pour expliquer les différences qui caractérisent les glaçons des grandes rivières comparés à ceux des eaux dormantes; & c'en est assez pour ôter toute la force au grand argument de l'opinion vulgaire.

Mais en admettant toutes ces explications comme vrai-semblables, & même suffisantes, ne pourroit-on pas demander encore s'il est bien prouvé, que le lit des rivières en un tems de gelée ne se refroidisse pas plutôt que la surface extérieure de l'eau ou du terrain exposé à l'air? Car enfin il y a une chaleur centrale ou souterraine, quelle qu'en soit la cause, dont les effets ne sont pas douteux, & dont la température actuelle de l'atmosphère participe infiniment, ou n'est en

grande partie que le résultat , conjointement avec ce qu'il faut en attribuer aux causes générales & particulières de la vicissitude des saisons. Cette chaleur qui varie sans cesse auprès de la surface de la terre , mais dont la privation totale ne feroit du globe terrestre qu'une masse de glace , interceptée ou diminuée par des circonstances que nous ignorons , & qui entrent peut-être beaucoup dans la cause de la gelée , ne donneroit-elle pas occasion à un plus prompt refroidissement du fond du lit des rivières , & de l'eau qui en approche ; par cela même qu'il est plus profond & à couvert de l'air extérieur , qui n'en a pas encore senti la diminution ? J'avoue qu'il n'y a pas grande apparence à cette conjecture , & que d'autres effets, tels, par exemple , que celui de la glace , qu'on ne trouve jamais au-delà de quelques pieds sous terre , s'opposent manifestement au sujet de doute qu'on en pourroit tirer dans la question présente. Ne négligeons point cependant de dissiper ce doute par l'inspection même du fait.

M. l'Abbé Nollet a plongé plusieurs fois , & en différentes années , des Thermometres au fond de la riviere , soit au commencement de la gelée , soit lorsque la glace de la superficie avoit deux , trois , six & jusqu'à huit pouces d'épaisseur ; & il n'a jamais trouvé l'eau de ce fond au degré de froid nécessaire pour la convertir en glace : il est vrai qu'elle en a quelquefois approché ; mais ce n'a été qu'après plusieurs jours d'une forte gelée , & nullement lorsque la glace de la superficie n'avoit que trois quarts de pouce d'épaisseur , encore moins lorsqu'elle n'étoit que d'un tiers de pouce , qui est le cas où M. Hales suppose qu'il s'en soit formé un demi - pouce sur le fond même,

Histoire de l'Académie Royale des Sciences pour l'année 1743. page 8.



Maniere de conserver la Glace & la Neige , par M. W. Ball.

A Livourne en Italie , on construit communément les magazins de neige & de glace sur le côté d'une montagne escarpée ; ce n'est à proprement parler qu'un trou pratiqué dans la terre , au fond duquel on ménage un passage pour écouler l'eau , qui sans cette précaution y séjourneroit , & feroit fondre la neige & la glace. On couvre ce magasin de paille , dans la forme d'un couvercle de casserolle , pour empêcher la pluie de pouvoir y pénétrer. On remplit entierement ce trou de neige ou de glace , qui doit provenir d'une eau très-pure , pour être mêlée avec le vin ; mais auparavant on garnit bien le fond avec un lit de paille , & je crois que c'est de la paille d'orge que l'on prend pour cela. Ensuite à mesure qu'on y met la glace , ou qu'on y entasse la neige , on a soin d'en bien garnir les côtés avec

de la même paille , & on s'en sert aussi pour recouvrir le tout. On a remarqué que dans l'espace de six mois , cette neige ou cette glace ne perd pas la huitième partie de son poids. Toutes les fois qu'on en retire de ce trou pour la mettre à l'air , il faut avoir attention de bien l'envelopper de cette paille ; & elle se conserve très-bien.

L'autre méthode usitée en Italie & ailleurs pour conserver la neige ou la glace , est de la tenir enveloppée dans de la paille ou des roseaux.



ARTICLE XXIII.

Eclaircissmens sur les Congélations artificielles.

M Algré le grand nombre d'expériences faites jusqu'à présent sur les congélations artificielles, on peut dire que la matiere n'est encore qu'ébauchée, puisque les expériences les plus simples, qui sont pourtant les fondamentales, nous manquent encore, d'autres plus recherchées les ayant fait négliger.

Il s'en faut de beaucoup, dit *M. de Réaumur*, que le salpêtre, regardé vulgairement comme le sel le plus propre aux congélations artificielles, mérite cette qualification, puisque suivant les expériences faites par notre Auteur, le salpêtre le plus raffiné mis en œuvre dans cette opération, ne fait descendre le Thermometre qu'à trois degrés & demi au-dessous du point fixe, qui est toujours celui de la congélation superficielle de l'eau,

au-

au-dessous duquel tous les autres marquent un plus grand froid ; au lieu que moins raffiné , il le fait descendre plus bas. C'est effet n'est causé que par la partie qui rend alors ce salpêtre moins pur , & qui n'est autre que le sel marin qu'on lui enleve par les trois caves qu'on lui donne pour le purifier. Cela est si vrai , que dans des jours très-chauds , deux parties de sel marin mêlées par l'Observateur avec partie de glace pilée , ont fait descendre de 15 degrés le Thermometre , qui pendant l'Hiver de 1769 , n'auroit pas été plus bas que 14 degrés & un quart , comme il est facile d'en juger en le comparant avec ceux qui étoient alors à l'Observatoire.

Il suit de - là que plus ce salpêtre fera baisser le Thermometre , moins il sera pur , & plus il sera chargé de sel marin ; ensorte que le meilleur ne donnera que trois degrés & demi de froid , & que les autres plus mauvais en donneront toujours davantage. On n'auroit pas deviné que la vertu de causer une grande inflammation tant recherchée dans le salpêtre , pût être sûrement indiquée par sa vertu refroidi-

diffante. Or comme la poudre à canon n'est presque que du salpêtre, elle pourroit fort bien être mise à cette épreuve préféablement à toutes les autres. Il résulte des expériences de l'Auteur, que nul sel commun ou moyen, nul alkali n'égale le sel marin pour la faculté de congeler, & qu'on pourroit dresser des tables, où le degré du plus grand froid que puisse causer chaque sel, lui seroit assigné.

M. de Reaumur nous donne ensuite des observations intéressantes sur l'art de faire des glaces. Il n'y est nullement question de produire le plus grand froid; & l'on n'y voit au contraire que de légères glaces sur des *neiges*: c'est à quoi convient si bien le salpêtre, & surtout le plus mauvais, comme étant le plus efficace en moindre dose, & en même-tems le moins cher. Notre Académicien fournit pour cet usage des matieres encore à meilleur marché; sçavoir, la soude d'Alicante, & la cendre de bois neuf. Au surplus il paroît par toutes les expériences faites jusqu'à présent, que si le mélange d'une matiere quelconque avec la glace pilée produit un

plus grand froid, c'est uniquement parce que ce mélange fait fondre la glace; faite de quoi cette augmentation de froid n'arriveroit nullement.

Les liqueurs spiritueuses & salines ont plus de vertu par rapport aux congélations artificielles, que les sels ou concrets ou alkalis de l'esprit de nitre refroidi jusqu'au point de la congélation du Thermometre, & versé sur le double de son poids de glace pilée, fait descendre très-promptement le Thermometre jusqu'à 17. degrés, c'est-à-dire, quatre degrés plus bas que ne fait le sel marin, le plus efficace des sels. Pour donner à l'esprit de nitre & à la glace pilée un plus grand froid que celui de la congélation, il ne faut qu'environner ces deux matieres de glace mêlée avec du sel marin; & si on les éprouve ainsi préparées, on trouve qu'elles ont un froid d'environ 24 degrés, & qui par conséquent est à celui de 1709, comme 12 à 7.

Si l'on refroidit le mélange encore davantage, on produira de plus grands degrés de froid, lesquels cependant iront toujours en décroissant. Mais ce sel marin si supérieur au salpêtre dans le

cas dont il s'agit , ne communique pas cette supériorité à son esprit , fort inférieur à celui de nitre. C'est encore une bisarrerie de même espece que le froid causé par l'esprit de vin , qui semble n'être qu'un feu liquide , & qui employé précisément comme l'esprit de nitre , en égale presque la force pour la congélation artificielle.

Comme elle n'arrive qu'au moment que le mélange fait fondre la glace , il s'ensuit , 1^o. Que dans chaque opération , ce moment est celui du plus grand froid ; 2^o. Que plus la fonte de la glace sera prompte , plus le froid sera grand ; ce qui seroit souhaiter , que cette fonte pût être instantanée. Mais toujours sera-t-elle d'autant plus prompte , que la glace & le sel seront plus atténués ; d'où n'aît une regle à peu près pour déterminer la dose du sel relativement à la glace , & cette dose doit être considérablement plus forte , que la quantité de chaque sel qui peut être fondue par une certaine quantité d'eau. La meilleure dose pour le sel marin une fois trouvée , sera connoître celle des autres sels dis-

solubles à l'eau en moindre ou en plus grande quantité.

Les liqueurs capables , comme les sels , de produire du froid , exercent leur action avec plus de facilité que les sels ; elles pénètrent la glace en un instant , & l'attaquent vivement de toutes parts. Il est seulement nécessaire pour cette production du froid , que ces liqueurs se mêlent intimément avec la glace fondue , faute de quoi les liqueurs huileuses en fondant la glace , ne feront naître aucun froid nouveau.

Notre Auteur , après plusieurs expériences qu'il a faites pour apprendre quel degré de froid est nécessaire pour tuer certains insectes , en gelant les liqueurs qui font leur vie , a trouvé quelques espèces de chenilles qui gèlent à 7 ou 8 degrés du froid , & d'autres beaucoup plus petites & très-déliçates en apparence , qui en souffrent sans se geler 17 degrés , ou 3 degrés de plus que le froid de 1709 ; & par malheur ces dernières sont les plus communes , & causent le plus de ravage. On ne doit donc pas se consoler de la rigueur d'aucun Hiver par l'espé-

rance qu'il exterminera ces chenilles ; Cependant le sang de ces petits animaux , qui n'est en apparence qu'une liqueur aqueuse , devroit être fort susceptible de congélation ; au lieu que celui des grands animaux qui le paroît bien moins , l'est réellement beaucoup plus : ce sont-là des faits , mais dont la cause ne paroît pas facile à expliquer.

Par M. de Reaumur, Journal des Sçavans , Mars 1738. pag. 147.



ARTICLE XXIV.

Observations physiques sur la nature, l'usage & les propriétés des cinq Sens.

L'Œil étant d'une délicatesse extrême, est à couvert de plusieurs accidens par le mouvement rapide de la paupiere, qui en le couvrant aussi pendant le sommeil, le fait reposer de ses fatigues. Un petit cartilage en forme d'arc borde les paupieres, afin qu'elles s'ajustent mieux sur l'œil : pour que l'air ne seche pas trop la membrane extérieure de l'œil, il y a quelques glandes qui y versent toujours une liqueur, laquelle, pour éviter que l'œil ne paroisse couvert de larmes, se décharge dans les narines. Il faudroit tourner à tout moment la tête pour voir les différens objets, si par plusieurs muscles l'œil ne pouvoit pas se tourner avec une rapidité prodigieuse; à quoi ne contribue pas peu la rondeur de l'œil même, qui est plat.

cé dans une cavité ronde , & dont le fond est entouré de graisse. Pour donner une idée de ce qu'il y a de merveilleux dans l'œil même , il faut de nécessité poser quelques regles d'Optique.

La lumiere qui part d'un corps lumineux venant à frapper un point d'un objet , en est réfléchiée de tous côtés ; & ces rayons de lumiere qui forment comme une Sphère , s'éloignent les uns des autres à proportion de l'espace qu'ils parcourent : c'est ce qu'on nomme rayons divergens : par là chaque point d'un corps est visible à un œil qui se trouve dans cette sphère. Mais les rayons qui partent de chaque point , couvrent toute la prunelle , qui est l'ouverture par où la lumiere entre dans l'œil , où ces rayons mêlés ne peuvent produire que de la confusion.

On sçait d'ailleurs que pour la vision , il faut que tous les rayons qui partent d'un même point d'un objet , se réunissent dans un même point sur le fond de l'œil , pour y former une représentation exacte des objets que l'on voit. Pour parvenir à ce but , le
sage

sage Auteur de la Nature a assujetti la lumiere aux loix de la réfraction.

Par ces loix, un rayon qui passe d'une matiere transparente dans une autre, s'il tombe obliquement sur la surface qui sépare ces deux matieres, se rompt, & s'écarte de sa route si ces matieres ne sont pas également subtiles; s'il passe de la plus subtile ou plus rare, dans la plus grossiere ou plus dense, il s'approche de la perpendiculaire, qui dans le point où le rayon passe d'une matiere à l'autre, tombe sur la surface qui sépare ces matieres. Le contraire arrive quand la lumiere passe d'une matiere plus épaisse dans une plus subtile, qu'on appelle passer d'un *milieu dense* dans un plus *rare*.

La suite de ces loix sont, que des rayons divergens tombant sur une superficie convexe d'un milieu plus dense, deviennent *convergens*, c'est-à-dire tendants à un même point, ou du moins ils deviennent moins *divergens*. La même chose arrive, quand les rayons tombent sur une superficie concave d'un milieu plus rare; & dans les deux cas, les rayons *convergens* de-

viennent plus *convergens* , c'est-à-dire tendans à un point plus proche.

Par ce qu'on vient de dire , on rend raison de ce qui arrive dans une chambre obscurcie , à laquelle on laisse un petit trou d'un côté dans lequel on met une loupe de verre. Les rayons qui , partant d'un même point d'un objet , couvrent toute la superficie convexe du verre , passant de l'air dans le verre qui est plus grossier , se rompent & tendent à se réunir : tombant de là du côté concave sur la superficie qui de l'autre côté sépare le verre de l'air , ils sont rompus de nouveau , & viennent se réunir dans un point plus voisin. Ceci arrive à l'égard des rayons qui viennent de chaque point de l'objet ; & si l'on met une feuille de papier , ou quelqu'autre chose de blanc dans l'endroit où se fait cette réunion , on y verra l'objet renversé , peint fort distinctement avec toutes ses couleurs.

La constitution de l'œil est entièrement propre à mettre à profit ces mêmes loix de la lumiere. Il a les mêmes propriétés qu'une chambre obscure. Pour en être persuadé , on n'a qu'à ôter la chair & la graisse de

l'œil d'un veau fraîchement tué ; que par derriere on fasse dans la membrane extérieure une ouverture ronde de la largeur d'un doigt ; qu'ensuite on mette devant cet œil une chandelle , & que d'ailleurs la chambre soit obscure : l'on verra par l'ouverture mentionnée : la peinture renversée de la chandelle ; cette peinture deviendra plus grande ou plus petite , à mesure que la chandelle s'en approche ou s'en éloigne.

Pour que les rayons passent jusqu'au fond de l'œil , il faut que les membranes en soient transparentes ; ce que les autres membranes du corps ne sont pas.

Celle qui entoure l'œil entièrement , n'est transparente que dans la partie où elle doit recevoir la lumière ; & cette partie transparente est appelée *Cornée* , à cause de sa ressemblance avec de la corne extrêmement claire. Si après avoir passé par la *cornée* , les rayons entroient de nouveau dans de l'air , ils ne s'uniroient pas dans un point sur le fond de l'œil ; c'est pour cette raison qu'ils sont obligés à une réfraction nouvelle en entrant dans

une liqueur claire & transparente comme de l'eau , plus grossiere que l'air , & placée d'une maniere convexe,

Cette réfraction ne suffit pas encore ; elle n'assembleroit les rayons que bien loin derriere le fond de l'œil : c'est pour cette raison qu'après l'humeur aqueuse on trouve la crySTALLINE qui , transparente & convexe comme l'autre , est plus grossiere , & qui par conséquent force les rayons à s'approcher davantage ; encore ne se rassemblent-ils pas par ce moyen dans un point sur le fond de l'œil , & par conséquent ils y peindroient les objets avec confusion , comme il arrive quand dans une chambre obscure on approche trop le papier du côté du verre par où les rayons passent.

Pour prévenir cette confusion dans la vûe , les rayons sont obligés à une réfraction nouvelle, en tombant sur la superficie concave qui sépare le *crystallin* de l'*humeur vitrée* , qui , semblable à du verre fondu , ou suivant d'autres , à du blanc d'œuf , est plus subtile que la crySTALLINE. Cette dernière humeur est fort convexe du côté de l'*humeur vitrée* & du fond de l'œil ; ce

qui rend d'autant plus concave la superficie sur laquelle tombent les rayons qui viennent de l'autre côté, & qui sont déjà entrés dans le crystallin. C'est par tant de réfractions que les rayons *divergens*, venant d'un même point, se réunissent enfin dans un point sur le fond de l'œil.

Malgré cette constitution merveilleuse d'un organe si utile, nous ne pourrions voir les objets que d'une certaine distance déterminée, si par le moyen de six muscles l'œil ne pouvoit se rendre plus ou moins convexe. L'expérience fait voir que les rayons passant par un verre plus plat, se rejoignent plus loin du verre que ceux qui passent par un verre plus convexe. Passons à l'ouïe qui ne nous fournit pas moins de merveilles à admirer.

Le son ou l'air ému s'étant assemblé dans la première cavité de l'oreille, ne parvient à la membrane du tambour, qu'après avoir passé par un tuyau qui augmente la force du son, comme on le voit arriver dans une trompette parlante & dans une petite corne, qui appliquée aux oreilles des sourds, facilite leur ouïe.

L'air frappant la membrane du tambour, & la faisant trembler, elle communique ce tremblement à quatre petits os qui la touchent, & à un petit nerf qui la traverse, à peu près comme la corde qui est au-dessous d'un tambour militaire. Par le tremblement de ces petites parties, & par celui de l'air qui est dans la cavité du tambour, le son se communique au labyrinthe, & du labyrinthe au nerf auditif.

Les petits os qui servent à l'ouïe, sont également grands dans les enfans nouveaux nés & dans les personnes âgées, afin que cet organe osseux soit de la même manière dans les uns & dans les autres. Mais comme il y a dans cet organe des parties qui sont entièrement semblables dans tous les âges, parce que l'utilité le demandoit, il y en a aussi d'autres qui pour la même raison varient dans les différens âges. Dans les personnes d'âge le tuyau de l'oreille est ouvert, & la membrane du tambour est sèche & étendue. Dans les enfans nouveaux nés ce tuyau est étroit & fermé de quelque matière, afin qu'avant leur naissance

l'humour dans laquelle ils nagent, touchant à la membrane du tambour, ne la relâche pas, & ne la rende pas inutile. Peu de jours après qu'ils sont nés cette matiere se détache d'elle-même peu à peu, afin qu'ils s'accoutument insensiblement à l'ouïe des sons.

Les sentimens ont été partagés sur la cause du goût; les uns l'ont trouvée dans la membrane de la langue, les autres dans les nerfs qui y sont répandus. *Malpighius*, suivi en cela de presque tous les Modernes, l'attribue à des éminences qu'on nomme *papillaires*, placées non-seulement à la surface de la langue, mais encore dans le palais. On a beau avoir fait cette découverte, & connoître très-exactement ces instrumens du goût, il est certain qu'on ne tireroit jamais de là une idée de la maniere dont on est affecté par le goût; preuve évidente que c'est non-seulement un être sage, mais d'une sagesse fort supérieure à la nôtre, qui a fait ces organes merveilleux. Passons à l'odorat.

Quoique l'os du front soit d'une dureté extrême, les nerfs de l'odorat se

subdivisant en plusieurs petits rameaux , passent par une partie de l'os percée de plusieurs petits trous comme un tamis. Une chair papillaire couvre & bouche ces petits trous ; & c'est vrai-semblablement sur les rameaux de ces nerfs , & sur cette chair papillaire , que les particules qui sortent des corps odoriférans font l'effet qu'on nomme odorat.

Que les instrumens de l'odorat soient situés dans les parties supérieures du nés , cela paroît en ce que pour sentir, on a besoin de quelque respiration , qui force l'air mêlé des parties odoriférantes à entrer dans la cavité du nés , lequel ne pouvoit jamais être placé d'une manière plus avantageuse , que dans l'endroit où l'air passe continuellement. Ce nés est large par en bas , pour contenir un plus grand nombre de parties odoriférantes , & plus étroit par en haut , afin que ces parties plus serrées affectent plus fortement les organes de l'odorat.

Un autre sens plus général que les autres , c'est le *tact* , qui est la fa-

culté de découvrir par l'attouchement l'inégalité des corps , leur fluidité , leur solidité , &c. Cette faculté est placée dans la peau , plus exposée aux attouchemens que les autres parties du corps. Elle a pour siege des *mammelons* semblables à ceux de la langue , qui s'élevant sur la surface de la peau , comme de petites éminences pyramidales , s'étendent jusqu'à la surpeau qu'on nomme *Epiderme*. Il est d'autant plus évident que le *Tact* réside dans ces petites éminences , que les bouts des doigts & la paume de la main , qui servent le plus à distingner les objets , ont un nombre beaucoup plus grand de ces petits *mammelons* , que le reste du corps.

Par M. de Nieuwentyt , Journal de la Haye pour l'année 1716. premiere partie , page 178.



ARTICLE XXV.

*Exposition d'un Système singulier
sur la Vision.*

A Proprement parler, l'objet de la vûe est uniquement la lumière & les couleurs. Avec de simples couleurs, un Peintre peut nous représenter tous les objets visibles. Nous ne voyons donc lorsque nous jettons les yeux sur ce vaste Univers, que ce que nous voyons quand nous regardons des Tableaux, c'est-à-dire, des couleurs. Telle est la destination du sens de la vûe; mais par une espece de surérogation, on le fait servir à juger de la distance, de la grandeur, & de la situation des corps.

On juge, dit-on, de la distance par la grandeur de l'angle compris entre les deux axes optiques, qui traversant les deux yeux par le milieu, vont aboutir à un même objet. Si cet angle est fort grand, nous voyons l'objet

fort proche ; s'il est fort petit , l'objet nous paroît fort éloigné. Ajoutez encore la divergence des rayons qui tombent sur la prunelle , divergence qui est d'autant plus grande , que l'objet est plus près de l'œil.

Le célèbre *Berkeley* , Auteur du Systême que nous allons exposer , rejette cette opinion ; 1°. Parce que certainement l'ame ne s'apperçoit pas de la grandeur de cet angle , & de la divergence des rayons. En vain, dit-il, tous les Mathématiciens du monde m'assureroient-ils que je connois certaines lignes & certains angles , qui portent dans mon esprit l'idée de la distance des objets ; ils ne me persuaderont pas tant que je me ferai témoin à moi-même que je n'ai aucune idée de ces choses. 2°. Parce que ces lignes & ces angles n'ont aucune existence réelle , mais ne sont qu'une simple supposition des Géometres , par eux introduite dans l'Optique , pour avoir lieu d'appliquer leurs principes à cette science. 3°. Parce que tous ces principes , quand on en accorderoit la réalité , ne suffiroient pas pour expli-

quer tous les cas , & en particulier , le suivant.

Si nous jugeons que les objets sont d'autant plus éloignés , que les rayons qui tombent sur la prunelle sont moins divergens , ou que l'angle des axes optiques est plus petit , quand ces rayons ou ces axes seront infiniment peu divergens , c'est-à-dire parallèles , nous jugerons l'objet infiniment éloigné , ou du moins à une distance qui n'a plus de proportion sensible avec la grandeur de notre prunelle , ou l'espace entre les deux yeux. Mais à quelle distance jugerons-nous l'objet si ces rayons sont convergens ; ce qu'on peut faire par le moyen des verres convexes ou des miroirs concaves ? Les croirons-nous plus qu'infiniment éloignés ? Cela seroit absurde ; & d'ailleurs l'expérience témoigne qu'alors l'œil juge l'objet très-proche , & d'autant plus proche , qu'il est réellement plus éloigné , & que les rayons tombent sur l'œil plus convergens.

L'ame , selon l'Auteur cité , se sert d'autres moyens pour connoître la distance des objets. Il met au pre-

mier rang la disposition des yeux , qui tournés tous les deux vers le même objet , laissent entre les deux prunelles un intervalle d'autant plus petit , que l'objet est plus proche. Cette position des yeux est connue de l'ame , qui s'apperçoit de tous les mouvemens volontaires de son corps. 2. Le second moyen est la confusion de la peinture de l'objet. Un œil bien fait réunit exactement sur la rétine les rayons paralleles ou peu divergens , qui tracent ainsi au fond de l'œil une image distincte des objets éloignés. Mais plus l'objet s'approche , & moins exacte est la réunion des rayons qu'il envoie , plus est confuse l'image qui s'en peint sur la rétine. 3. L'œil n'est pas inflexible ; il peut changer sa figure , enforte que l'image qui sans cela eût été confuse , devient distincte : c'est par cet artifice admirable que nous pouvons voir assez distinctement les objets proches , aussi-bien que les objets éloignés ; & ce changement de figure de l'œil sensible à l'ame , & proportionné à la distance de l'objet , est le troisiéme moyen que l'ame employe pour juger de la dis-

tance. L'ame ne fait pas attention distinctement à ces trois choses ou à ces trois moyens, pour en conclure par un raisonnement formel, que l'objet est à tel ou tel éloignement; mais elle en juge uniquement par habitude, fondée sur une expérience constante & uniforme, qui lui apprend que telle disposition des yeux, & tel degré de distance dans la peinture, est ordinairement jointe avec telle distance de l'objet.

La confusion de la peinture au fond de l'œil peut venir de deux causes: ou de ce que les rayons qui partent d'un seul point de l'objet, tombant trop divergens sur la cornée, ne peuvent pas être assez rompus par les humeurs de l'œil, pour se réunir en un seul point sur la rétine, mais y font une tache, là où ils ne devroient peindre qu'un point; c'est là le cas des objets vûs de trop près; ou bien aussi de ce que les rayons tombent convergens sur la cornée, & se réunissent avant que d'atteindre la rétine. Car se croisant en ce point de réunion, ils sont au-delà divergens, tombent sur divers points de la rétine, & y peignent une tache au lieu d'un point, tout comme

dans le cas précédent. Ils produisent par conséquent la même sensation. Mais ce dernier cas n'étant pas possible dans la vision directe, c'est-à-dire, quand on n'emploie ni miroir, ni lunettes, l'ame est accoutumée à joindre l'idée de la confusion de l'image avec celle de la proximité de l'objet : ainsi quand ce cas arrive, l'ame ne considérant point que cette confusion de l'image vient d'une cause différente, juge à son ordinaire que l'objet est trop proche de l'œil ; & comme dans la vision directe l'objet est peint d'autant plus confusément qu'il est plus proche, l'ame attache constamment l'idée d'une moindre distance avec celle d'une plus grande confusion : par conséquent quand on voit un objet à travers un verre convexe, on le juge d'autant plus proche qu'il est plus éloigné, parce que plus il s'éloigne, plus l'image en est confuse, jusqu'à ce qu'à une certaine distance elle devient si confuse, qu'on ne sçait plus ce qu'on voit.

Il s'ensuit de ces principes, que l'objet immédiat de la vue n'est qu'une idée, qui n'est pas hors de l'esprit,

Car cet objet immédiat, comme nous l'avons dit d'abord, n'est que la lumière & les couleurs, que tout le monde convient à présent n'être que des sensations. Il en de même de l'étendue, telle que nous-l'appercevons par le moyen des yeux : elle est vûe au même lieu que les couleurs, elle leur est intimément jointe, & notre esprit même ne peut l'en séparer, & concevoir une couleur sans étendue ; donc cette étendue visible n'a point d'autre existence que les couleurs, elle n'est rien non plus qu'elles hors de l'esprit.

Pour rendre cela plus sensible, on demande de quelle Lune on parle, quand on dit que la Lune est éloignée de nous de soixante demi-diametres de la terre. Il est manifeste que ce n'est pas de la Lune visible, qui n'est qu'un petit disque rond, lumineux, d'environ trente minutes de diametre. Car si je m'avance vers la Lune, quand j'aurai fait le chemin de soixante demi-diametres de la terre, je serai bien éloigné d'être proche d'un tel disque lumineux ; il y aura long-tems qu'un tel objet sera évanoui. Ce n'est donc

pas

pàs la Lune visible qui est à cette distance de nous ; c'est la Lune *tangible* ou maniable , la Lune telle que nous la feroit connoître le sens du toucher : ainsi quand on dit qu'on voit un objet à une certaine distance , on ne veut dire autre chose , sinon que la vûe apprend , qu'après avoir fait un certain chemin , on viendra à recevoir par le sens de l'atrouchement une certaine idée , qui est constamment liée avec l'idée visible de cet objet. Mais dans le fond , la liaison de ces deux idées n'est pas nécessaire. Les Tableaux & les Miroirs suffisent pour en convaincre.

Il est vrai qu'une longue habitude nous a accoutumés à joindre si intimement les deux idées que nous recevons d'un objet par le moyen de ces deux sens , la vûe & le toucher , qu'il est difficile de ne les pas confondre. Ce qui contribue encore à nous faire prendre l'une pour l'autre , c'est que si l'on dit que l'étendue ou que la figure visible est différente de l'étendue , ou de la ligne maniable , il semble qu'il en suivroit de cette absurdité , qu'une

seule & même chose auroit deux ou plusieurs étendues, deux ou plusieurs figures. Mais si l'on y fait mieux attention, on verra qu'on ne peut conclure autre chose, sinon que l'objet de la vûe & celui du toucher sont deux choses différentes, quoique désignées dans toutes les langues par le même nom.

Ainsi pour éviter tout équivoque, il faut dire qu'il y a deux sortes d'objets que la vûe nous fait connoître; les uns immédiatement, & les autres par le moyen des premiers. Les objets propres de la vûe ne sont point hors de notre esprit, ni éloignés; la perception en peut être plus grande, plus petite, plus distincte, plus confuse, plus claire, plus obscure, plus forte, plus foible; mais nous ne pouvons ni nous en approcher, ni nous en éloigner. Quand nous disons qu'ils sont à quelque distance de nous, nous parlons des objets de la seconde sorte, qui sont les objets maniables, qui n'ont rien de commun que le nom avec les objets visibles, quelque peine qu'un long préjugé, enraciné dès l'enfance

dans notre esprit, nous donne à les distinguer.

Le jugement que nous faisons de la grandeur des objets, est semblable à celui que nous faisons de leur distance. Les Mathématiciens veulent que l'ame en juge par la grandeur de l'angle visuel comparée avec la distance : supposition fautive, selon notre Auteur, puisque chacun peut s'assurer par sa propre expérience, qu'il ne pense à rien moins qu'à cet angle visuel quand il apperçoit la grandeur d'un objet. La grandeur est vûe aussi immédiatement que la distance, sans que l'une serve de principe dans un raisonnement dont l'autre est la conclusion.

Pour éclaircir tout cela, il faut en revenir à la distinction des objets visibles & maniables. Selon la différence de ces deux sens, il y a aussi deux sortes de grandeurs, qui l'une & l'autre sont composées de points en nombre fini. Quoi qu'on puisse dire de l'étendue abstraite, il est certain que l'étendue sensible n'est pas divisible à l'infini : il y a un *minimum tangibile*, & un *minimum visibile*, au-dessous duquel

les objets cessent d'être sensibles. Les objets les plus petits qu'on puisse voir ou toucher, sont le point visible, & le point maniable. Nos sens n'y découvrent aucune partie ; la grandeur, soit visible, soit maniable d'un objet, est le nombre des points visibles ou maniables qui le composent. Il y a cette différence entre ces deux grandeurs, que la grandeur maniable est constante, au lieu que la visible varie incessamment, selon la distance où nous sommes de l'objet.

Les mesures par lesquelles nous déterminons la grandeur des objets, les pieds, les pouces, &c. ne sont pas des grandeurs visibles, mais maniables : car un pouce visible couvrira & conviendra entièrement avec un pied visible placé à une distance douze fois plus grande de l'œil, & paroîtra égal à une toise visible placée soixantedouze fois plus loin ; au lieu qu'un pied maniable est toujours douze fois plus grand qu'un pouce maniable.

A proprement parler, la vûe n'est qu'une espece de toucher plus fin &

plus délicat , qui nous avertit de loin , & avant le toucher véritable , de l'effet que les objets peuvent produire sur nos corps , qui nous fait prévoir le bien ou le mal que nous en pouvons attendre.

Mais comment le sens de la vûe nous fait-il découvrir la grandeur maniable d'un objet ? Par trois moyens. 1^o. La grandeur visible. 2^o. La confusion de l'image ou de l'apparence visible. 3^o. La force & la clarté de cette apparence. Plus l'image de l'objet peinte sur notre rétine est grande, plus elle est distincte , plus enfin elle est foible , plus nous jugeons que l'objet est grand.

Notre Auteur convient que tout cela n'a point de liaison nécessaire avec la grandeur de l'objet. Selon lui , c'est uniquement l'expérience qui nous informe de cette connexion. Ayant vu dès l'enfance que le plus de grandeur maniable est toujours joint avec le plus de grandeur visible , le plus de distinction , & le moins de force & de clarté dans l'apparence de l'objet , nous joignons enfin naturellement l'u-

ne avec l'autre sans pouvoir plus les séparer.

Il répond aisément par-là à cette fameuse question qui a tant occupé les Philosophes, pourquoi la Lune à l'horison paroît plus grande qu'au Méridien. C'est que ses rayons ayant à traverser pour venir à nos yeux une plus grande épaisseur de l'atmosphère, quand la Lune est à l'horison, que quand elle est au Méridien, la peinture qui s'en trace au fond de notre œil est moins vive, & par conséquent nous sommes naturellement portés à juger la Lune plus grande, & d'autant plus grande, que l'air sera plus épais & plus chargé de vapeurs; ce qui est confirmé par l'expérience.

Suivant ces principes, notre Auteur conclut qu'un aveuglé né, quand on lui rendroit la vûe, ne jugeroit pas comme nous de la grandeur maniable des objets par leur grandeur visible. Dans ses idées, les objets visibles seroient égaux, qui contiendroient un égal nombre de points visibles. Son pouce lui paroîtroit aussi grand que la tour qu'il pourroit cacher à sa vûe.

La perfection de la vûe consiste à saisir le plus grand nombre de points visibles, & à les voir tous en même-tems avec la plus grande clarté & distinction. L'imperfection de la vûe au contraire, est de ne voir à la fois qu'un petit nombre de points, & de ne les appercevoir qu'avec obscurité & confusion. Le Microscope, qui amène pour ainsi dire sous nos yeux un nouveau monde, ne perfectionne cependant la vûe à aucun de ces deux égards : il change seulement la scene du monde visible avec cette différence, que la relation des objets vûs à l'œil & des objets maniables nous instruit du rapport qu'ils ont avec notre corps, nous apprend s'il faut les rechercher, ou les fuir ; au lieu que la relation qu'il y a entre les objets vûs avec le microscope & ces mêmes objets maniables, ne peut rien nous apprendre qui nous soit aussi important. Il n'y auroit donc rien à gagner si nos yeux étoient changés en microscopes, ou plutôt il y auroit infiniment à perdre.

Quant à la situation des objets, on

demande pourquoi la peinture qui s'en fait au fond de notre œil étant renversée, nous les voyons debout ? La réponse ordinaire est, que l'ame jugeant du lieu des objets par l'impression qu'ils font sur l'œil, remonte, pour ainsi dire, jusqu'aux objets, suivant la direction des rayons par le moyen desquels elle les voit. Ainsi elle suit la direction des rayons qui agissent sur la partie supérieure de l'œil, & comprend qu'ils aboutissent à la partie inférieure de l'objet, & juge de même que les rayons qui tracent une image au bas de l'œil, viennent du haut de l'objet.

Notre Auteur rejette cette explication par les mêmes raisons, qui l'ont ci-dessus obligé à s'écarter de la route commune : il en appelle à la conscience d'un chacun, s'il est vrai qu'on pense à la direction des rayons ; qu'on fasse attention à ce qu'ils se croisent : s'il est vrai-semblable qu'un idiot, qu'un enfant ait quelque idée de tout cela ; outre que cette explication suppose que les objets visibles sont hors de nous, contre ce qu'il prétend avoir démontré.

On

On dit que nous avons par le moyen des sens de la vûe & du toucher, l'idée de l'étendue abstraite, & l'on entend par cette idée abstraite, une idée de l'étendue dépouillée de toutes les qualités sensibles, visibles ou maniables. L'étendue abstraite n'est, dit-on, ni blanche, ni noire, ni d'aucune couleur; ni dure, ni molle, ni fluide; elle n'a aucune qualité, aucune grandeur, aucune figure, aucune borne déterminée.

M. Berkeley prétend que cette explication seule de ce qu'on entend par le mot d'étendue abstraite, suffit pour prouver plus clair que le jour, que jamais cette idée n'est entrée dans l'esprit d'aucun homme.

L'on dit communément que l'étendue abstraite est l'objet de la Géométrie; que lorsqu'on démontre, par exemple, quelque propriété du triangle abstrait, on doit concevoir un triangle abstrait, qui n'est ni rectangle, ni obtusangle, ni acutangle, ni équilatéral, mais tout cela ensemble.

Il répond, que s'il faut concevoir

Tome II.

H h

un tel triangle, il ne fera jamais Géometre, puisqu'il ne trouve pas dans son esprit la faculté de former une telle idée.

Les idées abstraites & générales du toucher & de la vûe étant ainsi rejetées, reste à sçavoir, s'il n'y a point d'idée particulière commune aux deux sens. L'Auteur prétend que non, par diverses raisons. 1. Quand je range une idée nouvelle sous une certaine classe d'idées sensibles, c'est qu'elle a quelque rapport, quelque ressemblance, quelque chose de commun avec les autres idées que j'ai déjà attribuées à un sens particulier. Or un ayeugle, né qui recevrait tout d'un coup la faculté de voir, ne trouveroit aucun rapport, rien de commun entre les idées qu'il auroit subitement alors, & les idées qu'il avoit auparavant acquises par le sens du toucher. 2. L'objet propre de la vûe est la lumière & les couleurs; or ces objets ne se font pas appercevoir au sens du toucher. 3. Les grandeurs de mêmes especes peuvent s'ajouter ensemble, & former une somme. Qu'on essaye

donc si l'on pourra, même par pensée, ajouter une ligne visible à une ligne maniable , une surface bleuë à une surface polie , & l'on apprendra à distinguer ces diverses especes, par l'impossibilité que l'imagination trouvera à les joindre.

Que si l'on demande pourquoi les objets visibles & les objets maniables ont dans toutes les langues le même nom , si ce sont dans le fond deux choses entierement différentes l'une de l'autre ; c'est , 1^o. Parce qu'elles ont entr'elles une relation constante, quoiqu'arbitraire. 2^o. Parce que les idées visibles sont des signes & des représentations des objets maniables , comme les mots qui sont des signes des choses , n'ont pas un nom différent des choses mêmes. 3^o. Parce que la considération des idées visibles étant peu intéressante , si ce n'est à cause du rapport qu'elles ont avec les objets maniables , on n'a pas jugé nécessaire de les désigner par des noms différens.

On objectera encore, qu'une sphere visible est plus propre qu'un cube visi-

ble à représenter une sphere maniable , parce qu'elle lui ressemble davantage : car la circonférence d'une sphere, tant visible que maniable , est uniforme , au lieu que celle du cube a des angles & des différens côtés les uns des autres. L'Auteur convient qu'un sphere visible est plus propre qu'un cube à représenter une sphere maniable ; mais il nie qu'avec cela elle lui ressemble. Il en est , dit-il , comme des lettres qui représentent les sons , sans leur ressembler. L'assemblage des lettres du mot *Colosse* est plus propre à représenter le son que forme un François quand il prononce ce mot , que l'assemblage des quatre lettres *Nain* , parce qu'il y a autant de lettres dans ce mot *Colosse* , que de sons dans sa prononciation , & que la même lettre est répétée deux fois dans l'un , comme le même son deux fois dans l'autre , & dans le même ordre. On ne dira pas cependant que le son de ces sept lettres ressemble aux sons qu'il désignent.

On jugera sans doute que l'Auteur est un de ces génies singuliers , qui

cherchent partout l'extraordinaire & le merveilleux ; on découvrira sans peine dans son systême , les principes & les semences du systême bizarre de l'idéalisme qu'il a embrassé. On peut même entrevoir quelle suite de réflexions & de conséquences l'a mené là. D'abord il ne diffère des sentimens ordinaires , que par des façons de parler. Les expressions communes lui paroissent peu propres ; il en substitue d'autres , qui lui paroissent plus exactes. Puis pressant la force des termes , il se jette dans des propositions , qu'on ne lui accordera qu'après des explications favorables : continuant dans le même goût , il s'éloigne toujours de plus en plus , jusqu'à ce qu'il se trouve entierement opposé aux idées les plus généralement reçues, & les plus saines.

Par M. Berkeley , Bibliotheque Italique , Tome XIII. page 184.



ARTICLE XXVI.

Propriétés singulières d'un Microscope extraordinaire nouvellement inventé.

DE tous les organes des sens , il n'y en a point qui nous fournisse à moins de frais plus d'idées , que l'organe de la vûe. Par nos autres sens , les idées n'entrent presque qu'une à une : il faut des efforts d'imagination & de mémoire pour en considérer plusieurs comme présentes à la fois , & pour faire ces comparaisons d'idée à idée , sans lesquelles il est impossible de posséder ni de perfectionner aucune science ; au lieu que par la vûe , l'esprit opere avec beaucoup moins de fatigue & plus de succès. Il saisit d'un coup-d'œil des systêmes entiers d'idées , accompagnés encore d'une grande variété d'idées accessoire , qui font connoître les relations d'un

objet principal à mille choses qui l'environnent ; & tout cela , tant que les objets subsistent , demeure présent à l'esprit comme à l'œil , aussi long-tems qu'il plaît à l'Observateur. Par-là l'imagination & la mémoire n'ayant presque rien à faire , le jugement exerce ses fonctions avec une entière liberté , & la raison se satisfait ; de sorte qu'on peut dire que tout ce qui retrécit ou élargit la sphere de notre vûe , retrécit ou élargit par cela même la sphere de notre entendement. Ajoutons que si on fait attention à l'infinie diversité de la nature , on trouvera que nous avons la vûe naturellement très-bornée , puisqu'on sçait par expérience qu'il y a un nombre prodigieux d'objets qui échappent à l'œil par leur petitesse , & qu'il n'y en a point qui ne puissent nous devenir invisibles par leur éloignement.

Pour reculer les bornes de notre vûe , & donner ainsi un champ plus vaste à l'exercice de notre esprit , l'invention des Télescopes a été d'un grand secours , & les Microscopes ont eu à leur maniere le même usage. On

a porté les uns & les autres à un tel degré de perfection , que nous voyons à présent des objets 600 fois plus éloignés, & des objets mille fois plus petits, que les plus petits & les plus éloignés qui pussent être autrefois apperçûs par l'œil le plus perçant de l'antiquité. Mais quand on ne fait ces instrumens qu'imparfaitement , comme cela s'est constamment pratiqué jusqu'à M. Newton pour les télescopes , & jusqu'à l'année 1736 pour les microscopes , les uns & les autres sont sujets à de tels inconvéniens , (vû la différente réfrangibilité des rayons) qu'afin de les rendre propres à produire l'effet que nous venons de dire , il faut prendre pour les premiers des segmens de sphares extrêmement grandes , & pour les seconds des sphares extrêmement petites ; ce qui fait naître de nouveaux inconvéniens.

A l'égard des inconvéniens attachés aux télescopes dioptriques , l'on sçait que l'on y a remédié par les télescopes à réflexion, dont on doit à M. Newton la première idée. Mais à l'égard des microscopes , il ne sera pas hors de

propos de remarquer au moins , que l'extrême petitesse qui est requise dans le verre objectif , par la raison que nous avons indiquée , obligeant d'approcher l'objet fort près du verre , il s'ensuit de-là ,

1^o. Que l'objet se trouvant obscurci par l'instrument , il n'est presque plus visible que par la lumière à laquelle il donne lui-même passage ; & que ce qui devoit l'éclairer est plutôt éclipsé par lui , qu'il n'est éclairé par elle.

2^o. Que par la même raison , lorsque l'objet est trop diaphane , on ne le discerne que très-imparfaitement ; & lorsqu'il est opaque , on ne le voit point du tout : on se trouve borné par conséquent à un certain ordre d'objets.

3^o. Qu'il faut encore que l'objet , pour pouvoir être mis dans l'instrument , soit très-petit ; de sorte que si on veut observer les parties d'un corps un peu volumineux , on est réduit à commencer par les détacher de leur tout ; ce qui fait beaucoup de peine dans la dissection des cadavres , & qui dans la dissection des animaux vi-

vans , est absolument incompatible avec le but des Anatomistes.

Comme ces divers inconvéniens résultent de la petitesse du verre objectif, & que la nécessité de l'avoir si petit est uniquement fondée sur la *dioptricité* de ce même verre, il semble que naturellement on auroit dû penser depuis long-tems aux moyens d'employer pour objectif un verre concave, capable de réfléchir une image vive & nette de l'objet vers l'oculaire, & de faire ainsi un microscope à réflexion. Aussi voyons-nous que l'idée d'un pareil microscope n'avoit pas tout à fait échappé à la pénétration de M. Newton; au moins paroît-il par les Mémoires dont il parle dans la Préface de la première Edition de son Optique, » qu'il avoit quelquefois » songé à faire un microscope, qui au » lieu d'un verre objectif, auroit un » miroir concave de métal. Car les » microscopes, disoit-il, semblent » être aussi propres que les télescopes » à recevoir un nouveau degré de » perfection. Peut-être même y sont-ils encore plus propres, puisqu'il n'y

» faudroit , ajoutoit-il , qu'un seul mi-
» roir concave de métal , comme on
» peut voir par la figure ci-jointe ,
» où AB représente le miroir objec-
» tif , CD un verre oculaire , F leur
» foyer commun , & O l'autre foyer
» du miroir où l'on placera l'objet.

Mais pour peu qu'on y fasse atten-
tion , on s'appercévra bientôt qu'un
instrument conforme à cette idée se-
roit encore fort éloigné de suppléer
à tous les défauts des microscopes or-
dinaires.

1^o. L'image de l'objet réfléchie du
miroir AB au foyer F , ne pourroit l'y
représenter vivement & nettement ,
qu'à proportion que l'objet lui-même
seroit bien éclairé. Or il ne pourroit
l'être ici que de biais , par la lumière
qui passeroit dans l'espace laissé entre
lui & le miroir ; & par conséquent on
auroit toujours à se plaindre que l'in-
strument empêche l'objet d'être bien
exposé à la lumière.

2^o. Quoique l'on pût à l'aide d'un
pareil microscope observer des objets
plus diaphanes , & des objets plus opa-
ques que ceux qui sont observés par

les microscopes ordinaires , il resteroit toujours un nombre considérable d'objets visibles à l'observation desquels ce microscope seroit inutile , c'est-à-dire , tous ceux qui par leur fluidité ne sçauroient être fixés au foyer O , soit sur la pointe d'une aiguille , soit sur le revers d'une petite plaque enduite de quelque matiere gluante, soit par une petite pincette , qu'il faut supposer ici au bout d'une espece de branche , qui partant des bouts du miroir, viendrait aboutir en forme d'aiguille , ou de plaque , ou de pincette , au foyer marqué pour y assujettir l'objet.

M. Newton étoit en beau chemin ; mais il s'y est arrêté , séduit peut-être par cette idée (qui paroît lui avoir plû) qu'un microscope à réflexion ne devoit avoir besoin que d'un seul miroir , au lieu que réellement il en falloit deux , comme on le verra tout à l'heure. On pouvoit aller plus avant que lui ; mais personne jusqu'à présent ne l'avoit fait. L'honneur en étoit réservé à M. Barker , qui depuis quelques années a communiqué sa découverte

à l'Académie Royale de Londres , dont il est membre. Voici ce que c'est.

Soit A l'objet qu'on veut voir grossi , soit BB un miroir concave de métal , & D un autre miroir plus petit , dont la concavité soit opposée à celle du grand miroir BB : soit E une ouverture pratiquée au milieu de ce même miroir , & F une lentille plate convexe placée au-dessus de l'ouverture ; soit enfin la lentille H le verre oculaire.

Les rayons de lumière qui partiront de l'objet A , seront réfléchis par le grand miroir BB au foyer CC , où ils donneront une image renversée de l'objet ; & là les rayons se croisant , ils iront en divergeant tomber sur le petit miroir D , d'où ils seront réfléchis presque parallèles par l'ouverture E du grand miroir jusqu'à la surface plane de la lentille F , par laquelle lentille ils passeront en se rompant , & de laquelle ils viendront en convergeant de nouveau former en G une seconde image , qui étant l'image renversée de CC , sera par conséquent

l'image redressée de l'objet A ; & cette dernière image sera grossie par la lentille H , tout comme un microscope ordinaire grossiroit l'objet même , en supposant l'objet aussi près de l'œil , que l'est ici l'image ; de sorte que l'image tiendra lieu de l'objet , & l'objet sera observé dans son image , non-seulement à une distance considérable de lui-même , mais encore à une distance considérable de l'instrument ; ou du tuyau qui contiendra les différens verres & miroirs , dont l'instrument doit être composé. M. Barker compte que cette distance pourra être de huit pouces , de dix , & même d'un pied. Or tout cela posé , il est évident ,

En premier lieu , que l'objet pourra être exposé à tel jour & à tel degré de lumière qu'il plaira à l'Observateur.

En second lieu , que rien n'empêchera qu'on ne fasse des observations sur toutes sortes d'objets visibles : sur les plus diaphanes , parce qu'étant vûs par la lumière réfléchie de leurs surfaces , ils seront vûs distinctement ; sur les plus opaques , parce qu'ils recevront & renverront librement la

lumiere; sur les plus fluides, parce que demeurant hors du microscope, & le microscope étant mobile, on pourra les placer de la maniere qui leur conviendra le mieux, ou les prendre dans la place où ils se feront arrêtés d'eux-mêmes.

En troisiéme lieu, que par la même raison la nécessité ne subsistant plus de détacher les parties de leur tout, lorsque le tout est d'une certaine grandeur, on pourra observer la liaison même des parties, les considérer dans leur union, & voir distinctement dans les animaux qu'on ouvrira vivans le mouvement du sang, &c.

Par M. Barker, Biblotheque Britanique, Tome VII. page 428.



ARTICLE XXVII.

Explication de divers Phénomènes qui regardent les Miroirs ; construction d'un nouveau Miroir ; explication de ses propriétés ; nouvelles observations sur la multiplication des Images vûes dans un Miroir.

Parmi un très-grand nombre de belles propriétés des miroirs , il y en a d'assez difficiles à expliquer ; celles que nous allons examiner sont de ce nombre.

On demande premierement , d'où vient qu'on apperçoit au moins trois images d'une bougie allumée , lorsqu'on la regarde obliquement dans un miroir de verre plan.

Pour comprendre la raison de ce phénomène , il faut observer qu'il y a de trois sortes de superficies qui réfléchissent les rayons de lumière ; sçavoir ,

voir , la surface antérieure de la glace du miroir, celle qui est composée de vif-argent & d'étain , & les surfaces de l'air qui se trouve dans les pores de ce mélange. Cela supposé , il faut donc considérer ces trois surfaces comme trois plans qui réfléchissent la lumière jusques dans nos yeux , avec cette circonstance , que l'image la plus vive est toujours celle qui est produite par les rayons de lumière qui viennent dans l'œil , en se réfléchissant de la superficie du corps composé du vif-argent & de l'étain : celle qui est vûe par la réflexion de la surface antérieure de la glace est plus foible ; & celle qui se fait sentir par la lumière qui vient de la surface de l'air , l'est encore davantage.

On peut facilement prouver ces choses par des raisonnemens & des expériences incontestables. Que ce soit la surface du vif-argent qui cause la principale & la plus forte sensation d'une bougie allumée vûe dans un miroir de verre plan , on le prouve , 1°. En considérant que cette matière étant beaucoup plus pesante que celle du verre , ses parties doivent être plus

ferrées, & réfléchir par conséquent plus de rayons de lumière que la surface de la glace, & à plus forte raison, que celle de l'air subtil qui se trouve dans les pores du vif-argent & de l'é-tain.

Secondement, un verre plan convexe représente de nuit la flamme d'une bougie allumée beaucoup plus grosse qu'elle n'est vûe de nos yeux, lorsque ce verre est étamé du côté convexe, à cause que le vif-argent fait ici le même effet que la concavité d'un miroir d'acier.

Troisièmement, la même chose se prouve encore par le moyen d'un verre plan concave, puisqu'il fait voir l'objet plus petit, étant étamé du côté concave, à cause que le vif-argent fait l'office du miroir d'acier concave.

L'oculaire également convexe des deux côtés, qui n'est point étamé, prouve que l'air qui le touche immédiatement par derrière, cause une sensation de l'apparence de l'objet, puisqu'il fait voir deux représentations d'une bougie allumée, l'une petite, produite par sa surface antérieure, & l'autre plus grosse, représentée par la

surface concave de l'air, qui touche sa superficie postérieure.

Le verre plan des deux côtés, lorsqu'il n'est point étamé, fait voir la nuit deux images d'égale grandeur en la présence d'une seule bougie allumée, l'une produite par sa surface antérieure, & l'autre par l'air qui touche immédiatement sa postérieure.

C'est donc une chose constante suivant les expériences précédentes, que les miroirs de verre étamés qui sont plans des deux côtés, doivent représenter trois images en la présence d'une bougie allumée, si on y regarde un peu obliquement. Nous disons un peu obliquement: car si on regarde la représentation de la bougie par une ligne trop oblique à la superficie de certains miroirs, on l'y pourra voir représentée jusqu'à sept différentes fois; ce qu'on ne peut expliquer que par les diverses inégalités d'élévations, & les différens enfoncemens qui se trouvent aux surfaces de ces glaces: de quoi l'on peut s'assurer par l'observation qui se pratique dans les Manufactures des glaces, touchant la manière dont les Ouvriers s'y prennent pour les

polir, & par l'examen de plusieurs verres communs qui se trouvent chez les Vitriers.

Il arrive souvent qu'on ne voit dans un miroir ordinaire de verre, qu'une seule représentation d'une bougie allumée. Quand cela arrive, il faut qu'on l'y regarde perpendiculairement à la surface du miroir : car comme dans cette situation toutes les apparences des bougies se trouvent dans une même ligne, l'on n'en doit observer qu'une seule, laquelle doit nécessairement cacher les autres.

Il n'en n'est pas de même des miroirs d'acier : car comme la lumière ne pénètre pas leur surface, ainsi ne doit-il arriver dans l'oeil que des rayons réfléchis par la superficie qui les reçoit, & par conséquent ne représenter qu'une seule image de l'objet.

Il est très-facile, après ce qu'on vient de dire, de deviner la manière de préparer une glace de miroir, ou de verre ou d'acier, pour lui faire représenter un nombre de fois déterminé l'image d'une bougie ; ce qu'on n'a point encore vu jusqu'à présent.

Puisqu'un miroir plan ordinaire re-

présente trois bougies allumées en la présence d'une seule , pourquoi ce même miroir ne nous fait-il pas voir trois images de nous-mêmes ?

Nous avons déjà fait comprendre que l'apparence des trois bougies allumées , qu'on apperçoit dans un miroir de verre plan , suppose qu'on soit situé à côté de ce miroir afin qu'on les y voye obliquement , & qu'ainsi une des représentations ne puisse cacher les deux autres. C'est pourquoi ne pouvant nous voir dans ces miroirs qu'en nous y regardant perpendiculairement , il s'ensuit qu'une image en peut cacher autant qu'il s'en trouve derriere elle ; c'est pourquoi nous ne pouvons nous y voir qu'une seule fois.

Il reste maintenant à prouver, que la surface antérieure de la glace de miroir , doit causer une sensation de l'image de l'objet beaucoup plus foible, que celle qui est représentée par la surface du vis-argent , & qu'ordinairement la sensation de l'image , qui est vûe par la superficie de l'air qui est dans les pores du vis-argent & de l'étain , est encore plus foible que celle-ci.

Comme le verre est plus poreux que le Mercure, il doit recevoir plus de lumière dans ses pores, & par conséquent en réfléchir moins que le Mercure; d'où il suit que l'image produite par ce peu de rayons réfléchis doit être plus foible, que celle qui l'est par la surface du vif-argent. Et parce que l'air a encore plus de pores que le verre, il doit aussi moins réfléchir de lumière; d'où il suit nécessairement, que l'image de l'objet qui est vûe par le moyen des rayons de lumière qui viennent de la surface de l'air, doit être moins vive que celle qui se fait sentir par celle du miroir; comme l'expérience le confirme.

Construire un miroir d'une seule glace de verre, représentant 10 ou 12 images d'un seul objet. placé vis-à-vis le milieu de la surface plane extérieure.

Pour le faire, prenez une glace de verre assez épaisse, pour y faire d'un côté seulement autant de facettes qu'on voudra voir de représentations différentes: étamant toutes ces diverses facettes, qui sont un peu inclinées l'une à l'égard de l'autre, on aura ce qu'on demande.

Si on doutoit de ce qu'on vient de dire, on le pourroit prouver par une belle expérience qui est facile à pratiquer. Prenez pour cet effet quatre morceaux de verre blanc étamés, chacun d'environ huit pouces de longueur & trois de largeur; élevez-les ensuite sur autant de lignes droites, chacune de trois pouces de longueur, formant entr'elles des angles plans très-obtus, comme de 175 degrés. Après cela vous aurez la satisfaction de pouvoir pratiquer ce que nous avons dit de la seule glace, préparée avec des facettes étamées.

Voici la maniere de construire un nouveau miroir, dont les propriétés paroîtront singulieres.

Si sur l'une des surfaces d'une glace d'un pied de longueur, & d'environ neuf pouces de hauteur, on fait faire sept pans, ou sept facettes égales entr'elles, formant chacune la figure d'un carré long, dont le plus grand côté soit de huit ou neuf pouces de hauteur, & d'environ vingt lignes de largeur, & qu'on fasse étamer la glace du côté des facettes, qui doivent faire entr'elles des angles très-obtus,

comme de 170 ou environ , l'on aura un miroir dont voici les principales propriétés.

1°. Si on couvre de quelques corps opaques toutes les facettes de ces miroirs , à la réserve de celle du milieu , on y verra sa représentation de-même qu'on la verroit dans un miroir ordinaire. Ce qui montre combien l'on se trompe ordinairement , lorsqu'on croit que la largeur de notre représentation mesurée sur la surface des miroirs plans , est égale à la largeur de notre visage.

2°. Si l'on regarde de près dans la facette du milieu de ce miroir (qu'on suppose maintenant tout découvert , & ayant sa longueur parallele à l'horizon) le visage y paroîtra beaucoup plus large & plus racourci qu'il ne paroît dans les miroirs ordinaires ; & même il y a une distance médiocre , laquelle étant bien observée , on se croit voir dans la facette du milieu ayant quatre yeux , quoiqu'on ne remarque qu'un nez ; une bouche & un menton.

3°. Mais si on s'éloigne de ce miroir , les images y seront vûes autant de

de fois qu'il y a de facettes, en conservant dans les yeux & dans toutes les autres parties du visage une situation naturelle ; ce qui n'arrive pas lorsqu'on tourne le miroir de façon , que sa diagonale se trouve perpendiculaire à l'horison : car alors les yeux d'un même visage s'y voyent placés obliquement.

4^o. Maintenant si l'on donne à ce miroir une situation qui fasse que ses plus longs côtés soient à peu près perpendiculaires à l'horison , le visage y semblera allongé & rétréci ; & quand on s'y regardera de près , on n'y remarquera que deux yeux , un nez & une bouche ; mais à mesure qu'on s'éloigne de ce miroir , les yeux , les nez , les bouches , les mentons s'y verront multipliés d'une quantité proportionnée à celle des facettes du miroir.

Si on s'éloigne d'une chandelle allumée d'environ cinq ou six pieds , en regardant cette chandelle dans le miroir & fort obliquement par rapport à sa surface , on l'y verra représentée un grand nombre de fois.

Voici encore de nouvelles observations sur la multiplication des images.

que l'on apperçoit en regardant une bougie allumée dans des glaces de verre , qui ne sont point étamées.

1^o. Si on reçoit fort obliquement les rayons de la lumière d'une bougie allumée , qui se réfléchissent à la rencontre d'une glace de miroir qui n'est point étamé , on la verra jusqu'à 5 ou 7 fois , & ces images changeront de situation en changeant celle de la glace ou de l'œil ; ce qui vient des diverses inégalités d'élévation qui sont aux surfaces de cette glace.

2^o. Si on met deux de ces glaces l'une sur l'autre , en sorte quelles se touchent , & qu'on y regarde , comme on vient de le dire , une bougie allumée , les représentations s'y multiplient encore plus que dans l'expérience précédente.

3^o. Si entre ces deux glaces , & vers les deux extrémités qui se touchent , on insère quelque corps de trois ou quatre lignes d'épaisseur & de moins de largeur , afin qu'il couvre peu d'étendue de ces glaces , & qu'il leur fasse faire un angle fort aigu , les représentations, ou les images de la flamme de la bougie , seront plus belles , plus

distinctes , plus séparées , & en plus grand nombre qu'auparavant ; & la distance d'entre leurs apparences se fera voir d'autant plus grande , que l'angle aigu que formeront ces glaces , fera grand jusqu'à certain point.

4°. Si on emploie plus de glaces dans cette expérience , on verra plus de représentations de la bougie allumée ; ce qui doit nécessairement arriver , à cause du plus grand nombre des réflexions & des réfractions des rayons de lumière poussés par la flamme de cette bougie , lesquels se réfléchissent à la rencontre des diverses surfaces de ces glaces , & de celles de l'air qui se trouvent entr'elles.

D'où il suit nécessairement , que plus on emploiera de glaces , moins les images de la bougie , causées par les glaces les plus éloignées de l'œil , seront sensibles.

5°. Si on s'éloigne d'environ dix ou douze pieds d'une bougie allumée , en présentant à sa flamme le milieu de l'ouverture d'un angle aigu , que l'on fera faire à deux glaces de miroir , on verra environ 35 ou 40 représentations assez distinctes ou séparées les-

unes des autres , en les regardant au travers de ces glaces ; ce qui se fait en plaçant l'œil à peu de distance du sommet de l'angle aigu qu'elles forment.

Si la surface postérieure d'une glace de miroir avoit le pouvoir de réfléchir la lumière vers nos yeux , comme quelques-uns le prétendent , il y auroit - là assez de parties solides du verre qui l'empêcheroient de passer outre ; & s'il y en avoit-là suffisamment pour causer une apparence assez sensible de l'objet , il devroit y en avoir suffisamment en divers endroits de l'épaisseur de la glace , & par conséquent on devroit voir d'autant plus de représentations , que la glace auroit plus d'épaisseur ; ce qui cependant ne s'observe pas.

De plus , si c'étoit la surface postérieure de la glace qui causât la réflexion de la lumière, qui nous fait sentir l'image la moins sensible qu'on aperçoit dans le miroir dont on parle , une glace de verre adoucie d'un côté & polie de l'autre , étant présentée obliquement par le côté poli à la flamme d'une bougie , elle la feroit voir plus d'une fois , puisque la lumière ne

la traverseroit pas , comme elle la traverse , lorsqu'elle est polie des deux côtés ; ce qui n'arrive pas.

Sur quoi il faut remarquer, que quand nous parlons ici d'une glace de miroir adoucie , nous supposons qu'elle ne l'est qu'autant qu'on les adoucit ordinairement dans les Manufactures des glaces pour les y polir ; autrement il y auroit quelque chose à changer dans ce qu'on vient de dire.

*Mémoires de Trévoux, Octobre 1702.
page 267. Juillet 1703. page 1031.*

Fin du Tome Second.

608709



T A B L E

Des Articles contenus dans ce second
Volume.

S U I T E D E L A P H Y S I Q U E G E N E R A L E .

A R T I C L E L X I I .

*S*ur les étincelles produites par le choc de l'a-
cier contre un caillou , page 17

A R T I C L E L X I I I .

Sur l'embrasement des corps combustibles , sur
la flamme & sur la fumée , sur les lampes
perpétuelles , sur l'extinction du feu , sur les
cendres & sur les eaux fortes , 17

A R T I C L E L X I V .

*Observations sur la mécanique du feu, ou l'art
d'en augmenter les effets , & d'en diminuer
la dépense ,* 29

A R T I C L E L X V .

*Observations sur les effets de la poudre à canon ,
principalement dans les mines ,* 41

A R T I C L E L X V I .

*Explication physique de la force de la poudre à
canon ,* 47

A R T I C L E L X V I I .

Sur les fusées volantes , 53

TABLE. 391
ARTICLE LXVIII.

Conjectures sur les causes qui mettent en si peu de tems les pièces d'Artillerie hors d'état de servir, & sur les moyens d'en augmenter considérablement la durée, . 59

PHYSIQUE PARTICULIERE.

ARTICLE PREMIER.

Q*uelques observations générales sur les météores, 71*

ARTICLE II.

Dissertation sur le feu Boréal, 83

ARTICLE III.

Sur la cause & la nature du tonnerre & des éclairs, 91

ARTICLE IV.

Explication de divers Phénomènes, ou effets singuliers de l'air & des exhalaisons, 106

ARTICLE V.

Dissertation physique sur la nature des exhalaisons & des vapeurs, sur la formation des brouillards, de la pluie, de la grêle, de la neige & du serain, 114

ARTICLE VI.

Observations physiques sur l'évaporation des eaux, & la matière des nuages & de la neige, de la pluie, des brouillards & de la grêle, 125

ARTICLE VII.

Sur la cause de la suspension des vapeurs dans l'air, 144

ARTICLE VIII.

*Sur la quantité de vapeurs que la chaleur du
Soleil fait élever de la mer ,* 152

ARTICLE IX.

Observations sur les différentes causes des vents , 161

ARTICLE X.

Essai sur la cause des vents alisés , 172

ARTICLE XI.

*Dissertation sur les causes physiques des tremble-
mens de terre ,* 178

ARTICLE XII.

*Sur les causes , les pronostics & les différentes
sortes de tremblemens de terre ,* 195

ARTICLE XIII.

*Conjectures sur la cause physique des débordemens
du Nil ,* 200

ARTICLE XIV.

*Dissertation sur la cause du flux & du reflux de
l'Eûripe ,* 206

ARTICLE XV.

*Sur les seiches, ou le flux & le reflux du Lac de
Geneve ,* 216

ARTICLE XVI.

*Dissertation sur les changemens de tems , & sur
la maniere d'en chercher la véritable cause ,
avec des observations sur les changemens du
Barometre & sur les météores ,* 224

ARTICLE XVII.

*Sur la cause générale du froid de l'Hiver & de
la chaleur de l'Eté ,* 233

Froid produit par le sel Ammoniac , 239

T A B L E. 393

ARTICLE XVIII.

Observations & expériences sur la rosée , 246

ARTICLE XIX.

Dissertation sur la formation, la nature , & les effets de la glace , 261

ARTICLE XX.

Observations expérimentales sur la formation de la glace , 273

ARTICLE XXI.

Explication physique des divers phénomènes de la glace , 285

ARTICLE XXII.

Sur la formation de la glace dans les grandes Rivières , 314

Manière de conserver la glace & la neige , par M. W. Ball. 326

ARTICLE XXIII.

Eclaircissens sur les congélations artificielles, 328

ARTICLE XXIV.

Observation physiques sur la nature , l'usage & les propriétés des cinq sens , 335

ARTICLE XXV.

Exposition d'un système singulier sur la vision , 346

ARTICLE XXVI.

Propriétés singulières d'un Microscope extraordinaire nouvellement inventé, 366

ARTICLE XXVII.

Explication de divers phénomènes qui regardent
Tome II, LI

les miroirs ; construction d'un nouveau miroir ; explication de ses propriétés ; nouvelles observations sur la multiplication des images vûes dans un miroir ,

37

Fin des Articles contenus dans ce
second Volume.

1871
1872
1873

1874





